

PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Special Book Fund
1911
Septemb. 1899
R. W. Gibson Invt

LE PIANTE FANEROGAME

DELLA

VIZZERA INSUBRICA

ENUMERATE SECONDO

IL METODO DECANDOLLIANO

PER CURA DI

ALBERTO FRANZONI.

OPERA POSTUMA ORDINATA E ANNOTATA DAL

D^RE A. LENTICCHIA

PROFESSORE DI STORIA NATURALE NEL LICEO CANTONALE DI LUGANO

CON NOTE ED AGGIUNTE DI

L. FAVRAT

PROFESSORE A LOSANNA.

Dalle Memorie della Società elvetica delle scienze naturali.
Vol. XXX, Parte II. Agosto 1890.

In commissione
da H. Georg a Basilea, Ginevra e Lione.
1890.

Tipografia Zürcher & Furrer, Zurigo.

LE PIANTE FANEROGAME

DELLA

SVIZZERA INSUBRICA

ENUMERATE SECONDO

IL METODO DECANDOLLIANO

PER CURA DI

ALBERTO FRANZONI.

OPERA POSTUMA ORDINATA E ANNOTATA DAL

D^RE A. LENTICCHIA

PROFESSORE DI STORIA NATURALE NEL LICEO CANTONALE DI LUGANO

CON NOTE ED AGGIUNTE DI

L. FAVRAT

PROFESSORE A LOSANNA.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

Tipografia Zürcher & Furrer, Zurigo.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

Prefazione della Commissione delle Memorie.

Pubblicando con soddisfazione quest' opera postuma del meritevolissimo A. Franzoni, crediamo necessario farla precedere di alcune osservazioni relative al modo di redazione.

Il manoscritto di Franzoni è stato dapprima annotato dai Sig^i Lenticchia e Favrat. Inoltre hanno contribuito per completare il lavoro del defunto autore: il Sig. Dr. Christ di Basilea, che ha rivedute e annotate tutte le bozze di stampa, i Sig^i Prof^i J. Jäggi e C. Schrœter di Zurigo, che hanno sopratutto aggiunte le località dell' erbario elvetico del Politecnico di Zurigo (provenienti da Heer, Brügger, v. Salis, Schulthess, Siegfried, Jäggi e Schrœter).

Tutte le note, che non sono seguite dai nomi dei suddetti botanici, si devono al Prof. Lenticchia.

Allo scopo di non ritardare più a lungo l' edizione della Flora Insubrica di Franzoni è stato deciso di rinviare più tardi la pubblicazione di un' *Appendice* redatta dal Sig. Lenticchia e aumentata, in primo luogo, dalle note del Sig. Dr. Roberto Keller di Winterthur e del Sig. H. Lüscher di Zofinga, poi da quelle dei sopracitati collaboratori.

La Commissione delle Memorie coglie questa occasione per presentare i suoi sinceri ringraziamenti ai sullodati botanici, che hanno voluto colle loro contribuzioni aumentare il valore scientifico dell' opera del primo autore.

PREFAZIONE.

L' Avv° Alberto Franzoni, locarnese, alla sua morte (1816—1886), lasciava insieme ad un ricco erbario, molte note concernenti la flora del Ticino e un manoscritto, nel quale aveva compilato, oltre quarant' anni or sono, un elenco delle specie vegetali della Svizzera Insubrica. Da quell' epoca venendo fino al 1882, egli si prese la cura di aggiungere in margine a mano a mano le nuove specie ch' egli stesso trovava o sapeva scoperte da altri.

Naturalmente quel lavoro, per essere presentato al pubblico, aveva bisogno di essere ordinato in alcune parti, modificato in altre, e con aggiunte opportune completato, affinchè potesse avere l' impronta dell' attualità.

Questa era la parte principale del lavoro che restava a farsi nel primitivo catalogo del Signor Franzoni, il quale l' avrebbe egli stesso eseguita e si sarebbe forse indotto a consegnarla alle stampe, quando altre sue professionali occupazioni non l' avessero distratto ed avesse saputo superare una tal quale innata eccessiva diffidenza di sè.

La vedova, egregia Signora Angiolina Von Mentlen, dolente che tale desiderio, più volte espressole dal compianto di lei marito, non fosse stato soddisfatto e che il frutto di cinquant' anni di studi e di ricerche botaniche, da lui fatte, fosse defraudato alla scienza, non poteva meglio onorare la sua memoria che provvedendo, senza badare a sacrifici e disturbi, all' allestimento definitivo del catalogo.

Onorandomi della sua fiducia, essa s' indirizzava a me per tale scopo. Io compresi la gravità del lavoro, ma considerando l' utilità che ne può derivare ai cultori della botanica, mi decisi di accettarlo.

L' Avv° Alberto Franzoni si dedicò fin dalla prima gioventù allo studio della botanica, nè mai, finchè le forze fisiche e le sue altre maggiori occupazioni glielo permisero, cessò dal consacrarvi tempo e fatica; talchè egli riuscì a farsi un nome come botanico, vuoi nella Svizzera sua patria e vuoi all' estero. Ne siano prova le molte relazioni [1] ch' egli ebbe con distinti botanici e il fatto che ricorsero a lui, per avere indicazioni sulla flora ticinese, De Notaris, Comolli, Christ, Lavizzari ed altri [2].

Egli si distinse non soltanto nello studio delle piante fanerogame, ma eziandio in quello delle crittogame, legando il suo nome ad alcune specie importanti da lui scoperte. Fu collaboratore del *Commentario della Società crittogamologica italiana* diretto dal Prof. De Notaris. Lasciò inoltre degli elenchi di felci, licheni, muschi, epatiche, funghi e alghe

---

[1] Ciò risulta da scritti privati e da molti esemplari di vegetali, ricevuti da botanici diversi, che sono nell' erbario.

[2] Anche questo risulta dalle carte medesime del Signor Franzoni.

del cantone Ticino, i quali, sebbene incompleti, contengono tuttavia preziose notizie sopra molte specie.

Ma ciò che attesta ancor più la sua passione per lo studio della botanica è il ricco erbario, da lui raccolto ed ordinato, vero monumento che ricorda la vasta sua conoscenza delle specie vegetali del Ticino ed anche dell' estero. In vero assai più ricca vi è la collezione estera di quella locale; ivi si trovano specie spontanee e coltivate non solo de' vari paesi d' Europa, ma eziandío delle altre parti della terra. Il numero delle specie fanerogame ascende da solo a 5506.

Questo elenco della flora insubrica, che comprende cioè, oltre la flora del Ticino, quella dei paesi finitimi nella regione dei tre laghi, è il più completo ch' io conosca ed il più attendibile, perchè quasi tutte le specie[1], nel medesimo contemplate, hanno il loro riscontro negli esemplari classificati e conservati nell' erbario.

Un altro pregio è che le indicazioni de' luoghi di provenienza dei diversi vegetali sono ordinariamente così minute e precise da potere tener luogo di un botanico del paese, il quale guidi un estraneo nel rintracciarvi le specie più ricercate.

Altre indicazioni utili sono aggiunte riguardo alla natura erbacea o legnosa dei vegetali, alla durata della loro vegetazione, all' epoca di fioritura, al colore de' fiori e alle proprietà utili o nocive di alcune specie più distinte.

L' elenco è preceduto da uno *sguardo generale sulla flora insubrica*, dove l' Avv° Franzoni, con singolare perspicacia e mente sintetica, ci mostra a grandi tratti la distribuzione geografica de' vegetali, ci fa conoscere le specie caratteristiche delle principali località e ci ragiona sull' indole della flora.

In quanto all' ordinamento delle specie ed alla denominazione degli autori, mi sono attenuto, salvo qualche eccezione, al »*Synopsis florae Germanicae et Helveticae*« del Koch ed all' opera compendiata e più recente dello stesso autore »*Taschenbuch der Deutschen und Schweizer Flora*«.

Circa la sinonimia, ebbi di mira di aggiungere quei nomi che sono più rispondenti alle ultime indagini di tassonomia botanica e sotto i quali sono indicate le specie ne' più reputati moderni trattatisti di flore e sopratutto in »*Gremli, Excursionsflora für die Schweiz*« [2], che, si può dire la flora ufficiale della Svizzera, cui mette capo la maggior parte dei botanici svizzeri, per la notificazione de' nuovi luoghi di rinvenimento di specie e varietà rare e pel battesimo delle nuove.

Lugano, 3 Giugno 1888.

A. Lenticchia.

---

[1] Mancano nell' erbario gli esemplari della Svizzera Insubrica di circa 450 specie, alcune delle quali vi sono comuni, mentre le altre sono quelle maggiormente dubbie.

[2] Ultimamente è stata pubblicata anche l' edizione francese.

A

LOCARNO

mia patria
per le patitevi sventure ed il volontario esilio
fattami più cara e desiderata
questo lavoro
nato nel carcere e cresciuto sul suolo straniero
increscioso non sia di maggior lena
a segno
che le ire cittadine
non valgono a cancellare dal petto de' figli
l' amore al santo suolo natale

dedico e consacro

ALBERTO FRANZONI

A' miei concittadini.

Whoever thinks, a faultless piece to see
Thinks what ne'er was, nor is, nor e'er shall be.
Pope Ess. of Critic.

Questa operetta è l' obolo ch' io porto all' incremento della nostra piccola Repubblica. Mentr' altri incumbe al di lei politico prosperamento, mentre altri le schiude coll' istruzione le fonti del sapere che guida alla felicità, mentre altri in estranie regioni fa glorioso il di lei nome o per letteraria valentia o per arditi concetti d' arte, mi sia permesso di additare al queto cittadino i tesori che Natura prodigò a questo suolo beato, che tramezza il giocondo sorriso dell' itala terra e la calma distesa di Germania nella bella veste di piante e di fiori che lo ricopre.

Forse da taluno taccierassi d' oziosa siffatta opera; ma fia questo il giudizio degli accorti? Nol fu altrove, dove i cultori della bella scienza s' ebbero in onoranza, ove riveriti si ebbero e cari e gloriosi i nomi de' Cisalpini, dei Tournefort, dei Jussieu, de' Linné, dei De Candolle, ove non si fece scarsezza di fatica e di spendio per penetrare le arcane virtù, i segreti che la provvida Natura ascose ne' vegetali e trarne nuovo incremento alle scienze ed alle arti. Perciocchè se è vero che la cognizione delle ricchezze di una regione ne fa aperto il profitto che se ne può trarre, debb' essere ugualmente vero che lo studio di un ramo qualsiasi di esse ricchezze non può rimanere infecondo. Onde lo studio della flora di un paese non è il minore, in fatto di vantaggi pel pubblico, avvegnachè e la medicina e l' agricoltura e vari mestieri ne derivano non pochi sussidi, sopratutto in un paese quale si è il nostro, che per la sua geografica posizione, dalle vette dell' Adula alle amene piagge del Verbano e alle fertili campagne del Mendrisiotto, ci offre i prodotti di svariati climi e di terreni diversi che rendono classico questo nostro paese. E ciò intesero già parecchi diligenti cultori della scienza, che studiarono su questo suolo i doni, onde Flora e Pomona gli furono liberali. Fra questi piace a un ticinese di ricordare, oltre agli illustre stranieri, Wahlenberg, Scheuchzer, Gaudin, Comolli, i ticinesi abate Verga e medici Zolla, Ferrini, Righetti e il Lavizzari, che con zelo accudirono alle indagini delle botaniche ricchezze di questo paese. Se non che, per nostro danno, le loro fatiche, i loro sudori sono stati indarno, comechè niuna o quasi niuna traccia ne sia rimasta,

causa infelici accidentalità, che dispersero i loro erbari e le dotte loro memorie (1) e ci furarono gli autori prima che fosse loro dato di chiamare a parte il pubblico del risultato dei loro studi.

Ma quello che ad essi fu negato, benigno il Cielo concesse a me, nel quale se la scienza è scarsa, il buon volere non fa difetto. Io dedicai a cotale studio le ore di libertà che le occupazioni dello stato mio mi largirono, ve le sacrai con amore, con trasporto, e quello ch' io ora ardisco presentarvi ne è il frutto primaticcio. Io ve l' offro, non vi sdegni! Quale esso è, forse precoce, certo imperfetto; pure non sarà, spero, senza giovamento. La Medicina e la Farmaceutica scorgeranno per esso, come farmachi salutari, che spesso procacciavansi e a caro prezzo in altre regioni, vegetino spontanei sul dosso dei nostri monti, nel seno delle nostre valli, sul margine dei nostri rivi. La pittura e la tintura avviseranno come vivaci colori e durevoli possano conseguire da vegetali de' nostri paesi, fin quì sprezzati o negletti. L' agricoltura imparerà come molte delle piante, ch' essa coltiva, nascano spontanee fra noi, e, studiando come crescano rigogliose nell' abbandono, potrà trarne argomento ad utili miglioramenti. La domestica economia incontrerà volontieri nuove e svariate civaie, onde con minori cure guernire la mensa. La gentile donzella troverà nuove ricchezze di che abbellire il suo giardino e meno costose, ma non meno brillanti, di quelle che ci mandano l' Africa, l' Asia, l' America e la lontana Nuova Olanda.

Dalla contemplazione poi di sì infinita varietà di forme, di colori, di virtù, sviluppo di un solo potente pensiero, si sublimerà al concetto di quell' Essere che d' un soffio diè vita a questo creato, di cui la flora non è il minore ma neanchè il maggiore prodigio. Tutti poi veggendo quanto generosa sia stata con noi la Provvidenza, non invidieranno più alle altre regioni i loro tesori, ma benediranno in cor loro quella eterna legge che con equa mano i diversi popoli chiamando, quale più e quale meno, a parte de' suoi favori, di tante, forse ignorate, dovizie naturali fè bello il nostro Ticino.

Ed ora mi è grata l' occasione di rendere quì pubbliche grazie ai generosi, che mi hanno sorretto in questo cammino ameno, ma non senza triboli. E dato un mesto ricordo al Comolli, che con generosa e parentevole premura mi guidò nelle prime ricerche e mi fu largo di consigli, mi sia permesso di commemorare l' assistenza e la cortesia, che mi prestò il Prof^re Heer e quella, più che di amico, di fratello, del Prof^re De Notaris, il cui nome e i cui meriti suonano più alto e sono forse più apprezzati nelle lontane regioni che nell' Italia sua (2); i signori Prof^ri Jan e Cornalia, che, mettendo a mia

---

(1) Ad eccezione di Lavizzari, il quale pubblicò vari lavori scientifici, fra cui le *Escursioni nel Cantone Ticino,* pregevole libro nel quale sono sparse quà e là notizie botaniche di questo paese.

(2) Anche in Italia i meriti di De Notaris sono ora altamente apprezzati, specialmente per avere dato un vigoroso impulso agli studi crittogamologici, prima di lui poco coltivati in Italia, i quali furono e sono con pari ardore continuati dall' eletta schiera de' suoi numerosi allievi, fra cui l' onorano ancora Castracane, il Prof^re Ardissone e il Prof^re Piccone.

De Notaris è nel numero dei botanici più distinti che abbia avuto l'Italia.

disposizione il Museo civico di Milano, mi hanno offerto il modo di superare non poche difficoltà; l'infaticabile botanico Muret e i miei concittadini D^re Ferrini locarnese e il R^o Padre Agostino da Vezia che con zelo indefesso mi fu largo di aiuto e di collaborazione; più che tutti, il mio egregio amico Signor Dr H. Christ, col quale mi confidai di questa mia qualsiasi fatica, e che è uno dei più ardenti ammiratori della nostra flora.

* * *

Nell' enumerare i vegetali del nostro paese, pendetti lungo tempo in dubbio a quale dei diversi sistemi conosciuti mi dovessi appigliare, affinchè più pronta riuscisse, a chi voglia di questa opera approfittare, la cognizione delle piante di cui ragiono, e sebbene il sistema linneano si abbia per opinione di moltissimi per il più pratico, le gravi imperfezioni ch' esso presenta dal punto di vista della loro distribuzione in gruppi non omogenei, mi persuasero ad adottare il metodo naturale quale fu modificato da De Candolle.

Chiunque s' addentri nello studio della Natura potrà facilmente persuadersi non esservi in lei disposizione sistematica di sorta, bensì avere essa dotata ogni regione di quei prodotti, che più adattavansele per le particolari condizioni, a loro favorevoli, onde l' aveva provveduta. Invece lo scienziato che cerca internarsi nella cognizione delle produzioni della Natura, ha bisogno di uno schema, di un metodo, di un ordine pel quale, come se guardasse in uno specchio, possa facilmente e prontamente ravvisare le forze tutte di cui può valersi.

Quest' opera della scienza, comunque utile, non vuolsi nullameno attribuire alla Natura, ma avere a solo sussidio per conoscerla, perciocchè, se altrimenti si ritenesse, cadrebbesi in assurdi tali (qualunque fosse il sistema cui si volesse abbracciare) da degradarne l' umano intendimento. Tutti i caratteri difatti, onde si valgono i sistematici per separare l' una dall' altra classi, famiglie, tribù, generi o specie, non dalla Natura sono stabiliti, ma dall' arbitrio che, a mo' d' esempio, una data parte di una pianta, prescegliendo come carattere differenziale, agglomera attorno a quella ogni altra pianta che di tale carattere vada rivestita. Ma quanti caratteri che per un solo, che in esse piante concorda, trovansi dissonanti! (1)

(1) In ciò sta appunto il diffetto capitale del sistema linneano e di tutte le classificazioni artificiali in genere. Linneo stesso l' aveva compreso e coi *Frammenti del metodo naturale*, che pubblicò dopo il suo sistema, però sempre classico, faceva un tentativo di classificazione naturale, che ha per oggetto di riunire le piante, a seconda della loro intima parentela, in gruppi omogenei, ciascuno costituito di piante affini. Per il che necessita tener conto di tutti i caratteri che presentano le piante. È così che si stabilirono le *famiglie* dette *naturali*, perchè si cerca di rifare l' opera della Natura coll' ordinare le innumerevoli forme vegetali secondo la loro rassomiglianza non solo per l' aspetto esterno, ma più ancora in quanto all' intima loro organizzazione. Su questa via si misero, dopo Linneo, Bernardo de Jussieu, Adanson ed altri; ma il merito di avere proposto la prima classificazione naturale veramente utile spetta ad Antonio Lorenzo de Jussieu (n. a Lione 1748 e m. a Parigi nel 1836) nipote e scolaro di Bernardo.

Vuoi rimediarvi con distinzioni? Allora più ti addentri nello studio del vegetale, e più si moltiplicano, e quasi ogni genere ti può presentare caratteri da formare una tribù, una famiglia da sè. Che se tu pretendi che anche questo stato di cose debba ad un sistema condurti, non appena vi dai mano per porne la prima pietra, che nuovi incagli ti sorgono contro. Un ordine che ti pare sì vicino all'altro per un determinato rapporto, una famiglia che ti sembra sì affine all'altra per un dato carattere, per altri non meno importanti rapporti, per non meno decisivi caratteri, ti si porgono affini ad altro ordine, ad altra famiglia, sicchè ne nasce un sistema reticolare a vece di un sistema lineare, quale da ragione vorresti suggerito. Approfonda di più la materia e ti troverai in un caos inestricabile.

In questo stato di cose però difficilmente potresti padroneggiare l'immensa mole della materia che Flora ti somministra, se un filo non sciegliessi che ti sia scorta ad uscire dal labirinto.

Se è innegabile che nessun filo apparente lega in una non interrotta catena i diversi prodotti del regno vegetale, pare pure provato che la Natura li abbia disposti in diversi gruppi offrenti in sè una specie di relazione, una affinità che al primo intuito ti si appalesa. Basti ricordare la struttura e la fisionomia delle felci, delle palme, delle orchidee, delle leguminose etc. Perciò io stimai conveniente l'attenermi al sistema naturale di De Candolle, come quello che presenta questi gruppi quali noi li veggiamo in natura, a vece de' sistemi artificiali di Linneo, di Tournefort e d' altri. Certo che anche questa classificazione naturale, appunto perchè sistema, pecca gravemente contro i saggi provvedimenti della Natura, spesso isolando in una famiglia un solo individuo, spesso, con arbitrario carattere, forzandone molti di diversa indole ad entrare in uno stesso ordine.

1844—1882.

Alberto Franzoni.

ASPETTO GENERALE
DELLA FLORA DELLA SVIZZERA INSUBRICA.

La flora della Svizzera Insubrica, che si rallegra per fecondità e varietà di specie, trovasi fra quelle che, poste sul pendio delle Alpi gigantesche, si distendono baciate dall' eterno sorriso del Cielo d' Italia, per strette gole, per paurosi burroni e per larghe e ridenti vallee, a bagnare i piedi ne' laghi e alle pianure italiche.

Quindi è che anche nel Ticino il viaggiatore, che cali dalla Novena, dal S. Gottardo e dal S. Bernardino a Locarno od a Chiasso, vede in breve giro di tempo dispiegarsi dinanzi al suo occhio ammirato e succedersi le vegetazioni de' climi più svariati, dai geli della Lapponia alle tiepide aure del mezzodì, e vi saluta le piante del freddo nord, quelle della Germania nebulosa, quelle dell' alpestre Elvezia, così pure molte di cui s' allietano i colli e i piani lombardi e la flora mediterranea. Sulla superficie appena di 846 miglia quadrate (Franscini Sviz. ital. I. p. 91) noveransi non meno di 1600 specie di piante vascolari, oltre a 100 di muschi, 60 di epatiche, 150 di licheni (1) e un numero prodigioso di funghi, fungilli e alghe.

Che se poi meglio voglia conoscersi e porre un certo ordine nella molteplice varietà di questa vegetale ricchezza, spontanea si presenta la divisione del paese in cinque zone, che, cominciando dalle vette delle Alpi, hanno confine colle sponde dei laghi.

Prima fra queste va la *zona glaciale*, che dalle vette dell' Albula (3160 M.) si stende fino a circa 2100 M. Qui ghiacci e nevi perenni e fra esse qualche falda di terra, che, salutata dal sole ne' brevi mesi d' estate, gli sorride de' lieti fiori della *Silene acaulis*, della *Androsace glacialis*, della *Saxifraga muscoides*, del *Ranunculus glacialis;* quì sorge ancora qualche fiata il *Salix herbacea* e cresce qualche muschio; nelle macchie gialle e rotundate, che screzian le rupi, conosci la *Lecidea geographica* e nelle loro fessure si annida la *Cetraria islandica*. Regione severa, sublime, ove sibila la marmotta e si libra l' avvoltoio e ove l' occhio libero si sprofonda negli abissi del monte, ma scarsa di messe al botanico; ne' suoi immensi serbatoi conserva le acque fecondatrici, che manda a irrigare le valli ed i piani. In essa ergono sublime la fronte le cime del Pesciora (3266), del Ficudo (2708), del Pettine (2766), del Prosa (2738), dello Zucchero (2237) e del P^zo Pegro (2420) nella Verzasca e di Vigone (2963) al S. Bernardino, fulgenti di nevi e coronate spesso di nubi.

(1) Ora il numero di queste crittogame è di molto accresciuto.

Non novera il Ticino estesi ghiacciai fuor quello di V. Bavona, il quale dalle vette che formano il nocciolo che la divide dalla V. di Peccia, dalla V. Sambuco e dalla V. Torta, scende giù nella valle fino a circa 1300 M.; ed il ghiacciaio di Lucendro, che copre la cima del Fieudo e fornisce le acque che dan sorgente alla Reuss.

Alla regione glaciale succede la *regione alpina*, la quale, sebbene conti nove mesi di verno, nella breve estate vede con prodigiosa cura coprirsi i suoi prati, i suoi burroni, di verdi erbette, smaltate de' più variopinti fiori. Quì i pascoli alpini e con essi il latte, il burro ed i formaggi eletti e quì il manto di flora ricamato di mille colori.

Proprie di questa regione sono:

Gentiana utriculosa
» bavarica
Primula integrifolia
Armeria alpina
Arenaria biflora
Androsace Chamaejasme
» carnea
Achillea nana
Chrysanthemum Halleri
Erigeron uniflorus
Saussurea discolor
Adenostyles albifrons
Senecio incanus
Ranunculus glacialis
Alchemilla alpina
Trifolium alpinum
Saxifraga androsacea
» oppositifolia
Meum Mutellina
Lloydia serotina
Juncus Jacquini
» triglumis
Sesleria disticha
Poa laxa
» minor

Le piante d'alto fusto sono quasi affatto sbandite da questa regione e non è che per eccezione se quà e là vi giunge fino a 1600 M. a 1800 M. qualche raro abete e qualche cespuglio di *Rhododendron* o di *Alnus viridis*.

Appartengono a questo regione gli alti pascoli dell' Ospizio del Gottardo, di Valle Bedretto, dell' Uomo e di Val di Piora, di S. Maria sul Lucomagno, di Naret nella V. Maggia, e la raggiungono le cime del Camoghè (2226), del Ghiridone (2190 M.), dello Zucchero (2237), di Piora (1830), di Sponda (1920) in Valle di Chironico, di Vigone al S. Bernardino, Forca di Bosco V. Maggia (2326). Il Generoso, che si estolle fra il lago di Lugano e la valle di Muggio, appena vi spinge di 100 M. la gemina cervice e lo diresti quasi, pel suo isolamento e per la più meridionale situazione, sfuggire alle leggi, che la governano, poichè appena vi noveri alcune delle piante che la caratterizzano, come l'*Adenostyles albifrons*, la *Saussurea discolor*, la *Cineraria aurantiaca*, l'*Armeria alpina*. Non rado poi fra le sublimi vette, che spesso circondano e fanno spalla alle pasture, stendesi tranquillo e mesto un laghetto, dalle cui sponde spinge galleggiante i suoi rami l' *Hypnum fluitans* e il *Sarcocarpus Funkii*.

Quà e là fra i dirupi, fra le more e fra i rivi, la *Jungermannia* e il *Sarcoscyphus Ehrhartii* coprono lunghe falde di terra.

Rosseggiano quà e là le rupi ed i macigni di croste di *Lecidea armeniaca*, e vi crescono la *Parmelia cucullata* e la *nivalis* e la *Cetraria islandica*.

Severa pe' tetri obelischi de' *pezzi*, degli *abeti* e de' *larici*, che quì di rado varcano i 1600 M., ne si presenta la *Regione subalpina*; ma il *pruno*, il *cigliegio* ed il *faggio* vi si spingono spesso a temperarne il rigore.

Forma questa regione una fascia che dai 1600 M. scende ai 1000 M. e composi di pascoli e boschi, che coprono le spalle delle valli più elevate e le cime de' minori monti. Quì numerosa e ridente cresce la famiglia di flora, in cui più particolarmente primeggiano:

Anemone ranunculoides	Centaurea phrygia
Aconitum Napellus	Gnaphalium supinum
Arabis bellidifolia	Leontodon pyrenaicus
Cardamine resedifolia	Hieracium albidum
Viola calcarata	Mulgedium alpinum
» biflora	Senecio viscosus
Cherleria sedoides	Achillea Clavennæ
Rhamnus pumila	» nobilis
Oxytropis montana	Arnica montana
Geum montanum	Campanula patula
» reptans	Rhododendron ferrugineum
Potentilla grandiflora	Veronica bellidioides
Comarum palustre	» aphylla
Sibbaldia procumbens	Pedicularis verticillata
Dryas octopetala	» recutita
Herniaria glabra	» tuberosa
Saxifraga stellaris	Primula villosa, K. non Jacq.
» rotundifolia	» Auricula
Cirsium spinosissimum	Polygonum alpinum
» Erysithales	Empetrum nigrum
Carduus rhæticus	Alnus viridis

Se t' abbatti in qualche laghetto vi vedi galleggiare il *Potamogeton natans* e l' *Hipparis vulgaris* come al S. Bernardino, o vi riscontri lo *Sparganium natans*, Koch non L., come a Poltrinone sul Camoghè; ne' luoghi uliginosi e torbosi ti si presenta il *Triglochin*, il *Menyanthes trifoliata*, il *Lycopodium inundatum*.

Nei boschi, dove fitti sorgono gli *abeti*, i *pezzi*, i *larici*, la *Linnaea* ricama delle sue graziose ghirlande e de' suoi campanellini il tappeto di musco sul quale si adagia.

Salici dalle fronde d' argento e *rose delle alpi* a dovizia: e di licheni e muschi copia ancor più grande. È la *Cetraria islandica* ancora, è la *Sticta laevigata* sulle rupi; *Bryopogon jubatum*, *Usnea florida*, *Evernia vulpina*, *prunastri*, *Physcia physodes* sui pini ed abeti. Ne' boschi varii i funghi: frequentissimo l'*Agaricus Cantharellus* e il *Boletus edulis*, cibi graditi.

Segue la *Regione montana* dai 540 ai 1100 M. Quà e là vi scende qualche pascolo alpino, ma non de' migliori. Poco al di sotto dei limiti inferiori di questa regione, ti si presenta il *castagno*, l' albero del pane del povero vallerano, che nondimeno nella Svizzera transalpina ascende sì alto sul dosso dei monti e nelle valli come quì, dove nelle gole delle alpi lo troviamo fino a 900 M., come presso Olivone e nelle più miti plaghe del Generoso fin quasi a 1000 M.

Prosperano in questa zona: il *faggio*, il *frassino*, la *quercia*, i *pruni*, i *meli*, i *peri*, v' è comune l'*Alnus glutinosa* e l' *incana*, il *Juniperus nana*, il *Crataegus Aria*, il *Sorbus aucuparia*, il *Morus nigra* e l' *alba*, che, coltivato a cagione delle foglie, alimento del prezioso baco da seta, prospera in tutta questa zona e si spinge fino all' altipiano della Leventina ad Ambrì; vari *salici* e vari arbusti l' adornano; e il *Rubus Idaeus* ed il *glutinosus* danno copiosi frutti in Agosto così come la *fragola* e il *mirtillo*.

Sono erbe di questa regione:

Pæonia peregrina
Erysimum rhæticum
Silene Saxifraga
« quadrifida
Agrostemma Flos Jovis
Potentilla caulescens
» micrantha
Saxifraga cuneifolia
» rotundifolia
Conium maculatum
Laserpitium latifolium
Artemisia Absinthium
Hypochæris helvetica
Cirsium Erysithales
Crepis paludosa
Hieracium villosum
Achillea tanacætifolia, Vill. non All.
Anthemis Triumfetti
Campanula glomerata
Phytheuma Halleri
Pyrola rotundifolia
Gentiana cruciata
» acaulis
» asclepiadea
Pedicularis tuberosa
Soldanella montana ?
Streptopus amplexifolius
Veratrum nigrum
Asphodelus albus

e molte altre.

I prati quì si alternano coi campi, che spesso decorrono sulla china del monte, talvolta son tagliati a lunghi spalti sul suo dosso e sorretti da muricciuoli a terrazza, dove coltivansi i *pomi di terra*, la *segale*, l' *orzo*, il *grano saraceno*, il *lino*, la *canapa*.

Ultima succede la *Regione dei doppi raccolti*, che abbraccia il tratto che dai 700 M. corre fino alle sponde dei laghi, la più bassa delle quali, quella del Verbano, giace ancora a 197 M. sul livello del mare.

Comprende questa regione il fondo delle valli della Maggia, del Ticino e del Brenno, da Locarno ad Ascona, a Linescio, a Brontallo, a Lavertezzo, a Gerra, a Torre, a Ponte Valentino; la pianura ed i colli del Luganese, la bassa vallea di Muggio e la pianura del Mendrisiotto.

Le differenze colle regioni corrispondenti al di là delle Alpi veggonsi quì tracciate a chiare note e proclamano, in loro confronto, la benignità del cielo, la mitezza dell' aere della regione insubrica.

La *vite* ascende a 850 M. sopra il livello del mare, mentre nella Svizzera interna si arresta ai 550 M.

L' abituro del contadino, talvolta sguernito di vetri, è segnato spesso dall' ombra del *fico domestico*, e la villa del ricco, dai cupi obelischi del *cipresso* e dalle giulive chiome della *Magnolia grandiflora*.

L' *alloro del poeta* e il *lauro-ceraso* adornano i dossi dei colli più meridionali, e, quando la neve vi è scarsa, il verno alzano le verdeggianti loro braccia, a promessa che quel bianco manto non durerà a lungo. Il *pesco*, l' *albicocco* e varie altre qualità d' alberi fruttiferi sono sparse sul dosso del monte e nel piano. Nè fa difetto il *melagrano* dal fiore di fuoco e dall' acidulo pomo. E lungo le rive dei laghi, l' *olivo* spicca la cinerea sua cervice sugli spalti de' declivi, che vanno a bagnarsi il piede in riva al Ceresio ed al Verbano. V' ha qualche spicchio di terra ancor più benedetta, dove il *pomo delle Esperidi* giuoca colle sue tinte d' oro, colle verdi-cupe fronde, e il *limone* matura il suo frutto grato a temperare l' arsura della state.

In questa plaga prospera il *frumento* ed il *maiz* e l' anno è benedetto per due raccolti. Tratto tratto vi si vede coltivato il *panico* ed il *miglio*.

Tra l' erbe, crescono quì ne' prati:

Peucedanum venetum	Centaurea transalpina
» Oreoselinum	Cynosurus echinatus
Aethusa Cynapium	Andropogon Gryllus
Anemone nemorosa	Crocus vernus
Ranunculus bulbosus	Leucojum vernum
Salvia glutinosa	

In riva ai campi, trovasi:

Aristolochia Clematitis	Artemisia vulgaris
Oenothera biennis	Potentilla recta

Lungo la strada:

Festuca Pseudo-Myurus
Eragrostis pilosa
Ornithogalum umbellatum
Xanthium Strumarium
Cynoglossum officinale
Hyoscyamus niger
Datura Stramonium
Phytolacca decandra
Malachium manticum
Spergularia rubra
Arabis Thaliana

Seguono i fiumi:

Festuca rubra
Hippophaë rhamnoides
Oenothera biennis
Artemisia campestris
Artemisia vulgaris
Hieracium staticefolium
Silene Otites
Melilotus vulgaris

Sopra i declivi aprichi:

Serapias longipetala, Pollin.
Spiranthes autumnalis
Narcissus biflorus
» pseudo-narcissus
Iris germanica
Muscari botryoides
Lychnis Viscaria
Orobanche rapum
» cruenta
Centaurea Scabiosa

All' ombra delle selve e nei siti rupestri ombrosi:

Panicum undulatifolium
Lunaria rediviva
Orobus gracilis
Trifolium rubens

Ne' rudereti:

Carpesium cernuum
Conyza squarrosa
Physalis Alkekengi

Sulle rupi:

Pteris cretica
Asplenium Adiantum nigrum
» Breynii
» Halleri
Adiantum Capillus Veneris
Selaginella helvetica
Grammitis Ceterach
Notholæna Marantae
Saxifraga Cotyledon
Sempervivum tectorum
Sedum maximum

I grappoli d' oro del *Cytisus Laburnum* si disegnano quà sulle verdi cime delle siepi e de' boschi; mentre nelle amene vallette s' alza il *Diospyros Lotus*, e il *Celtis australis* spicca dai dirupi.

Di stagni, paludi e luoghi uliginosi s' ha, pur troppo, non poca abbondanza nel paese, e portanvi i brividi delle febbri e lo squallore dei volti.

Ma la provvidenza, che piantava in essi la *Gratiola* (1), rimedio vicino al male, non li volle privi d' ornamento. E quindi là ove l' acqua impregna e ammorba il terreno, cresce:

Cyperus fuscus	Menyanthes trifoliata
Scirpus supinus	Herminium Monorchis
Rhynchospora fusca	Narcissus poëticus
» alba	Lysimachia nemorum
Carex punctata	Scorzonera humilis

e dove s' allarga in paludi:

Sparganium simplex	Trapa natans
» ramosum	Hippuris vulgaris
Ceratophyllum demersum	Polygonum amphibium
Potamogeton natans	Ranunculus Lingua
» fluitans	

I due laghi, che fanno specchio alle più ridenti plaghe della Svizzera insubrica, posti nella sua parte più a mezzodì, ornano le loro sponde di vegetabili ancora più rari a chi move dal Nord verso l' Italia, e servono quasi d' anello di congiunzione o meglio di trapasso dalla flora subalpina a quella della pianura lombarda. Quivi incontri di già il *Cyperus Monti* ed il *longus*, sì comuni alle risaie, il *Cyperus fuscus*, *Scirpus mucronatus*, *S. supinus*, *S. Tabernaemontani*, *Cladium Mariscus*, *Limosella aquatica*.

Nei declivi, che li circondano, ti si presentano:

Androsaemum officinale	Serapias longipetala
Campanula spicata	Pteris cretica
Diospyros Lotus	Adiantum Capillus Veneris

vegetali questi che cercheresti invano oltr' alpi.

Nei laghi stessi poi:

Trapa natans	Potamogeton lucens
Nymphæa alba	» crispus
Nuphar luteum ?	» densus
Isoëtes lacustris	» pectinatus
Potamogeton natans	Scirpus lacustris
» fluitans	Chara hispida
» perfoliatum	» flexilis

(1) Scoperta da Malinverni nelle risaie di Vercelli; si trova anche sul Tamaro poco sopra Rivera.

Copiosissima di Muschi ne è la natura al punto che si ha un angolo di terra sopra Locarno, ove si può con qualche diligenza, in breve giro di lune, raccoglierne da 150 e più specie; ricchezza straordinaria che dinota quanto feconda di forme fosse flora in queste regioni, prima che l' avara ma provvida mano dell' agricoltore vi ponesse la zappa e l' aratro e quanto la si serbi ancora, là ove natura si ribella alle sue esigenze. Primeggia fra esse la bellissima, e finora assai rara, *Braunia sciuroides*, che adorna le rupi della Leventina e del Locarnese, e trapassa nella finitima Lombardia, tra Maccagno e Colmegna, il *Trichostomum glaucescens*, la *Seligeria tristicha* e *Pterigophyllum lucens*, *Hypnum demissum*.

V' ha pure dovizia d' Epatiche; noi citeremo a mo' d' esempiò la *Trichocolea tomentella*, la *Jungermannia Franzoniana*.

Nè vi è scarsezza di Licheni, fra i quali notiamo lo *Stereocaulon nanum*.

Numerosissimi poi sono i Funghi di ogni specie e varietà, e col *Agaricus muscarius*, col *virosus*, col *Clathrus cancellatus* e col *Phallus impudicus*, invisi per letali attributi, vediamo crescere l' *Agaricus Caesareus*, il *Boletus edulis*, l' *Hydnum coralloides*, il *Cantharellus edulis*, la *Clavaria lutea*, la *Morchella esculenta*, il *Lycoperdon Bovista*, il *giganteum*, il *Geaster hygrometricus*, il *Favolus europaeus*, ignoti alla Svizzera transalpina.

Da ultimo ci resterebbe di ricordare le Alghe, se gli studi sulle stesse, di troppo arretrati in questo nostro paese, non ci lasciassero di troppo imperfetti. Non vogliamo però tacere di una *Cladophora martensis Cesati*, che veste le rupi umidi de' borri, ed una *Lemanea fluviatilis*, che flutteggia nelle gore de' mulini.

Prima di chiudere questi brevi cenni sull' aspetto della Flora insubrica, giovi l' osservare che tutte le delimitazioni delle regioni, nelle quali abbiamo partito l' impero della flora elveto-insubrica, non hanno a prendersi per inviolabili, che anzi in ragione de' fattori esterni, della giacitura, esposizione e natura del suolo, dell' azione dei venti, delle nevi, dei torrenti, delle frane, nulla di più facile che il vedere le specie di una regione valicarne i confini o ascendendo o discendendo e spesso comparire in diverse stazioni delle differenti plaghe. Così, per cagione d' esempio, la *ginestra (Sarothamnus scoparius)* dalle spiagge dei laghi, la vediamo ascendere su su per le chine de' monti e primeggiare in tutta la gran valle del Ticino, da Giornico al Verbano, e sulle spalle della V. Maggia e della V. d' Isone fino a 1300 e più metri; il che si può verificare, senza salire i monti, col seguire lo sviluppo della sua fioritura, che si sussegue dal piano al monte in larghe striscie dorate, dall' aprile a mezza state. La *Primula villosa K.* invece scende dalle vette dei monti giù pe' borri e le vallee, e fa gioconde le rupi di Ponte Brolla e di Golino, a 65 M. appena sulle rive del Verbano. E il *Rhododendron ferrugineum*, che oltr' alpi non s' abbassa al dissotto di 700 M., è comune nel M. Ceneri e allegra de' suoi rosei mazzolini la valletta del Rebissale presso Orselina, appena a 280 M. sopra il livello del mare.

Trascinate dai torrenti, la *Viola biflora*, l' *Erica carnea*, il *Cerastium alpinum*, la *Linaria alpina*, l' *Eryngium campestre*, trovansi quà e là in diverse altezze, lungo i loro

alvei sino ai terrapieni delle valli, e la *Hippophaë rhamnoides* e la *Myricaria germanica* seguono ligie il Ticino dai piani di Ambrì fin quasi alla sua foce a Magadino.

Ma una maggiore differenza e varietà è portata dalla natura del suolo, e forse basterebbe il paragone delle regioni superiori al Monte Ceneri, la valle del Ticino e degli influenti del bacino di Locarno, con quelle poste al dissotto, specialmente i colli luganesi e la plaga del Mendrisiotto, per persuadere quanta influenza porti il sottostrato nello sviluppo e nella varietà della vegetazione.

Dalle vette dell' Albula al Verbano, primeggiano le roccie primitive, granito, gneiss, micaschisto; scarso ne è il calcare, e sebbene lo trovi al Lucomagno, ad Olivone, a Nante, a Castione, in V. di Peccia, in V. Morobbia o in qualche altra parte, pure mai non abbraccia estese plaghe. Il letto delle valli è formato da terre alluviali e appena vi trovi quà e là qualche banco di argilla tra Muralto e Mappo, in riva al lago. Qualche banco di dolomia nella valle di Cravairola e a Campolungo, e sebbene ricchissimo di cristalli il Gottardo non presenta grandi varietà di roccie.

Tutto il contrario avviene al di là del Ceneri, dove variatissima è la costituzione geologica dei monti, dove ai graniti e ai micaschisti succedono i calcari, le dolomie, i porfiri, i melafiri, le brecce, gli schisti argillosi, le argille con vicenda, in sì breve spazio, veramente degna di fissare l' attenzione dei geologi.

E da questa diversità, diversa la vegetazione se non nelle sue basi, almeno nella varietà delle sue specie.

Proprie alla valle del Ticino o dominanti:

Festuca Halleri, *Panicum undulatifolium*, *Cistus salvifolius*, *Facchinia lanceolata*, *Orobus gracilis*, *Gnaphalium Leontopodium*, *Lychnis coronaria*.

Proprie alla regione subcenerina:

Helleborus niger, *H. viridis*, *Paeonia peregrina*, *Doryenium herbaceum*, *Silene gallica*. *Elatine Alsinastrum*, *Pedicularis gyroflexa*, *Galium insubricum*, *Asperula longiflora*, *Achillea Clavennae*, *Campanula bononiensis*, *Androsace Charpentieri*, *Hottonia palustris*, *Veratrum nigrum*, *Vallisneria spiralis*, *Asphodelus albus*, *Scirpus supinus*.

Dal che emerge maggiore essere la ricchezza e le particolarità delle specie al dissotto del Ceneri. Della quale differenza il Cisceneri però se ne rifà a larga mano per la maggiore dovizia di crittogame cellulari.

Tale è l' aspetto generale della Flora elveto-insubrica, che, stendendo una mano alle ghiacciate cime delle alpi e l' altra alle tepide regioni della gran valle del Po, in breve spazio riepiloga la flora che copre le regioni del nord, dalla Lapponia alla penisola ausonica, e quella a questa rannoda per insensibili sfumature. Tuttavia la vegetazione, che riveste i lembi più meridionali di questa regione, rientra in gran parte nella flora subalpina, non bastando, come osserva il De Notaris colla consueta sua perspicacia, la comparsa in certi luoghi, eccezionalmente privilegiati da un clima quasi meridionale, di alcune piante, quali il *fico*, l' *alloro*, il *lauro-ceraso*, il *cipresso*, l' *agave*, il *leandro*, la *Pteris cretica*, l' *Hete-*

ropogon Allionii, l' *Androsaemum officinale* ed alcune specie randagie, ad imprimere alla vegetazione dei laghi il carattere della flora mediterranea.

Che se da queste generali considerazioni vuolsi scendere alle specialità e conoscere quali località vadan distinte di più illustri specie, allora, portando lo sguardo su tutto il campo della vegetazione ticinese, noi veggiamo emergere alcuni punti nei quali, per lo incontro simultaneo di più favorevoli circostanze, si raggruppano specialmente le maggiori dovizie di questa flora. Nè è meraviglia che questo succeda specialmente nei punti più estremi della linea, là dove sono più disparate le condizioni del suolo, dell' aere, della luce e del calore; mentre, nella regione mediana, vi si vanno sempre più uniformando e formano così un terreno neutro, sul quale il più delle specie di tutta la regione si riscontrano in una comunione, che dalle piante più caratteristiche di quella viene sempre sfuggita.

Se la regione nivale e alpina sono ricercate dal botanico, che vi ascende dalle aduste pianure italiche, piace e sorprende invece maggiormente lo straniero, che viene d' oltr' alpi, la regione della vigna e del ripetuto ricolto, come quella che maggior novità di forme gli presenta e gli dice la gioia e la sorpresa che incontrerà sul suolo lombardo. Già la *Silene Otites*, il *Sedum maximum*, *Saxifraga Cotyledon*, il *Malachium manticum*, la *Grammitis Ceterach* gli si sono fatti incontro fino a Giornico, a Mesocco, a Bellinzona; già salutò lungo il cammino il *castagno* e il *pesco* e quà e là un *cipresso* severo prima che gli brillino innanzi le acque argentine del Verbano e che gli si spieghi ne' suoi meandri la bizzarra coppa del Ceresio.

Alla riva di questi laghi cresce la più larga messe.

Le rupi apriche del Sasso, sopra Locarno, nutrono il *Cistus salvifolius* dalle candide rose, il *Lychnis Coronaria*, il *Centrantus ruber*, il *Diospyros Lotus*, il *Jasminum officinale* dalle odorate stelle, il *Trifolium rubens*, la *Grammitis Ceterach;* mentre ne' burroni, che si aprono ai piedi, fioriscono tranquilli l' *Hesperis matronalis*, il *Ruscus aculeatus*, e all' ombra delle selve castanili, la *Trichocolea tomentella* e il *Pterigophyllum lucens* sviluppano i loro cespiti, questo di grato verde, polverosa quella, e l' *Aneura multifida* e la *Cladophora* adornano le pareti uggiose dello scoglio lungo la cascata del torrente.

L' alveo della Ramogna presenta la *Festuca Lachenalii*; le rive del lago la *Limosella*, la *Peplis*, il *Cyperus fuscus*, e nel seno del lago vedi l' *Isoëtes* dispiegare a mo' d' istrice le cilindriche sue foglie; la valletta del Tazzino la *Pteris cretica*, il *Panicum undulatifolium* e il *Carpesium*.

Interessanti sono le rupi di Ponte Brolla, dove crescono l' *Heteropogon Allionii*, il *Cistus salvifolius*, il *Chrysocoma Linosyris*, la *Potentilla rupestris*, la *Festuca heterophylla* [1]), l' *Adiantum Capillus Veneris*, il *Tamus creticus*.

Alle Fracce, fra Minusio e Gordola, la *Hemerocallis fulva*, la *Pteris cretica*, la *Corsinia marchantioides*, che quì forse o poco lontano trova l' ultimo suo confine settentrionale, e nel lago ancora l' *Isoëtes*.

---

[1]) Ancora più abundante la *Festuca varia* Hänke.

Nel vasto greto accumulato dalle alluvioni della Maggia, fra Locarno e Ascona: la *Silene Otites* e sui tronchi del biancospino, del pruno, del ginepro la dorata *Physcia chrysocoma.*

A Magadino: il *Cytisus hirsutus*, il *Trifolium badium*, e lungo le acque: il *Nasturtium siifolium*, che cresce anche presso Locarno. A S. Nazzaro: l' *Ornithogalum pyrenaicum*, il *Nasturtium pyrenaicum*, lo *Streptopus amplexifolius.* A Gerra: la *Daphne Laureola.*

A Brissago già rimarcammo: l' *Asplenium Halleri*, l' *Asplenium Breynii.*

A Orselina: la *Calamintha grandiflora*, l' *Osmunda regalis*, che è comune nelle selve uliginose; e nella valletta del Rebissale, i cespugli bellissimi di *Rhododendron ferrugineum.*

Sopra Losone: la *Rhynchospora fusca* e la *Plantago maritima.*

Ma per quanto ricca sia questa spiaggia, quella che forma il bacino del Ceresio la vince e già ne abbiamo sfiorate le ragioni.

Nei dintorni di Lugano, dalle rive del lago alle molli pendici de' suoi colli: *Cyperus Monti* — *Aristolochia rotunda* — *Helleborus viridis* — *Vicia luganensis* — *Orchis variegata.*

Ai piè del S. Salvatore: *Trinia vulgaris* — *Laserpitium Siler* — *Inula hirta* — *Scabiosa graminifolia* — *Asperula longiflora*, che qui surroga felicemente la *A. Cynanchica* — *Cyperus longus.*

Sul suo dosso: *Helleborus niger* — *Helianthemum polifolium* — *Daphne Cneorum.*

A Gandria ancora maggiore dovizia: l' *Agave*, che ne ricorda l' America e i piani felici del Messico, dove ne traggono la gratissima Pulque — la *Pteris cretica* — l' *Heteropogon* — il *Dictamnus albus* — la *Pæonia peregrina* — la *Chlora perfoliata* — la *Colutea arborescens* — *Helianthemum Fumana* — la *Campanula bononiensis* e la *spicata* — il *Buphthalmum grandiflorum* — *Ruta graveolens* — *Celtis australis* — *Ostrya carpinifolia* — *Rhus Cotinus* — *Fraxinus Ornus* — *Laurus nobilis* — *Molinia serotina.*

E anche le paludi e gli stagni sono qui più fecondi di preziose piante, poichè ad Agno incontriamo il *Cladium Mariscus* e la *Hottonia palustris.* A Pontetresa e Agno la *Vallisneria spiralis*, la *Trapa*, la *Chara hispida*; e sulle rive della Torrazza il *Cyperus fuscus* e il *Scirpus supinus.*

Nel lago di Muzzano frequentissima la *Trapa*, già cibo grato agli Orobii, ora ai fanciulli — e la superba *Nymphæa*, regina della flora lacustre.

Ma lo scettro del dominio nel giocondo regno di Flora lo rivendica la plaga mendrisiense col M. Generoso, già ab antico in grido per la copia delle sue vegetali ricchezze, sicchè taluno ne volle derivato da quella il nome. Esso ebbe la preferenza sopra ogni altro monte, nè ci ha botanico nazionale o straniero che gli passasse al fianco, senza salirgli in groppa e strappargli qualche parte dello svariatissimo mantello onde si copre. Là salì Corrado Gessner, il patriarca della flora elvetica, là il sommo Haller, là il diligente Schleicher, là il sagace Gaudin, là Comolli, di cui la flora comense piange l' interrotto

coscienzioso lavoro, e là de' patrii cultori della umana scienza l' infelice Zola, il Righetti e il Ferrini[1], lodati medici locarnesi, e il naturalista Lavizzari.

Da quel monte spazia lo sguardo sui mille villaggi dei piani lombardi, sulle vallee che racchiudono i laghi di Como, di Varese, di Lugano e Maggiore, sulle ondeggianti cime de' monti prealpini e sulla catena nevosa delle alpi, dal colle di Tenda al Resegone.

Crescono ivi:

Achillea Clavenae	Veronica montana	Silene Saxifraga
Cineraria aurantiaca	Pedicularis gyroflexa	» quadrifida
» spathulaefolia	Pinguicula alpina	Draba stellata (?)
Inula hirta	Hyoscyamus niger	Pæonia peregrina
Adenostyles albifrons	Daphne Laureola	Asphodelus albus
Saussurea discolor	» Mezereum	Carex mucronata
Carduus rhæticus	Valeriana saxatilis	Festuca spadicea
Hypochæris maculata	Saxifraga mutata	Poa alpina
Pleurospermum austriacum	Potentilla caulescens	Botrychium Lunaria
Laserpitium Gaudini	» micrantha	

Al suo piede, da Melano a Mendrisio: *Corydalis lutea* — *Sedum Cepæa* — *Clematis recta.*

Sopra Melano: *Galium aristatum* e *purpureum* — *Cirsium Erysithales* — *Anthemis Triumfetti* — *Quercus Cerris* — *Pæonia peregrina.*

Sull' alpe di Melano: *Veratrum nigrum* — *Prenanthes tenuifolia* — *Crepis alpina* — *Lychnis flos Jovis.*

Alla Cascina e nei monti di Cragno: *Molopospermum cicutarium.*

Che se ne scendi per la valle di Muggio, incontri lungo la strada: *Carpesium cernuum*, presso a Monte — *Campanula bononiensis* e *Dorycnium herbaceum*, tra Monte e Obino — *Aconitum Napellus*, che da Monte ascende fino a 1150 m., e molte altre specie.

Oltre a queste particolarità, ne' dintorni di Mendrisio trovasi: *Senecio nemorensis* — *Silene gallica*, che crescono ne' prati di S. Martino a Mendrisio e a Stabio e forse a Chiasso.

A Stabio: *Erythronium Dens canis.*

Sul monte S. Giorgio: *Iris graminea* — *Asparagus tenuifolius* — *Danthonia provincialis* — *Adenophora liliifolia.*

Discorso così anche delle specialità, che qualificano le più fortunate spiagge della flora elveto-insubrica, non ne resta che a conchiudere, e crediamo non affermare cosa che si scosti dal vero dicendo, che ben poche regioni sono come questa fortunate, da accogliere in sì brevi confini così largo campo alle considerazioni del sacerdote di Flora.

Alberto Franzoni.

---

[1] Di Zola e Ferrini è fatta menzione, come cultori di Storia Naturale, nella *Svizzera italiana* 1837, p. 383 e 384, di *Stefano Franscini*, il quale ricorda anche l' abate Verda di Lugano, defunto nel 1820, che lasciò un tentativo di *Flora Ticinese.*

Segni convenzionali e avvertenze.

⊙ = Annuale.
⊙ = Biannuale.
♃ = Perenne.
♄ = Legnoso.
F. = Fiore.
var., v. = Varietà.
? = Premesso alle specie la di cui esistenza nel Cantone Ticino è dubbia.
A. = Alpe.
coll. = collina.
M. — mont. = monte — montagna — montana (reg.).
pian. = pianura.
freq. — freq^{mo} = frequente — frequentissimo.
reg. = regione.

I nomi dei mesi di fioritura sono abbreviati e segnono l'indicazione del colore dei fiori.

Classis Dicotyledoneae.

Subclassis Thalamiflorae.

Fam. Ranunculaceae.

Clematis.

1. **C. recta** L. sp. 767.
   Ital. *Flammula, Vitalbino.*
   ♃ Selve, rupi, luoghi aridi; freq^{mo} = Gordola — Losone — S. Nazzaro — Gambarogno — Gandria — Melide — Capolago — Maroggia — M. S. Giorgio ecc.
   F. bianchi, odorosi. — [Mag.—Lug.]
2. **C. Vitalba** L. sp. 766.
   Ital. *Clematide, Vitalba.* — Tic. *Vidalbora.*
   ♃ Selve, rupi; freq^{mo} = Locarno — Losone — Gambarogno — Bellinzona — Claro — Lugano ecc.
   F. bianchi, volgenti al canino. — [Giug.—Lug.]

Thalictrum.

1. **Th. aquilegifolium** L. sp. 770.
   Ital. *Pigamo aquilegifolio* — Tic. *Fiocchitt.*
   ♃ Prati, dal piano fino alla reg. subalpina = Locarno, saleggi — Tenero — Casaccia, freq. né cespugli — M. Tamar a 1500 m. di elevaz. — M. Camoghè — Nebbiano — Castello S. Pietro (Lavizzari).
   F. verde pallido. — [Mag.—Lug.]
2. **Th. fœtidum** L. sp. 768.
   ♃ Rupi delle convalli alpine = Campo alla Torba — V. Bavona, fra S. Carlo e Campo, prati e boscaglie.
   F. rossicci. — [Lug.—Ag.]
3. **Th. minus** L. sp. 769.
   ♃ Prati e luoghi incolti di coll. e mont. = Locarno — V. Maggia — V. Leventina [1].
   F. verde-giallognoli o giallo porporini. — [Giug.—Ag.]

---

[1] Anche nei colli del Sottoceneri.

4. **Th. majus** Jac. fl. austr. 5. p. 9 (del preced. v. *dumosum* K. syn. ed. 1. p. 4).
   ♃ Prati tra Losone ed Ascona — V. Blenio. — [Mag.—Giug.]
5. **Th. Jacquinianum** Koch. Syn. p. 4 (*Th. minor* Jacq.).
   ♃ Prati aridi di coll. = Locarno al Ronco di S. Biagio. — [Mag.—Giug.]
6. **Th. simplex** L. Syst. veg. 1784. p. 513. (*Th. Bauhini* Crantz.)
   ♃ Prati = Colli di Pedrinate (Mari). — [Giug.—Lug.]
7. **Th. angustifolium** Jacq. h. vind. 3. t. 43.
   ♃ Prati di coll. e mont. = Minusio — Fra Contone e Quartino — Cevio — M. Generoso (Comolli). — [Giug.—Lug.]
8. **Th. flavum** L. sp. 770.
   ♃ Lugano — Tra Cantone e Meride — Tra Meride ed Arzo, lungo il torrente.
   F. giallo-smunti. — [Lug.—Ag.]
9. **Th. exaltatum** Gaud. fl. helv. 3. 315.
   ♃ Tra Minusio e la Navegna — Piano di Magadino — Lugano al Paradiso (rara) — Laghetto di Muzzano (1) (freq.) — Tra Melide e Morcote (Gaudin).
   F. bianco-giallognoli. — [Giug.—Lug.]

Anemone.

1. **A. hepatica** L. sp. 758.
   Ital. *Erba trinità.*
   ♃ Boschi e luoghi scoscesi = Bignasco — Locarno — Acquarossa (2).
   F. azzurri, raramente rossi o bianchi. — [Feb.—Apr.]
2. **A. vernalis** L. sp. 759.
   Ital. *Anemolo primaticcio.*
   ♃ Pascoli alpini e delle reg. anche più basse = A. Piora — Lucomagno alla Casaccia — Tra Cerentino e Bosco — M. Camoghè — M. Generoso.
   F. bianchi, esternamente smunto violacei. — [Giug.—Lug.]
3. **A. montana** Hoppe ap. Sturm. h. 46.
   ♃ Prati secchi = Losone; già freq. ne' prati lungo la Maggia tra il ponte e la presa d'acqua della roggia d'Ascona, ora fattasi assai rara per la seguita irrigazione di detti prati e per l'alluvione. La trovai ancora (1869) lungo la riva che sostiene il piano Arbigo presso Losone.
   F. atro-violacei. — [Mar.—Apr.]
4. **A. narcissiflora** L. sp. 763.
   ♃ Prati e boschi alpini e subalp. = M. Generoso pr. Orimonto, fuori del territorio svizzero.
   F. bianco. — [Mag.—Lug.]

(1) Ora vi è divenuto alquanto raro.
(2) Comunissimo al S. Salvatore, M. Bré ed altri luoghi del Sottoceneri.

5. **A. alpina** L. sp. 760.
   ♃ Prati e pascoli alpini e subalpini; freq^{mo} = Campo — Cimalmotto — Bosco V. Maggia — Laghetto e A. di Piora (v. *sulphurea L.*)(1).
   F. bianco, giallo solfureo nella v. — [Mag.—Giug.]
6. **A. nemorosa** L. sp. 762.
   ♃ Siepi e selve dal piano fino a circa 1600 m.; freq^{mo} = Locarno — Losone — Bellinzona — Faido — M. Tamar — Mendrisio — Lugano etc.
   F. bianco, sovente la porzione inferiore violacea. — [Mar.—Mag.]
7. **A. ranunculoides** L. sp. 672.
   ♃ Siepi, selve, prati = Calprino, al piede del S. Salvatore(2).
   F. giallo. — [Mar.—Apr.]

Adonis.

1. **A. æstivalis** L. sp. 771.
   Ital. *Adonide, Camomilla rossa, Fior d'Adone, Occhio del diavolo.* — Tic. *Occc. del diavol, Cardinalitt.*
   ⊙ Coltiv. ne' giardini — Dicesi cresca fra le biade nel Mendrisiotto.
   F. rosso. — [Giug.—Ag.]

Ranunculus.

1. **R. aquatilis** L. sp. 781.
   Ital. *Ranuncolo acquatico, Ranuncolo soldinello.*
   ♃ Gore di lento corso; comune.
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]
2. **R. pantothrix** Brot. Fl. lusit. 2. p. 375 (v. *pantothrix* Sm. del preced.).
   ♃ Sponde dei laghi (Comolli).
   F. bianco, macchiato di giallo alla base. — [Giug.—Ag.]
   R. paucistamineus Tausch. (v. *paucistamineus* Tausch. del *R. trichophyllus* Chaix).
   ♃ Locarno a Mappo e al Roncaccio in riva al lago.
   F. bianchi, gialli alla base con vene trasparenti. — [Sett.]
3. **R. fluitans** Lam. fl. fr. 3. 164 (*R. fluitans* Willd.).
   ♃ Acque di lento corso = Bellinzona nel Ticino — Nella Tresa (Comolli).
   F. bianchi, macchiati di giallo alla base. — [Giug.—Lug.]
4. **R. divaricatus** Schrank. baier. fl. 2. 104. 1789.
   ♃ Acque di lento corso, fossi = Magadino verso la riva di Mappo.
   F. come il precedente — [Lug.—Ag.]

---

(1) La v. sulphurea si trova anche al M. Generoso e al Camoghè.
(2) È freq. al M. Generoso e anche al piano, come nella valletta di Ponte Cassarina presso Lugano.

5. **R. glacialis** L. sp. 777.
Ital. *Carlina.* — Tic. *Erba camozzera.*
♃ Somme A. da 1700—2200 m. = Motto Minaccio in V. Campo V. Maggia — A. dell'Uomo tra S. Maria ed A. di Piora — Ghiacciaio Lucendro (Lavizzari) — Passo di Naret — M. Basodino sopra l'A. di Zocchi — M. Camoghè (Lavizzari).
F. bianco, esternamente roseo. — [Lug.—Ag.]

6. **R. alpestris** L. sp. 778.
Ital. *Ranuncolo alpestre.*
♃ Prati alpini; comune = S. Gottardo — Nufenen.
F. bianco. — [Giug.—Ag.]

7. **R. aconitifolius** L. sp. 776. colla v. *platonifolius* K. = *R. platonifolius* Lin.
Ital. *Piè di Cornacchia.*
♃ Selve subalpine ed alpine, lungo i rivi, fino alle nevi perpetue = Campo V. Maggia — A. di Bosco — S. Gotthardo — A. di Piora — S. Bernardino — M. Tamar.
F. bianco. — [Mag.—Ag.]

8. **R. pyrenæus** L. mant. p. 148.
♃ Prati alpini = Nufenen (Lavizzari) — S. Gottardo (Rhiner) — A. di Piora presso l'albergo e l'A. dell'Uomo — A. di Zaria sopra Fusio — Campo alla Torba, al Forno (v. *plantagineus* All.).
F. bianco. — [Lug.—Ag.]

9. **R. Flammula** L. sp. 772.
Ital. *Ranuncolo delle passere.*
♃ Arcegno presso Losone, stagno — Muralto e Rivapiana presso Locarno, in riva al lago (v. *reptans* L.).
F. giallo. — [Mag.—Ott.]

10. **R. Lingua** L. sp. 773.
Ital. *Ranuncolo dei canneti.*
♃ Piano di Magadino fra Gordola e Riazzino, fossi — Agno, canneti (Comolli).
F. giallo. — [Giug.—Lug.]

11. **R. Ficaria** L. sp. 774 (*Ficaria ranuncoloides* DC. = *F. verna* Huds.).
Ital. *Chelidonio minore, Erbafava, Favagello, Ficaria.*
♃ Prati umidi, ombrosi, boschi, siepi; freq^{mo} = Tenero — Lavertezzo [1].
F. giallo. — [Apr.—Mag.]

12. **R. Thora** L. sp. 675 (*R. scutatus* Waldst. et Kit).
♃ Pascoli alpini e subalp. = S. Bernardino, alla cima — M. Camoghè — A. di Cadro sut M. Canne d'Organo (Muret) — M. Generoso (Comolli).

---

[1] Comune anche nel Sottoceneri.

13. **R. auricomus** L. sp. 775.
Ital. *Botton d' oro, Margheritine.*
♃ Boschi, siepi = Comolli lo dice non raro nel Ticino (loc.?) e in V. Intelvi.
F. giallo. — [Mag.—Giug.]

14. **R. montanus** Willd. sp. pl. 2. p. 1321.
♃ A. da 1500—2200 m.; freq^{mo} = M. Culmanicchio sopra Locarno — A. di Campo V. Maggia (v. *gracilis* Schleich = *R. geranifolius* Pourr.) — S. Gottardo — Nufenen (Lavizzari).
F. giallo. — [Lug.—Ag.]

15. **R. Villarsii** DC. syst. 1. p. 276 (*R. lapponicus* Vill.).
♃ Luoghi erbosi reg. subalpina e alp. = Campo V. Maggia sopra l' A. di Quadrelle verso il Motto Minaccio.
F. giallo. — [Lug.—Ag.]

16. **R. acris** L. sp. 779.
Ital. *Piè corvino, Piè di gallo.* — Volg. *Pè de Nibbi.*
♃ Prati di pian. e mont. fino a 1500 m.; freq^{mo} = Piano di Magadino — Cevio — Broglio — Campo alla Torba etc. (1)
F. giallo. — [Mag.—Ag.]

17. **R. polyanthemus** L. syst. veg. 1784. p. 517.
♃ Prati tra Auressio e Cavigliano.
F. giallo. — [Mag.]

18. **R. nemorosus** DC. syst. 1. 280.
♃ Boscaglie umide tra Contone e la collinetta di Cugnasco.
F. giallo. — [Lug.—Ag.]

19. **R. lanuginosus** L. sp. 779.
Ital. *Ranuncolo lanuto.*
♃ Selve frondose tra Rovio e Arogno (lo vidi).
F. giallo. — [Mag.—Giug.]

20. **R. repens** L. sp. 779.
Ital. *Stellettine, Crescione selvatico.*
♃ Campi, prati umidi, luoghi ombreggiati fino a 1600 m. = Locarno — Cimalmotto. (2)
F. giallo. — [Mag.—Ott.]

21. **R. bulbosus** L. sp. 778.
Ital. *Ranuncolo selvatico, Lappio.* — Volg. *Ravagnon (a Brissago e a Lugano).*

---

(1) Comunissimo in tutti i prati di Lugano, Mendrisio etc. Nuova pel Ticino è là la v. *multifidus*, prati umidi presso Gordola, Solduno e Locarno (Favrat). (N. B. z. Fl. d. Schw. v. Gremli. fasc. IV° 1887. p. 1).

(2) Comunissimo nei prati del Sottoceneri.

♃ Prati, campi, siepi fino a 1600 m. circa = Locarno — Cimalmotto etc. (1)
F. giallo. — [Apr.—Mag.]

22. **R. Philonotis** Ehrh. Beitr. 2. 145. (*R. sardous* Crantz).
♃ Fossi, luoghi acquitrinosi = presso Agno (Comolli) — Arona.
F. giallo. — [Mag.—Giug.]

23. **R. sceleratus** L. sp. 776.
Ital. *Appio rosso, Sardonia, Ranuncolo di palude.*
⊙ Paludi e rive di gore a lento corso = Mendrisiotto — Lugano.
F. giallo. — [Mag.—Lug.]

24. **R. arvensis** L. sp. 780.
Ital. *Ranuncolo de' campi.*
⊙ Campi, freq. = Solduno — Ascona — Arona.
F. giallo. — [Mag.—Giug.]

Caltha.

1. **C. palustris** L. sp. 784.
Ital. *Calta palustre, Farferugine, Farferugio.*
♃ Lungo fossi e ruscelli dal piano fino a 2000 m. = Airolo — Passo Nufnen — S. Bernardino — Tra il Laghetto di Muzzano e Agnuzzo — Casoro.
F. giallo. — [Lug.—Ag.]

Trollius.

1. **T. europæus** L. sp. 782.
Ital. *Luparia. Vulparia.*
♃ Prati umidi di mont. da 500—1600 m. = Airolo — Campo V. M. a Corte Nuovo — Palagnedra — Mendrisio all' entrata della valletta del Nebbiano — M. Bisbino (Mari) ecc.
F. giallo. — [Mag.—Lug.]

Helleborus. (2)

1. **H. niger** L. sp. 783.
Ital. *Elleboro nero, Rosa di Natale, Erba Nocca,*
♃ Selve frondose, terr. calcar. = Pendici del S. Salvatore — M. Brè — Denti della Vecchia — Fra Melano e Arogno — Mendrisio a S. Nicolao (3).
F. bianco. — [Nov.—Mar.]

---

(1) Comunissimo nei prati del Sottoceneri.

(2) Finora nel Sopraceneri, nè a Brissago nè a Locarno, non fu trovato nessun Elleboro, sebbene siasi indicato come crescenti colà il nero e il verde (Comolli fl. com. 1846. p. 265).

D'aggiungere l'*H. fœtidus* L. — Gandria (Erbar. Liceo cant. di Lugano, Cat. Lenticchia p. 51).

(3) L'ho trovato anche in V. Colla sempre però sul terreno calcare, che ivi forma un cordone sulle cime di Cimadera e di Certara.

2. **H. viridis** L. sp. 784.
Ital. *Elleboro verde.*
♃ Selve, prati, luoghi incolti di coll. = Lugano — Melano — Mendrisio.
F. verde. — [Mar.—Apr.]

Nigella.

1. **N. damascena** L. sp. 758.
Ital. *Nigella, Anigella, Damigella, Erba bozzolina.* — Tic. *Bizzarri.*
⊙ Coltivato frequentemente ne' giardini.
F. bianco azzurrognolo. — [Giug.—Ag.]

?2. **N. arvensis** L.
Spontaneo nelle vicinanze di Como e probabilmente nelle biade sul Mendrisiotto, a Chiasso, Vacallo, Stabio.

Aquilegia.

1. **A. vulgaris** L. sp. 89.
Ital. *Aquilegia, Fior cappuccio, Amor perfetto.* — Tic. *Perfett amor.*
♃ Prati selvatici e selve(1).
F. rossigno o azzurro. — [Apr.—Mag.]

2. **A. atrata** Koch. bot. Zeit. 1830. 1. 118 (v. *atrata* Koch. del preced.).
♃ Prati e declivi = Belvedere sopra Locarno.
F. rosso scuro. — [Mag.—Giug.]

3. **A. alpina** L. sp. 752.
♃ Luoghi scoscesi e fra virgulti da 1300—1700 m. = Campolungo sopra Dalpe (Lavizzari) — A. di Piora sopra l'albergo — A. di Pianeabella e di Sonvico in V. Colla.
F. grande, azzurrognolo. — [Lug.—Ag.]

4. **A. Einseleana Schott.** (A. pyrenaica auct. non DC. fl. fr. 5. 640).
♃ Luoghi scoscesi de' monti = M. S. Giorgio, salita dalla parte di Riva S. Vitale (Moritzi)(2).
F. azzurro. — [Lug.—Ag.]

Delphinium.

1. **D. Consolida** L. sp. 748.
Ital. *Cappuccio, Erba cornetta.* — Tic. *Vieul del corno, Calzett.*
⊙ Orti e giardini, quasi spontaneo = Arona, campi.
F. turchino, rosa o bianco. — [Mag.—Lug.]

---

(1) Comune in tutto il Cantone in pian. e mont.
(2) Più comune ai monti dei dintorni di Lecco.

Aconitum.

1. **A. Anthora** L. sp. 751.
   Ital. *Antora, Aconito salutifero.*
   ♃ Luoghi rupestri della reg. alp. = M. Generoso (Comolli).
   F. giallo. — [Lug.—Ag.]
2. **A. Napellus** L. sp. 751.
   Ital. *Aconito, Napello.* — Tic. *Napell, Mapell.*
   ♃ Pascoli della reg. alp. e subalp. = S. Bernardino — A. di Piora — M. Tamar — M^ti della V. di Muggio — Camoghè (Comolli) (1).
3. **A. paniculatum** Lam. fl. fr. ed. 1. suppl. 1224.
   Ital. *Aconito pannocchiuto.*
   ♃ Luoghi alpestri umidi = V. Torta sopra Osasco — M. Tamar (2).
   F. bleu. — [Lug.—Sett.]
4. **A. Lycoctonum** L. sp. 750.
   Ital. *Erba della volpe, Luparia, Strozzalupo.*
   ♃ Luoghi selvatici, cespugli della reg. alp. e subalp. — M. Lucomagno sopra il Piano di Campore, freq. — M. Tamar a Cortenovo (3).
   F. giallo. — [Giug.—Ag.]

Actaea.

1. **A. spicata** L. sp. 722.
   Ital. *Barba di capra, Erba di S. Cristoforo degli erborai.*
   ♃ Selve e luoghi sassosi della reg. alpina e subalp. = Olivone — Fra Altanca e Piora — Campo V. Maggia (a 1280 m.) — Fra Mogno e Fusio, cespugli lungo strada (Pad. Agost. Daldini) — M. S. Giorgio (a circa 800 m.).
   F. bianco. — [Mag.—Giug.]

Pæonia.

1. **P. peregrina** Mill. (4)
   Ital. *Peonia.*
   ♃ Luoghi selvatici, terreno calcare = M. Generoso sopra Rovio e sopra Scudellate (5).
   F. rosso. — [Mag.—Giug.]

---

(1) Freq. sui M^ti di Lugano, come al Bolia, alle Canne d' Organo.

(2) È freq. questo bellissimo Aconito in V. Colla ne' greti de' fiumi e sulle pendici del Garzirolo (Lenticchia, alcune notizie scientifiche della V. Colla; ann. club. alp. tic. 1886. p. 159).

(3) M. Generoso, M^ti di Cimadera in V. Colla.

(4) E' la *P. rosea* Host. = *P. bannatica* Roch. = *humilis* Retz = *pubens* Rchb. La *P. officinalis*, coltivata ne' giardini, è, secondo l'osservazione del Dr. Facchini, discendente dalla selvatica *P. peregrina* Mill.

(5) Pizzo Gordona all' est di Scudellate.

Fam. Berberideae.

Berberis.

1. **B. vulgaris** L. sp. 472 (1).
   Ital. *Crespino, Berberi* — Tic. *Crespin, Uga di legur.*
   ♃ Luoghi incolti, letto de' fiumi, freq. = Alvei della Maggia e del Ticino — Tenero alle Brerre presso Locarno — Piano di Magadino.
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]

Epimedium.

?1. **E. alpinum** L. (2).
   ♃ Freq. nelle selve castanili di Arona.
   [Apr.—Mag.]

Fam. Nymphæaceae.

Nymphæa.

1. **N. alba** L. sp. 719.
   Ital. *Ninfea bianca, Copripentole, Carfano.* — Volg. *Tajee, Tajer (a Lugano).*
   ♃ Acque stagnanti, e di lento corso = Lago di Lugano a Casoro — Lago di Muzzano — laghetto di Chiasso (Lavizzari).
   F. bianco. — [Giug.—Lug.]

Nuphar.

?1. **N. luteum** Smith. Fl. graec. Prodr. 1. p. 361.
   Ital. *Cappero di palude, Carfaro maschio, Nannufero.*
   ♃ Laghi e acque stagnanti = Dicesi che si trovi ai laghi di Lugano e Muzzano (3).
   F. giallo. — [Giug.—Lug.]

Fam. Papaveraceae.

Papaver.

1. **P. Rhoeas** L. sp. 726.
   Ital. *Papavero selvatico, Bubboline, Rosolaccio.*
   ⊙ Campi fra le messi, luoghi arenosi, rive ghiaiose = Locarno — Bellinzona ecc.
   F. rosso. — [Mag.—Giug.]

---

(1) Nuova la v. *heterophylla* Rchb. (Calloni), alla *Compia* sul M. S. Salvatore (ann. club. alp. tic. 1886. p. 125).

(2) Del Tirolo Meridionale, da lungo tempo naturalizzato a Basilea.

(3) Posso quasi assicurare che in questi laghi non si è mai visto il Nuphar, almeno da moltissimi anni.

2. **P. dubium** L. sp. 726.
   Ital. *Rosolaccio a mazza, Tignosella.*
   ⊙ Campi fra le messi = Mosogno in V. Onsermone.
   F. rosso vivo. — [Mag.—Giug.]
3. **P. orientale** L. sp. 726.
   Ital. *Papavero domestico, Papavero indiano.* — Tic. *Papaver.*
   ⊙ Coltivato.
   F. rosso. — [Giug.—Lug.]

Chelidonium.

1. **Ch. majus** L. sp. 723.
   Ital. *Chelidonia, Erba da porri.* — Tic. *Erba donna, erba maistra (Mendrisiotto).*
   ♃ Siepi, muri, luoghi incolti del piano; comunissima = Locarno — Bellinzona — Lugano ecc.
   F. giallo. — [Mag.—Lug.]

Fam. Fumariaceae.

Corydalis.

1. **C. cava** Schweigg.-Koert. Fl. Erlang. 2. 44.
   ♃ Siepi e cespugli = Melano — Chiasso.
   F. porporino. — [Apr.—Mag.]
2. **C. fabacea** Pers.
   Siepi = Chiasso.
   F. porporini. — [Apr.—Mag.]
3. **C. lutea** DC. Fl. fr. 4. 638.
   ♃ Fessure delle rupi e luoghi sassosi = Melano — Mendrisio (1).
   F. giallo. — [Mag.—Lug.]
4. **C. ochroleuca** Koch. Bot. Ztg. 1. p. 708 in Sturm.
   Presso un ruscello, ai piedi dell' A. di Melano, lungo la strada che mette la Generoso (Gremli) (2).
   F. giallo pallido. — [Giug.—Lug.]

Fumaria.

1. **F. capreolata** L. sp. 985.
   ⊙ Siepi, orti = Locarno (3).
   F. giallo. — [Mag.—Sett.]

---

(1) Sui muri e le rocce da Caprino a Osteno.
(2) Anche sul M. S. Giorgio (Lentiechia).
(3) Comune anche negli orti del Luganese.

2. **F. officinalis** L. sp. 984.
   ⊙ Luoghi coltivati e luoghi sterili, arenosi; assai frequente = Locarno — Faido(1).
   F. rosso. — [Apr.—Ott.]

Fam. Cruciferae.(2)

Matthiola.

1. **M. incana** K. Br.
   Ital. *Viole ciocche.* — Tic. *Vieul quarantin.*
   ♄ Coltivata nei giardini.
   F. violetti o bianchi. — [Mag.—Giug.]
2. **M. glabrata** DC.
   Ital. *Viole ciocche.* — Tic. *Vieul quarantin.*
   ♄ Coltivata nei giardini, massime la varietà a fiori doppi.
   F. bianchi o rossi, odorosi. — [Mag.—Giug.]
3. **M. annua** DC.
   Ital. *Viole ciocche.* — Tic. *Vieul quarantin.*
   ⊙ Coltivata ne' giardini.
   F. bianco o rosso o screziato. — [Giug.—Lug.]

Cheiranthus.

1. **Ch. Cheiri** L. sp. 924.
   Ital. *Viola gialla.* — Tic. *Vieul giald.*
   ♃ Muri vecchi, quasi spontaneo a Locarno.
   Coltivasi frequentemente ne' giardini la var. a fiori doppi.
   F. giallo intenso. — [Apr.—Lug.]

Nasturtium.

1. **N. officinale** Brown. hort. Kew. ed. 2. v. 4. p. 110.
   Ital. *Crescione, Nasturzio acquatico, Sisimbro acquatico.* — Tic. *Cresson, Crescion.*
   ♃ Fontane, ruscelli, piscine, lungo le acque correnti = Locarno (Fregiera e Guta) — Magadino, galleggiante fra i canneti.
   F. bianco. — [Giug.—Sett.]
2. **N. siifolium** Reich. ic. 9. f. 1132 (v. *siifolium* Rchb. del. preced.)
   ♃ Acque di lento corso, luoghi acquosi = Locarno (rivo della fontana Orelli) — Magadino, lungo la strada di Vira e alla riva del lago.
   F. bianco. — [Giug.—Sett.]

---

(1) Anche nel Sottoceneri.

(2) Nuova pel Ticino la *Senebiera coronopus* Poir. Lugano (Coaz). N. B. z. Fl. d. Schw. v. Gremli. fasc. IV° p. 2.

3. **N. amphibium** Brown. hort. Kew. v. 4. p. 110.
   ♃ Acque stagnanti = Locarno (rivo della fontana Orelli) — Magadino (riva del lago) — Capolago.
   F. giallo. — [Mag.—Lug.]
4. **N. sylvestre** Brown. hort. Kew. v. 4. p. 110.
   ♃ Prati umidi, lungo i sentieri dei prati = Ascona (porto) — Lugano (numeroso lungo strada del Paradiso) — Muralto (riva del lago) — Balerna — Riva S. Vitale presso V. Serada.
   F. giallo. — [Giug.—Lug.]
5. **N. pyrenaicum** Brown. hort. Kew. v. 4. p. 110.
   ♃ Prati e lungo strade da 230—600 m. = S. Nazzaro Gambarogno (quasi alla riva del lago) — Cadenazzo — V. Morobbia (Comolli).
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]
6. **N. palustre** DC. syst. 2. 191.
   ⊙ ⚇ Lugano, freq^{mo} lungo la strada — Muralto in riva del lago (var. *β brevistylum*).
   F. giallo. — [Mag.—Lug.]

Barbarea.

1. **B. vulgaris** Brown. hort. Kew. v. 4. p. 110.
   ⚇ Luoghi aridi, muri, strade = Muralto (a S. Stefano) — Orselina, muro sotto la casa parrocchiale (¹).
   F. giallo. — [Apr.—Giug.]

Turritis.

1. **T. glabra** L. sp. 930. { *Arabis perfoliata Lam.* / „ *turritis Clairv.* / „ *glabra Pollin.* }
   ⚇ Declivi aprichi, luoghi scoscesi = Moscia presso Locarno — sponda della Ramogna a Locarno — Ascona sopra S. Michele — Roveredo (rupi) — Cevio (letto Maggia).
   F. bianco-giallognolo. — [Mag.—Giug.]

Arabis. (²)

1. **A. alpina** L. sp. 298.
   ♃ Fessure rupi, fra le ghiaie de' torrenti, luoghi scoscesi umidi dalla pianura fino quasi alla reg. subnivale = S. Gottardo nella V. Tremola (frequente) — Campo alla Torba — M. Generoso ecc.
   F. bianco. — [Apr.—Ott.]

(¹) Freq. nel Sottoceneri, p. es. Mendrisio, Lugano lungo il Cassarate (cat. Lic. cant. Luganop. 52).
(²) D'aggiungere *A. saxatilis* All. S. Salvatore (Lentiechia).

2. **A. hirsuta** Scop. carn. 2. p. 30. (*Turritis hirsuta* L.)
   ⊙ Prati e campi di collina e di montagna = M^ti della Trinità di Locarno — Bignasco (prati).
   F. bianco. — [Mag.—Giug.]
3. **A. alpestris** Reich. colla v. *glabrata* Koch.
   ⊙ Fessure rupi, luoghi scoscesi delle alpi = A. di Piora — A. di V. Bavona e di V. di Peccia.
   F. bianchi. — [Lug.—Sett.]
4. **A. Halleri** L. sp. 929.
   ♃ Fra Pontetresa e Luino (Koch) — presso Belgirate e Mergozzo (Hegetschweiler) — Arona dietro S. Carlo.
   F. bianco, raramente rossastro. — [Ging.—Lug.]
5. **A. Turrita** L. sp. 930.
   ⊙ Fessure rupi e luoghi sassosi di collina e montagna = M. S. Giorgio — Strada fra Melano e Rovio (rupi) — Mendrisio al Paolaccio — Monte nella V. di Muggio (rupi e muri).
   F. bianco. — [Mag.—Ging.]
6. **A. bellidifolia** Jacq. obs. 1. p. 22.
   ♃ Luoghi umidi e fessure rupi nelle alpi fino alla reg. nivale = S. Bernardino — S. Gottardo — A. di Piora presso il lago di Ritom — Forca di Bosco V. Maggia.
   F. bianco. — [Giug.—Ag.]
7. **A. cœrulea** Hænke in Jacq. coll. 2. p. 56.
   ♃ Alpi più elevate ne' luoghi bagnati dalle acque delle nevi = Naret, poco al dissotto del colle che mette nella V. Torta.
   F. ceruleo smunto. — [Lug.—Ag.]

?8. **A. stellulata** (1) Bertolon. amœn. ital. p. 101.
   ♃ M. Generoso (Comolli).
   F. bianco-giallognolo. — [Lug.—Ag.]

Cardamine. (2)

1. **C. alpina** Willd. sp. pl. 3. p. 481.
   ♃ Alpi = S. Bernardino — S. Gottardo — Sopra Cimadera in V. Colla (Comolli).

---

(1) È secondo Nyman una specie del Piemonte, della Lombardia e delle Alpi Apuane. Credo che, dopo Comolli, nessuno l' abbia più vista al Generoso.

(2) D' aggiungere *Cardamine sylvatica* Link. — Freq. dintorni di Lugano come a Rovello, Pazzalino (Lenticchia).

2. **C. resedifolia** L. sp. 913.
   ♃ Frequente nelle alpi granitiche e schistose fra le fessure delle rupi e breccie; scende anche nei monti = S. Bernardino — S. Gottardo — Alpe di Piora — Naret — Forca di Bosco — M. Tamar — M. Camoghè (Comolli) (1).
   F. bianco. — [Giug.—Ag.]

NB. Nelle alpi sopra il lago Nero in V. Bavona e sulla cima di quella della Bolla in V. di Peccia una specie intermedia, forse ibrida, fra l' *alpina* e la *resedifolia*, fu osservata dal Sig. Ball alli 2 Settembre 1863.

3. **C. impatiens** L. sp. 2. 914.
   ⊙ Selve di pianura e di montagna, luoghi scoscesi, prati = Cadenazzo — Golino — Mad. del. Sasso sopra Locarno (2).
   F. bianco. — [Mag.—Lug.]
4. **C. hirsuta** L. sp. 915.
   ⊙ Prati umidi, vigne ecc. = Locarno (ai vigneti e lungo la strada di Solduno).
   F. bianco. — [Mar.—Mag.]
5. **C. pratensis** L. sp. 915.
   ♃ Prati = Tenero (prati del Saliciolo).
   F. bianco. — [Mar.—Mag.]
6. **C. Matthioli** Moretti difesa del Mattioli. (*C. pratensis* L. v. Matthioli Moret.)
   ♃ Prati umidi = Sotto le seghe del Roncaccio presso Locarno — Bironico (prato dietro la casa Ressica) (3).
   F. bianco. — [Mar.—Apr.]
7. **C. amara** L. sp. 915.
   ♃ Fontane e fossi d' acqua corrente e selve umide = Solduno (alle Vettagne) (4).
   F. bianco. — [Mar.—Mag.]

Dentaria.

1. **D. digitata** Lam. Enc. 2. p. 266.
   ♃ Selve di montagna = M. Generoso (Amoretti) — V. Colla (Comolli).
   F. rosso. — [Giug.—Lug.]
2. **D. polyphylla** Waldst. et Kit. pl. r. Hung. t. 160.
   ♃ M. Generoso — A. di Melano (Muret) — M. Bolia (5).
   F. giallognoli. — [Apr.—Mag.]

(1) Anche sui M^ti della V. Colla, p. es. sopra Cimadera (erbar. Lentiecchia).
(2) Lungo il Cassarate presso Lugano (erbar. Liceo di Lugano, cat. p. 52).
(3) Lugano (Favrat).
(4) Nel Luganese comune la v. *micrantha* a 4 stami.
(5) S. Salvatore, S. Giorgio (erbar. Lentiecchia, Muret, Favrat).

3. **D. pinnata** Lamarck enc. 2. 268.
   ♃ Selve di pianura e di montagna = Tenero al Saliciolo — M. Generoso (Amoretti).
   F. bianco. — [Apr.—Mag.]
4. **D. bulbifera** L. sp. 912.
   ♃ Luoghi ombrosi, selve = M. Generoso tra Salorino e Cragno — Melano — M. S. Giorgio — Piede S. Salvatore.
   F. rosso. — [Apr.—Mag.]

Hesperis.

1. **H. matronalis** L. sp. 927.
   Ital. *Viola matronale*, *Violacciocca svizzera*.
   ⊙ Prati e vallette umide = Locarno, sotto Mad. del Sasso, lungo torrente Ramogna.
   F. roseo o violaceo. — [Mag.—Giug.]

NB. Coltivasi nei giardini la varietà *hortensis* a fiori bianchi.

Sisymbrium.

1. **S. officinale** Scop. carn. 2. 26.
   Ital. *Cascellora*, *Erba crociona*, *Erisamo*, *Rapa selvatica*.
   ⊙ Frequente ne' luoghi incolti e lungo strade = Locarno — Bellinzona ecc.
   F. giallo. — [Mag.—Ag.]
2. **S. Sophia** L. sp. 922.
   Ital. *Erba Sofia*.
   ⊙ Luoghi incolti, macerie = Magadino — Airolo — Tra Airolo e Stalvedro (Rhiner).
   F. giallo. — [Mag.—Ag.]
3. **S. Alliaria** Scop. carn. 2. 25 (*Alliaria officinalis* Andrz.)
   Ital. *Alliaria*, *Lunaria selvatica*, *Piè d' Asino*.
   ⊙ Siepi, strade, luoghi ombreggiati = Minusio — Cadenazzo — Bellinzona (1).
   F. bianco. — [Apr.—Mag.]
4. **S. Thalianum** Gaud. fl. helv. 4. 348. (*Arabis thaliana* L. = *Stenophragma thalianum* Celak).
   ⊙ Luoghi aridi, strade, campi = Locarno — Mappo, campi (2).
   F. bianco. — [Apr.—Ott.]

Erysimum.

1. **E. cheiranthoides** L. sp. 923.
   ⊙⊙ Luoghi aridi, strade, prati, campi = M. Generoso (Comolli).
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]

---

(1) Comune nel Sottoceneri, p. es. lungo il Cassarate, a S. Martino presso Lugano.
(2) Frequente nel Sottoceneri, come a Castagnola, S. Giorgio.

2. **E. rhæticum** DC. (*E. pallens* Koch. Syn. 1. 53. = *Cheiranthus pallens* Hall.)
   ♡ Luoghi aprichi di montagna = Olivone — Fusio, strada — Sopra Rovio — Tra Castagnola e Brè, rupi (Favrat).
   F. giallo-chiaro. — [Mag.—Giug.]

Brassica.

1. **B. oleracea** L. sp. 932.
   β. bullata (Ital. *Verza* — Tic. *Verz*).
   γ. capitata (Ital. *Cavolo cappuccio.* — Tic. *Gambiis*).
   δ. caulo-rapa (Ital. *Cavolo rapa.* — Tic. *Cavol-rav.*).
   ε. Botrytis { *Cauliflora* (Ital. *Cavol fiore* — Tic. *Cavol-fiur*).
   Asparagoides (Ital. *Cavoli broccoli* — Tic. *Broccoi*).
   ⊙♡ Coltivate frequentemente tutte queste varietà.
2. **B. Rapa** L. sp. 931. (Ital. *Rapa* — Tic. *Rav*, *Burdun la v. oblonga* [Lugano]).
   ⊙♡ Coltivata.
3. **B. Napus** L. sp. p. 938.
   Ital. *Ravizzone*, *Rapaccione*, *Navone selvatico.* — Tic. *Raviscion.*
   ⊙ Coltivata.

Sinapis.

1. **S. arvensis** L. sp. 933.
   Ital. *Erba falcona*, *Rapaccini.*
   ⊙ Messi e campi = quà e là nel Locarnese (Muralto, Cugnasco) — Lugano — Mendrisiotto ecc.
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]

Erucastrum.

1. **E. obtusangulum** Reichb. fl. exc. p. 693.
   ⊙♡ Arene, ghiaie de' fiumi = Magadino — Locarno (Saleggio) — Tra Cavergno e Foraglio nella V. Bavona — S. Carlo ed a Cevio (greto della Maggia).
   F. giallo. — [Mag.—Ag.]

Diplotaxis.

1. **D. tenuifolia** DC. syst. 2. 632.
   ♃ Luoghi incolti, aridi = Piede S. Salvatore.
   F. giallo-citrino. — [Giug.—Ott.]

Eruca.

1. **E. sativa** Lam. fl. fr. 2. 496.
   Ital. *Eruca*, *Rucula*, *Ruchetta*. — Tic. *Ricola*.
   ⊙ Coltivata.
   F. bianco. — [Mag.—Giug.]

Alyssum. (1)

?1. **A. campestre** L. sp. 909.
   ⊙ Campi. Hegetschweiler la dice crescere nel C. Ticino; io non l' ho potuto trovare, nè so che altri l' abbia trovata.
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]

Lunaria.

1. **L. rediviva** L. sp. 911.
   ♃ Selve scoscese, montane = Magadino nella valletta della Molina (2).
   F. rosco. — [Mag.—Giug.]
2. **L. biennis** Mœnch. Meth. p. 261.
   Ital. *Erba moneta*, *Argentaria*. — Tic. *Erba moneda*.
   ⊙ Coltivata frequentemente ne' giardini a Locarno (3).
   F. rossi. — [Apr.—Giug.]

Draba.

1. **D. aizoides** L. mant. 91.
   ♃ Fessure rupi della reg. alpina e subalp. dai 1300—2500 m. = S. Bernardino — S. Gottardo — Naret — Forca di Bosco.
   F. giallo. — [Giug.—Lug.]
2. **D. tomentosa** Wahlemb. pl. helv. p. 123.
   ♃ Fessure delle rupi granitiche nelle alpi da 1300—2500 m. = S. Gottardo (V.Tremola).
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]
3. **D. stellata** Jacq. En. Vind. p. 113.
   ♃ Rupi calcari dei monti = M. Generoso (Comolli).
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]
4. **D. verna** L. sp. 896. (*Erophila verna* E. Mey.).
   ⊙ Luoghi arenosi, incolti = Solduno (sponda della Maggia) (4).
   F. bianco. — [Febb.—Mar.]

---

(1) D'aggiungere: *A. calycinum* L. — M. Generoso (Mari).
(2) Orrido di Osteno, sulle pareti rocciose umide (erbar. Lenticchia).
(3) Lugano, probabilmente avventizia (Mari). Grem. fl. d. S. p. 108. 1886.
(4) Comune sui muri, luoghi incolti, con parecchie varietà.

Armoracia.

1. **A. rusticana** Fl. d. Wett. K. syn. ed. 1 (*Cochlearia armoracia* L.).
   Ital. *Amoracia, Barba forte, Rafano rusticano, Çrenne.* — Tic. *Çren.*
   ♃ Coltivata ne' giardini = Locarno — Presso Lugano (Mari).
   F. bianchi. — [Mag.—Giug.]

Kernera.

1. **K. saxatilis** Reichen. Fl. germ. p. 669.
   ♃ Luoghi sassosi, rupestri, calcari della reg. alpina e subalpina; scende talvolta alla riva dei laghi = Olivone — Acquarossa — Valle di Peccia — V. Bavona (A. della Bolla) — Lugano, ai piedi del S. Salvatore.
   F. bianco. — [Mag.—Ag.]

Camelina.

1. **C. sativa** Crantz. austr. 1. p. 18.
   Ital. *Çamellina, Dorella, Miagro.*
   ⊙ Coltivata = Cadenazzo.
   F. giallognoli. — [Mag.—Lug.]

Thlaspi.

1. **Th. montanum** L. sp. 902.
   Ital. *Erba storna.*
   ⊙ Campi e luoghi incolti della reg. subalpina = Val di Peccia — Campo V. Maggia.
   F. bianco. — [Giug.—Ag.]
2. **Th. alpestre** L. sp. 903.
   ♃ Rupi e prati = S. Bernardino.
   [Mag.—Giug.]
3. **Th. rotundifolium** Gaud.
   S. Gottardo (Rhiner). ([1])
   F. violetti, raramente bianchi. — [Giug.]

Iberis.

1. **I. umbellata** L. sp. 2. 906.
   ⊙⊙ Coltivata comunemente ne' giardini.
   F. bianchi. — [Giug.—Lug.]

[1] La v. *corymbosum* Gaud. sul Pizzo di Claro (2719 m.), (S. Calloni, ann. C. A. T. 1886. p. 139).

Biscutella.

1. **B. lævigata** L. mant. 225.
   ♃ Comunissima nei prati e luoghi incolti dalla pianura alla reg. delle nevi = Cevio — V. Peccia — Campo V. Maggia — Alpe di Casaccia e di S. Maria (*B. glabra* Gaud.) — piede e cima S. Salvatore.
   F. giallo. — [Giug.—Ag.]

Lepidium.

1. **L. sativum** L. sp. 899.
   Ital. *Agresto.* — Tic. *Agrett.*
   ⊙ Originario dalla Persia. Coltivasi a Locarno.
   F. bianco. — [Giug.]
2. **L. graminifolium** L. sp. 900.
   ⊙ Strade, muri = Lugano — Mendrisiotto (Comolli).
   F. bianco. — [Giug.—Ott.]

Hutchinsia. (1)

1. **H. brevicaulis** Hoppe ap. Sturm. h. 65.
   ♃ Brecce e luoghi sassosi umidi delle alpi da 1900—2500 m. = Naret, salita dal laghetto al varco.
   F. bianco. — [Ag.]

Capsella.

1. **C. Bursa pastoris** Mœnch. Meth. 271.
   ⊙ Campi, vigneti, strade; comunissima in tutto il Cantone.
   F. bianco. Fiorisce quasi tutto l' anno.

Aethiomena.

1. **A. saxatile** Brown. hort. Kew. v. 4. p. 80.
   ♃ Luoghi ghiaiosi, scoscesi di collina e di montagna = Piede S. Salvatore — Piede M. Brè verso Pregassona (P. Agostino) (2).
   F. rosso-carnicini. — [Apr.—Giug.]

---

(1) D'aggiungere: *H. alpina R. Br.*, rocce lungo torrenti sopra Certara in V. Colla (Lenticchia).
(2) V. Blenio (Grem. fl. d. Suis. p. 116. 1886).

Bunias.

1. **B. Erucago** L. sp. 2. 935.
   ⊙ Fra le messi = Tra Magadino e Bellinzona (Comolli) — Alle seghe di Moscia presso il Molino — Arona.[1]
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]

Raphanus.

1. **R. sativus** L. sp. 935.
   A. **R. Radicula**:
   α. radice rotonda (Ital. *Radice*, *Ramolaccio*. — Tic. *Ramolaz*).
   β. radice oblonga (Ital. *Radicine*. — Tic. *Ravanell*).
   B. **R. niger**:
   α. vulgaris.
   β. rotundus.
   γ. subrotundus (Ital. *Ramolaccio nero-scuro*).
   ⊙⊙ Coltivasi tutte queste varietà negli orti.
   F. rossi. — [Mag.—Giug.]
2. **R. Raphanistrum** L. sp. 925. (*Raphanistrum Lampsana* Gärtn.)
   Ital. *Ramolaccio selvatico*, *Rafanistro*.
   ⊙ Campi fra le messi = Olivone.
   F. giallo-pallidi. — [Giug.—Lug.]

Fam. Capparideae.

Capparis.

1. **C. spinosa** L. sp. 720.
   Non trovasi spontanea, nè coltivasi nel Cantone, bensì alle isole Borromee e a Como in riva al lago.

Fam. Cistineae.

Cistus.

1. **C. salvifolius** L. sp. 738.
   Ital. *Brentine*, *Cisto femmina* — Tic. *Reus bianc del Sas* (Locarno).
   ♄ Luoghi scoscesi, aprichi = Locarno (Mad. del Sasso, strada d' Orselina, dei Monti; alle Fracce lungo strada da Brione alle Mondacce) — Tra Ascona e Ronco (strada) — Lugano? (Hegetschweiler)[2].
   F. bianco con la ugna dei petali macchiata di giallo. — [Mag.—Giug.]

---

[1] M. Generoso (Mari).
[2] Credo non sia stato finora trovato a Lugano.

Helianthemum.

1. **H. Fumana** Mill. dict. n. 6.
   ♄ Colli aprichi, sassosi = Tra Lugano e Gandria (strada e rupi) — M. S. Salvatore, anche al suo piede.
   F. giallo. — [Giug.—Lug.]
2. **H. œlandicum** Wahlemb. Fl. suec. p. 333.
   Ital. *Eliantemo supino.*
   ♄ Rupi subalpine e alpine fino alle nevi perenni = S. Bernardino (rupi dell' A. di Vignone a 1900 m.).
   F. giallo. — [Mag.—Ag.]

?3. **H. salicifolium** Persoon. Syn. 2. p. 78.
   Ital. *Eliantemo salcerello.*
   ⊙ Luoghi aprichi = Mendrisiotto (Dr. Ferrini, giusta alcuni esemplari trovati nelle reliquie del suo erbario). Nel Ticino (Hegetschweiler, Moritzi). Non fu più trovato e manca negli erbari svizzeri di Muret e di Schleicher. (Conf. Gremli Beitr. 1870.)

4. **H. vulgare** Gärtner frmt. 1. t. 76.
   Ital. *Eliantemo.*
   ♄ Brughiere, pascoli, prati secchi, margine delle selve di pianura e di montagna, letto torrenti = Locarno — Brissago (colle varietà *obscurum Pers.*, *tomentosum* K.) (1).
   F. giallo. — [Mag.—Sett.]
5. **H. polifolium** Koch. (*Cistus polifolius* L. sp. 745).
   ♄ Colli e monti aprichi, calcarei = S. Salvatore (Dr. Ferrini, Muret, Favrat ecc.) — M. Generoso (Amoretti) (2).
   F. bianco. — [Giug.—Lug.]

Fam. Violaceae.

Viola. (3)

1. **V. palustris** L. sp. 2. 1324.
   ♃ Luoghi umidi, lungo i rivi tanto della pianura che delle montagne e delle alpi le più eccelse = Mappo (prati del Saliciolo a 250 m.) — Campo V. Maggia a 1350 m. — S. Bernardino a 1400 m. — S. Gottardo (Hegetschweiler).
   F. ceruleo-smunto con vene violacee. — [Mar.—Lug.]

---

(1) Comune anche nel Sottoceneri; la v. *tomentosum*, tra Castognola e Brè (Favrat) e la v. *grandiflorum* K. sulla cima del S. Salvatore (Lenticchia)

(2) Nelle vicinanze di Locarno non fu ancora trovato, nonostante siavi indicato da Comolli (V. Comolli Fl. com. v. 4°. p. 157).

(3) D' aggiungere: *V. Riviniana* Rchb. Dintorni Lugano (Mari), Losone (Lenticchia).
V. sylvatica Fr. Comune ne' dintorni di Lugano, p. es. a Pazzalino (Mari).
V. collina Bess. Sottoceneri (Mari).
V. Dubyana Burnat. = *heterophylla* Bertol. ex. parte. Corni di Canzo e Grigna (Christ).
V. montana DC. = lungo la strada da Locarno a Ponte Brolla (Jäggi e Schröter).

2. **V. hirta** L. sp. 1324.
   ♃ Prati secchi, declivi erbosi, vigneti, frutteti = Locarno — Gandria ecc.
   F. ceruleo-sbiadito. — [Mar.—Apr.]
3. **V. ambigua** Koch non W. K. (V. Thomasiana Perr. Song.).
   ♃ Saleggio di Locarno — M. Camoghè — M. Tamar(1) — M. Ceneri — Tra Luino e Ponte Tresa (Favrat).
   [Apr.—Ag.]
4. **V. multicaulis** Jord. (2)
   ♃ Ronco d' Ascona. — [Apr.]
5. **V. odorata** L. sp. 1324.
   Ital. *Viola mammola.*
   ♃ Siepi, prati, selve di pian. e di mont ; freq^{ma} = Locarno — Bellinzona — Cevio — Lugano ecc.
   [Feb.—Apr., talvolta in Ott. e Nov.]
6. **V. canina** L. sp. 1324.
   ♃ Siepi, selve; freq. = Locarno, valleta della Gutta — Tra Losone e Golino ecc.
   F. ceruleo-pallido. — [Mar.—Apr.]
7. **V. alba** Bess., colle v. a) *virescens* Jord., b) *scotophylla* Jord.
   ♃ Come la precedente = Ponte Brolla — Canovascie presso Locarno — Freq. a Castagnola e Gandria la v. *scotophylla* ecc.
   F. bianco a sperone verde (v. a), a sperone violetto (v. b). — [Mar.—Apr.]
8. **V. stagnina** Kitaibel in Schult.
   ♃ Letto asciutto di un torrente a Solduno presso Locarno, sopra le Vettagne — M. Generoso (Moretti).
   F. bianco o bluastro. — [Mag.—Giug.]
9. **V. biflora** L. sp. 1326.
   ♃ Luoghi sassosi ombreggiati nella reg. mont. e alp., talvolta anche al piano lungo torrenti = S. Bernardino — Campo V. M. — Golino, rivo de' Mulini — M. Camoghè — M. Tamar — M. Generoso.
   F. giallo. — [Mag.—Ag.]
10. **V. tricolor** L. sp. 1326 (3).
   ⊙ Strade, fra le messi; dal piano alle alpi = Locarno — Campo V. M. — S. Bernardino.
   F. giallo-violaceo-ceruleo. — [Apr.—Ott.]

(1) Il Dr. S. Calloni ha trovato sul Tamar, poco sotto l' alpe Pongelli, una v., da lui denominata *Riverana* dal paese di *Rivera* (ann. C. A. T. 1886. p. 106). La specie si trova anche più in basso, come ne' colli presso Muzzano.

(2) Probabilmente alba × odorata.

(3) Di questa specie si hanno le v. a) *arvensis,* comune ne' prati, campi; b) *segetalis,* più rara; c) *alpestris,* d) *bella,* nelle montagne.

11. **V. calcarata** L. sp. 132.
♃ Pascoli alpini = S. Bernardino, A. di Vignone.
F. violaceo, raramente giallo o bianco. — [Lug.]

Fam. Resedaceae.

Reseda.

1. **R. lutea** L. sp. 1. 645.
⊙ Margine de' campi = Fra Bellinzona e M. Carasso.
F. giallo. — [Mag.—Giug.]
2. **R. luteola** L. sp. 643.
Ital. *Biondella, Erba gialla, Erba guada, Guadarella dei tintori.* — Tic. *Erba gialdina.*
⊙ Luoghi arenosi, incolti = Vicinanze di Lugano.
F. giallognoli. — [Giug.—Lug.]
3. **R. odorata** L. sp. 646.
Ital. *Amorino.* — Tic. *Miglionett.*
⊙ Coltivasi comunemente ne' giardini.
F. verde-violaceo. — [Mar.—Nov.]

Fam. Droseraceae.

Drosera.

1. **D. rotundifolia** L. sp. 1. 402.
Ital. *Rosolida.*
⊙⊙ Luoghi uliginosi, fra gli stagni; mai però ne' luoghi ombreggiati = Vettagne presso Locarno — Mappo presso le seghe del Roncaccio — Sopra Moscia (prati).
F. bianco. — [Giug.—Lug.]
2. **D. intermedia** Hayn. Schrad. journ. 1801. 37.
⊙ Prati uliginosi = Tra Losone e Ronco d'Ascona al piano del Mulino de' Serazzi — M. Ceneri (Muret, Favrat).
F. bianco. — [Giug.—Ag.]
3. **D. longifolia** L. sp. 501. (*D. anglica Huds.*)
⊙ Luoghi uliginosi = Prati sopra Moscia.
F. bianco. — [Giug.—Lug.]

Parnassia.

1. **P. palustris** L. sp. 391.
Ital. *Gramigna di Parnasso. Parnassia.*
♃ Prati umidi del piano e del monte fino a 2250 m. = Solduno alle Vettagne — Auressio — Cevio — Campo V. M. — S. Gottardo — Ambri — Comoghè — M^i della V. Colla (Lenticchia) ecc.
F. bianco. — [Mag.—Ag.]

Fam. Polygaleae.

Polygala.[1]

1. **P. Chamaebuxus** L. sp. 989.

   ♄ Luoghi aspri, scopeti, fra cespugli; ascende fino a 1700 m., talvolta a 2000 m. = Locarno (rupi sotto Mad. del Sasso) - S. Salvatore e Gandria (Lenticchia)[2].

   F. giallo, macchiato di rosso. — [Mag.—Giug.]

2. **P. austriaca** Crantz (*P. amara* auct. non L. sp. 987)[3].

   ♃ Prati umidi, luoghi torbosi; dal piano alle alpi più elevate = Locarno — Piano Albigo — Campo V. M. — Gudo, ne' prati sotto la Malacarne.

   F. azzurro, bianchiccio nella varietà β. — [Mag.—Lug.]

[1] Il Signor Dre R. Chodat, Docente privato all' Università di Ginevra, che si è occupato in modo speciale delle *Polygale* della Svizzera, ha avuto la compiacenza di comunicarci le seguenti note sulle *Polygale* del C. Ticino:

P. amara Jacq.
(specie tipica mancante nel Ticino).
subspec. *amarella*, comune colle sue
v. *vulgatissima* e *austriaca* Chod.

P. Nicaensis Risso.
subspec. *mediterranea*.
v. *insubrica*. — Conservata nell' erbario Delessert colla etichetta „Lugano"; è dunque da ricercarsi in questa località.

P. microcarpa Kerner (*P. alpestris* Rchb.).
v. *elliptica* — V. Calanca (Calvarese).
v. *condensata*.

P. vulgaris L.
subspec. *genuina*, abbastanza rara.
v. *insubrica* Chod. — Locarno (Prof. Dr Huguenin).
subspec. *comosa*.
v. *pyramidalis*, rara.
v. *stricta* — V. Leventina.
v. *Gremlii* Chodat.

La *P. Nicaensis*, che Franzoni indica a Brissago, è probabilmente la *P. corsica* Gremli, la quale non è la *P. corsica* Bor., come credono Gremli e Lenticchia, ma semplicemente una var. interessante della *P. vulgaris* subsp. *comosa*, cui il Sigr Chodat dà il nome di *Gremli*. Questa var. compare sotto parecchie forme nel Ticino, le quali sono dal Sigr Chodat così distinte:

α. *forma genuina* — Stalvedro, Airolo;

β. *forma elongata* — V. Malenco, Sondrio, Bellaggio, Como (Brügger), M. Generoso (Siegfried), Lugano (Schulthess, Chodat), Castagnola e Gandria (Christ);

γ. *forma alpestris* — Mti di Arvigo in V. Calanca (1500—2000 m.).

La descrizione di tutte queste forme sarà data nel lavoro del Signor Chodat „*Révision des Polygala suisses*" che è attualmente in corso di stampa pel Bollettino della società botanica di Ginevra (Schröter).

[2] Comune la v. *rhodoptera* nei colli e monti del Sottoceneri, come al S. Salvatore, M. Brè, Bolia ecc.

[3] Differisce poco dalla *P. vulgaris* L. solo per la radice più sottile e biancastra, per le foglie inferiore obovate ed i fiori molto più piccoli e per lo più cerulei.

3. **P. Corsica** Bor. (*P. Nicæensis* auct. non Risso. Conf. Gremli fl. d. l. Suisse 126. 1886).
Prati di Losone, Brissago (Dr. C. Bolle) — Val Calanca (Gremli) — Castagnola e Gandria (Christ) — Salvatore, Crespera e Cadro (Lenticchia).
F. azzurro o rossastro. — [Mag.]

4. **P. vulgaris** L. sp. 986 (1) con la var. *comosa* Schkuhr.
♃ Prati aridi di pianura e di montagna = Sopra Cavigliano — M^ti sopra Locarno — Bignasco — Luganese.
F. rosso.. — [Mag.—Giug.]

Fam. Sileneae.

Gypsophila.

1. **G. repens** L. sp. 581.
♃ Rupi e frane ghiaiose; dai 1000—2000 m. = Campo V. Maggia — Forca di Bosco — Campo alla Torba — S. Bernardino.
F. bianco o roseo. — [Lug.—Ag.]

2. **G. muralis** L. sp. 583.
⊙ Muri vecchi, rupi, luoghi aridi; dal piano fino a 340 m. = Locarno nel Saleggio e lungo strada della Mad. del Sasso — Tra Gudo e Cugnasco — Tra Riazzino e Gordola — Tra Manno e Bioggio, lungo strada.
F. roseo. — [Lug.—Ag.]

Tunica.

1. **T. Saxifraga** Scop. carn. ed. 2. vol. 1. p. 300.
♃ Luoghi sassosi di collina e fra le ghiaie, campi, lungo strade = Lugano, al piè del S. Salvatore.
F. roseo. — [Lug.—Ag.]

Dianthus. (2)

1. **D. prolifer** L. sp. 1. 587 (*Tunica prolifera* Scop.).
Ital. *Strigoli*, *Violine di tallo*.
⊙ Luoghi arenosi, aprichi di pianura = Consiglio Mezzano verso S. Biagio presso Locarno.
F. roseo-smunto. — [Giug.—Lug.]

---

(1) La v. *alpestris* (*P. alpestris* Rchb.) sui M^ti calcari nel Sottoceneri, p. es. sopra Cimadera in V. Colla (erbar. Lenticchia).

(2) Aggiungere: D. atrorubens All. Presso Ponte Tresa, verso Luino (Favrat, in Gremli ed. franc. 1886 p. 129).

2. **D. Armeria** L. sp. 586.
Ital. *Viola di lepre*, *Violine a mazzetti*.
⊙ Selve, siepi, luoghi incolti — Locarno.
F. rossiccio. — [Giug.—Lug.]
3. **D. barbatus** L. sp. 586.
♃ Coltivata ne' giardini assai frequentemente.
F. rossi, screziati, rosei. — [Giug.—Lug.]
4. **D. Carthusianorum** L. 1. sp. 586.
Ital. *Garofano selvatico*. — Tic. *Garofolitt*.
♃ Prati aridi; dal piano fino alle alpi — Locarno — Campo V. Maggia — Luganese.
F. rosso. — [Mag.—Lug.]
5. **D. vaginatus** Chaix. (D. **atrorubeus** auct. non All.).
♃ Pascoli aprichi di collina, di montagna e delle alpi = Sopra Locarno (non raro) — Generoso — Gandria.
F. rosso. — [Mag.—Lug.]
6. **D. Segnieri** Vill. Delph. 3. 594.
♃ Colli erbosi e fra virgulti — Losone sotto Mad. Fontana — V. Maggia — Val Isone — Locarno — Lugano — Gandria — Generoso — Bolia ecc.
F. rosso. — [Giug.—Ag.]
7. **D. collinus** WK. pl. rar. h. 1. t. 38 (¹).
Rupi = Locarno — Bellinzona.
[Lug.—Ag.]
8. **D. deltoides** L. sp. 586.
♃ Selve, prati, pascoli = Locarno, nelle selve sopra Mad. Sasso.
F. rosso. — [Lug.—Ag.]
9. **D. sylvestris** Wulfen in Jacq. collect. 1. 237.
♃ Rupi — Campo V. Maggia — M. Generoso — Cavigliano — Somascona ecc.
F. rossi. — [Giug.—Sett.]
10. **D. Caryophyllus** L. sp. 210.
Ital. *Garofano*. — Tic. *Garoffol*.
♃ Coltivasi nei giardini in molte varietà.
F. bianchi, rossi, rosei, gialli. — [Giug.—Sett.]
11. **D. cæsius** Smith. act. soc. lond. 2. p. 302. (*D. cæsius L. β.*)
♃ S. Bernardino.
F. rosei. — [Lug.]
12. **D. superbus** L. sp. 589.
⊙ o ♃ Prati umidi di collina e di montagna = M. Generoso — S. Jorio.
F. rossi, odoratissimi. — [Giug.—Sett.]

¹) Var. del D. Segnieri Vill. a fiori serrati in uno spesso ciuffo.

13. **D. monspessulanus** L. sp. 588 (1).
    ♃ Prati di montagna = M. S. Giorgio.
    F. rosa. — [Lug.—Ag.]

Saponaria.

1. **S. Vaccaria** L. sp. 585. (*Vaccaria parviflora* Mönch.)
    ⊙ Campi, fra le messi = Mendrisiotto ecc.
    F. rosso. — [Giug.—Lug.]
2. **S. officinalis** L. sp. 584.
    Ital. *Saponaria, Saponella.* — Tic. *Seponaria.*
    ♃ Ghiaie de' torrenti, fiumi, siepi della pianura e collina = Locarno (alveo Maggia) — Sotto Mad. Sasso (fra virgulti) — Tenero (alveo Versasca) — Lungo il Cassarate (Lenticchia) ecc.
    F. carnei-sbiaditi. — [Giug.—Ag.]
3. **S. ocymoïdes** L. sp. 585.
    ♃ Terreni incolti, rocce = Locarno — V. Maggia — Tra Gudo e Sementina — Tra Maroggia e Bissone ecc. (2).
    F. roseo. — [Mar.—Mag.]

Cucubalus.

1. **C. bacciferus** L. sp. 591.
    ♃ Siepi e fra virgulti = Tenero al Salciolo — Losone — Lugano — Agno — Tra Cernese e S. Pietro Pambio — Balerna, tra S. Antonio e Pontegana.
    F. bianco, bacca nera. — [Giug.—Ag.]

Silene.

1. **S. gallica** L. sp. 595.
    ⊙ Campi arenosi = Piano di Magadino — Tra il Ponte di Cugnasco e Contone — Vicinanze di Mendrisio.
    F. rosso. — [Giug.—Lug.]
2. **S. italica** Pers. Syn. 1. 497.
    ♃ Prati, pascoli, luoghi sassosi, aprichi = M. Generoso (prati).
    F. bianco. — [Giug.—Lug.]
3. **S. nutans** L. sp. 596.
    ♃ Colli erbosi, prati, rupi; dalla pianura fino alla reg. alpina = Locarno alla Mad. del Sasso, alle Fraccie — Campo V. Maggia (rupi) — Sottoceneri, comune.
    F. bianco. — [Apr.—Sett.]

---

(1) È comune sui M^ti. della V. Colla, al Generoso (erbar. Lenticchia, Muret, Favrat).
(2) Si eleva anche sui M^ti., come al S. Salvatore, M. Generoso.

4. **S. insubrica** Gaud. (1)
M. Generoso e S. Giorgio (prati).
[Giug.—Lug.]

5. **S. otites** Smith. fl. brit. 2. p. 469.
♃ Alveo fiumi, colli incolti, strade — Locarno (ghiaie e pascoli lungo la Maggia) — Biasca (ghiaie del Ticino) — Lugano (pie del S. Salvatore lungo strada) — Gaudria.
F. verdognolo. — [Mag. - Ag.]

?6. **S. parviflora** Hegetschw. Fl. der Schweiz 418.
♃ Luoghi sterili = Vicinanze di Mendrisio.
F. verdognolo. — [Mag.—Giug.]
Oss. Sembra var. della S. otites, da cui non differisce che per la piccolezza dei fiori e il minor numero e per la statura più piccola.

7. **S. inflata** Smith. fl. br. 2. p. 467.
Ital. *Bobbolini*, *Erba del Cucco*, *Strigoli*. — Tic. *Verzin*, *Bacciocchin*.
♃ Prati, luoghi sassosi, inculti; freq^{mo} = Locarno — Bellinzona — Campo — Sottoceneri ecc.
F. bianco. — [Giug.—Lug.]

8. **S. noctiflora** L. sp. 1. 599. (*Melandrium noctiflorum F.*)
Oss. Il fu Dott. Ferrini disse averla raccolta presso Brissago, ma non mi fu fatto di rinvenirla ancora colà, nè di trovarla nel suo erbario.

9. **S. Armeria** L. sp. 601.
Ital. *Silene a mazzetti*.
⊙ Luoghi arenosi, rupestri = Locarno (alveo e rive della Maggia) — V. Maggia.
F. rosso. — [Mag.—Giug.]
Oss. Si coltiva.

10. **S. Saxifraga** L. sp. 1. 602.
♃ Luoghi arenosi di montagna = M. Generoso — M. S. Salvatore.
F. bianco. — [Giug.—Lug.]

11. **S. quadrifida** L. sp. 1. 602. (*Heliosperma quadrifidum* Rchb.)
♃ Rupi umide delle alpi = M. Generoso — M. Camoghè — Cime della V. Morobbia.
F. latteo. — [Lug.—Ag.]

12. **S. rupestris** L. sp. 1. 602.
♃ Luoghi rupestri aridi delle reg. subalpina e alp. e scende sin quasi a 240 m. = Locarno (rupi sotto Mad. Sasso) — Navegna (presso l'acqua minerale) — Tra Solduno e Ponte Brolla (rupi) — Cevio — Campo V. M. — V. di Peccia ecc.
F. bianco. — [Mag.—Sett.]

(1) È la *S. nutans* L. v. *livida* Willd.

13. **S. acaulis** L. sp. 1. p. 603 (1).
    ♃ Luoghi rupestri della reg. subalpina e alpina fino alle nevi eterne = Motto Minaccio — Forca di Bosco — Campo alla Torba — S. Bernardino — S. Gottardo — All' Uomo sopra l' Alpe di Piora — Lucomagno — Camoghè.
    F. rosso. — [Giug.—Ag.]

Lychnis.

1. **L. Viscaria** L. sp. 1. 625. (*Viscaria vulgaris* Rchb.)
    ♃ Frequente ne' declivi erbosi e prati; non ascende oltre 410 m. = Locarno — Solduno — Orselina — Lugano — Ponte Tresa ecc.
    F. rosso. — [Mag.—Giug.]
2. **L. flos cuculi** L. sp. 625.
    Ital. *Fior del cuculo*, *Margaritine rosse*, *Violine da prato*.
    ♃ Prati fertili e luoghi selvatici, umidi = Locarno — Bellinzona — Lugano. ecc.
    F. carnei, talvolta bianchi (Locarno). — [Mag.—Lug.]
3. **L. vespertina** Sibth. oxon. p. 146. (*Melandrium vespertinum* Marieno. = *M. album* Garck.)
    ♃ Luoghi incolti, prati aridi, strade, campi = Locarno — Tenero ecc.
    F. bianchi, raramente rossi, odoratissimi, aperti in sulla sera. — [Mag.—Ag.]
4. **L. diurna** Sibth. oxon. p. 145. (*Melandrium diurnum* Crép. = *M. rubrum* Garck.)
    ♃ Tra virgulti, luoghi selvatici all' umido, lungo rivi e fiumi = Tenero alla Verzasca — Campo V. Maggia (prati) — S. Giacomo sopra Mesocco (prati) (2).
    F. rosso inodoro, raram. bianco. — [Mag.—Giug.]
5. **L. Coronaria** Lamarck enc. 3. 643.
    Ital. *Crotonelle*, *Coronaria*. — Locar. *Vellutin*.
    ⊙ Luoghi rupestri = Locarno, sotto Mad. del Sasso.
    F. purpurei e rossi. — [Giug.]
    Oss. Frequentemente coltivato ne' giardini, forse potrebbe essere migrato dai giardini del convento del Sasso nella indicata località, però vi cresce in copia e vi si è naturalizzato.
6. **L. flos Jovis** Lamarck enc. 3. 644.
    ♃ Prati di montagna, declivi aprichi = M. Generoso, all' A. di Melano.
    F. carneo. — [Giug.—Lug.]

Agrostemma.

1. **A. Githago** L. sp. 624.
    Ital. *Campanelle*, *Erba Nocca*, *Gettone*, *Mazzincollo*. — Tic. *Giotton*.
    ⊙ Nelle messi, massime nei campi di segale = Solduno — Ascona — Bellinzona ecc.
    F. roseo. — [Giug.—Lug.]

---

(1) La v. *excapa* All. al Pizzo di Claro, Calloni (Ann. C. A. T. 1886. p. 139).
(2) Lungo Cassarate presso Lugano (erbar. Lentecchia).

Fam. Alsineae.

Sagina.

1. **S. procumbens** L. sp. 1. 185.
   ♃ Lungo le strade, ne' luoghi umidi, presso le case, nei muri = Locarno (strada) — Muralto (riva del lago) — Loco (strada alla chiesa) ecc.
   F. bianco. — [Apr.—Mag.]

?2. **S. depressa** Schultz. (*S. ciliata* Fr. β)
   ⊙ Loco, presso la chiesa.
   Oss. V. Gremli Beitr. p. 63.

3. **S. apetala** L. mant. 559.
   ⊙ Luoghi aprichi, aridi, strade = Soldumo — Orselina.
   F. bianco. — [Mag.—Giug.]

Spergula.

1. **S. saginoides** L. sp. 1. 631. (*Sagina Linnaei* Presl.)
   ♃ Luoghi rupestri, muscosi della reg. subalpina e alp. = S. Gottardo — Presso Lugano? (Suter.)
   F. bianco. — [Giug.—Lug.]

2. **S. subulata** Swarz. in act. Holm. 1789. p. 45.
   ♃ Luoghi umidi, sabbiosi = M. S. Salvatore presso Lugano.
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]

3. **S. arvensis** L. sp. 1. 360.
   Ital. *Erba renajola, Renajola, Spergola.*
   ⊙ Campi, fra le messi; dalle rive dei laghi fino a circa 1300 m. = Mappo (riva del lago) — Brione — Artore presso Bellinzona — Cimalmotto.
   F. bianco. — [Giug.—Ag.]

Lepigonum.

1. **L. rubrum** Wahlenberg. (*Spergularia rubra* Presl.)
   ⊙ Lungo strade, rive sabbiose; dal piano alle alpi = Mappo (riva del lago) — Bellinzona — Tra Polleggio e Giornico — Cadenazzo — Tra Gudo e Cugnasco — Ascona (strada) — Lugano — Manno.
   F. rosso. — [Mag.—Ott.]

Facchinia.

1. **F. lanceolata** Reichenb. (*Alsine lanceolata* M. K.)
   ♃ Fessure delle rupi alpine nelle regioni più elevate = Forca di Bosco V. M. (2326 m.).

Alsine. (1)

1. **A. laricifolia** Wahlenb. fl. carp. p. 133.
   ♃ Pascoli aridi e rupi; 510—1300 m. = Passo Nufnen — S. Gottardo sotto il Motto Bertola — Tra Fontana e Airolo (strada) — Sotto Ronco di Leventina (rupi) — Foroglio in V. Bavona (pascoli aridi) — Cevio, greto della Maggia (Lenticchia).
   F. bianco. — [Giug.—Sett.]
2. **A. verna** Bartling. Beitr. 2. 63.
   ♃ Pascoli sassosi della reg. subalp. e alp. = M. Tamar, all' A. di Caneggiolo — Camoghè — Forca di Bosco — Naret — S. Gottardo — S. Bernardino.
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]
3. **A. Villarsii** Mert. et Koch. D. fl. 3. 282.
   Rupi subito sotto Campo in V. Bavona — Generoso (Mari).
   F. bianco. — [Ag.]
4. **A. recurva** Wahlemberg. helv. p. 87.
   ♃ Luoghi aprichi fra le rupi delle somme alpi = Forca di Bosco — S. Gottardo.
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]
5. **A. tenuifolia** Wahlemberg.
   Margine campi aprichi sopra Salorino ecc.
   F. bianco. — [Mag.]

Cherleria.

1. **C. sedoides** L. sp. 1. 608. (*Alsine Cherleri* Fenzl.)
   ♃ Rupi delle alpi elevate fino alla regione nivale, da 1700—2700 m. = Motto Minaccio sopra Campo V. Maggia — Forca di Bosco — Naret — S. Gottardo — S. Bernardino.
   [Lug.—Ag.]

Mœhringia.

1. **M. muscosa** L. sp. 1. 515.
   ♃ Rupi ombrose e boschi della reg. montana e subalpina = Bignasco — Tra Someo e Rivè (boschi castanili, fra sassi) — Camoghè — M. Ceneri.
   F. latteo. — [Mag. et Ag.]
2. **M. polygonoides** M. et K. D. fl. 3. 272.
   ♃ Pascoli sassosi e frane, da 1900—2500 m. = Forca Bosco V. M.
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]
3. **M. trinervia** (Clairville man. d' herboris. p. 150).
   ⊙ Selve umide, lungo torrenti, vallette = Locarno (valleta della Ramogna) ecc.
   F. bianco. — [Mag.—Ag.]

---

(1) Aggiungere *A. Bauhinorum* Gay = *liniflora* Heg. Gandria? (Ducommun.)

Arenaria.

1. **A. serpyllifolia** L. sp. 606.
   ⊙ Campi, luoghi arenosi, strade, muri dal piano alle alpi = Locarno — Solduno — Bellinzona — S. Bernardino — Campo V. Maggia — Salorino sopra Mendrisio.
   F. bianco. — [Ging.—Ag.]
2. **A. Marschlinsii** Koch. Tasch. der Deutsch. u. Schw. Fl. p. 83. (*A. serpyllifolia* L. *β. alpina* Gaud.)
   ⊙ Sulle più alte vette alpine = S. Bernardino (Bamberger).
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]
3. **A. ciliata** L. sp. pl. 2. 608.
   ♃ Luoghi ghiaiosi delle alpi = S. Gottardo — S. Bernardino.
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]
4. **A. biflora** L. Mant. 78.
   ♃ Luoghi rupestri, umidi, ghiaiosi, da 1280—2240 m. = Forca di Bosco V. Maggia — Sulla cima tra il lago Nero di V. Bavona e l' A. della Bolla in V. di Peccia — S. Gottardo — All' Uomo sopra l' A. di Piora.
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]

Holosteum.

?1. **H. umbellatum**(1) L. sp. 1. 130.
   Ital. *Garofolino.*
   ⊙ Campi di pianura = Mendrisiotto?
   F. bianco. — [Mar.—Apr.]

Stellaria.

1. **S. cerastoides** L. sp. 604. (*Cerastium trigynum.* Vill.)
   ♃ Luoghi umidi nelle alpi fino a 1984 m. = S. Gottardo presso l' Ospizio.
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]
2. **S. nemorum** L. sp. 603.
   ♃ Luoghi ombrosi nelle selve, lungo torrenti, fra virgulti, dal piano alla reg. subalp.; non rara = Locarno (valleta della Guta, della Ramogna e del Rebissale, fra Orselina e Brione) — M. Tamar, A. di Cortenovo.
   F. bianco. — [Mag.—Lug.]
3. **S. media** Vill. Delph. 3. p. 615.
   Ital. *Centocchio, Erba gallinella, Peperina.* — Tic. *Peverina, Peverella.*
   ⊙ Orti, campi, strade; dapertutto = Locarno — Canovascie ecc.
   F. bianco. — [Feb.—Nov.]

---

(1) Cattiva erba conosciuta nel Mezzogiorno; probabile è la sua esistenza nel Ticino.

?4. **S. holostea** L. sp. 603.
♃ Siepi, selve di collina = Nel Cantone (Comolli) — Frequente sul Monterone ed anche al suo piede presso Crescinale.

5. **S. graminea** L. sp. 604.
♃ Siepi, fra virgulti, prati, selve = Minusio alla Navegna (siepi) — Melirolo in V. Marobbia — Castagnola (Lentiechia).
F. bianco. — [Mag.—Lug.]

6. **S. uliginosa** Murray. prod. stirp. gött. p. 55. 1770.
Ital. *Budelline d' acqua.*
⊙ o ♃ Sponde ruscelli, torrenti, in coll. e mont. = Orselina, nella valletta del Rebissale (v. *apetala*) — Locarno, alla Guta.
F. bianco. — [Mag.—Lug.]

Malachium.

1. **M. manticum** Reichenb. fl. exc. p. 795. (*Cerastium manticum* L.)
⊙ Luoghi erbosi, prati, strade, fra le messi = Strada fra Ascona ed il ponte della Maggia — Ponte Brolla (prati) — Mesocco (strada) — Camignolo (prati e strada) — Selve presso Chiasso e Balerna (Mari) — Cremenaga.
F. bianco. — [Mag.—Lug.]

2. **M. aquaticum** Fries. fl. halland. p. 77. (*Cerastium aquaticum* L.)
Ital. *Budelline d' acqua.*
♃ Luoghi umidi, fra virgulti, lungo ruscelli = Locarno, valletta della Guta — Vicinanze d' Agno e della Tresa.
F. bianco. — [Giug.—Lug.]

Cerastium. (1)

1. **C. glomeratum** Thuillier. fl. par. 225. (*C. vulgatum* Herbar. Lin.)
Ital. *Orecchie di topo.* — Tic. *Peverina.*
⊙ Luoghi aridi, campi, prati = Locarno — Cevio — Bellinzona.
F. bianco. — [Mag.—Ag.]

2. **C. semidecandrum** L. sp. pl. p. 627.
⊙ Bellinzona, agli argini del torrente Dragonato — Locarno, alla Mad. del Sasso, cappella rossa — Fondo Von Mentlen. a Bellinzona.
F. bianchi. — [Apr.—Mag.]

---

(1) Aggiungere: *C. brachypetalum* Desp. — Sulle rocce soleggiate a Ponte Cassarina e sui vecchi muri nei dintorni di Lugano. Comincia a fiorire alla fine di Marzo (Lentiechia).

3. **C. triviale** Link. en. h. berol. 1. p. 433.
   ⊙ Campi e luoghi incolti = Locarno (anche v. *holosteoides* Fries.).
   F. bianco. — [Mag.—Giug.]
4. **C. latifolium** L. sp. 1. 629.
   ♃ Alpi da 1700—2400 m.; frequente — S. Gottardo — Naret — M. Camoghè (Comolli).
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]
5. **C. alpinum** L. sp. 1. 628.
   ♃ Alpi, frequente = M. Minaccio — Forca di Bosco — Naret — S. Gottardo — S. Bernardino.
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]
6. **C. arvense** L. sp. 1. 628.
   ♃ Campi, colli aprichi, muri, strade — Visletto presso Cevio (muri) — Tenero — Airolo. (¹)
   F. bianco. — [Apr.—Lug.]

Fam. Elatineae.

Elatine.

1. **E. hexandra** DC. fl. fr. 5. p. 609.
   ⊙ Luoghi umidi, inondati, lungo rive fiumi e laghi = Rive del lago Maggiore a Muralto — Piano di Magadino, fossi.
   F. rosso. — [Giug.—Ott.]
2. **E. alsinastrum** L. sp. 526.
   ♃ Fossi, luoghi paludosi, presso i laghi = Agno — Riva S. Vitale (?).
   F. bianco-verdognoli — [Lug.—Ag.]

Fam. Lineae.

Linum.

1. **L. tenuifolium** L. sp. 398.
   ♃ Luoghi sassosi e secchi, colli e monti calcari = M. S. Salvatore presso Lugano — Tra Castagnola e Gandria.
   F. rosso-lilacini. — [Lug.—Sett.]
2. **L. usitatissimum** L. sp. 1. 397.
   Ital. *Lino*. — Tic. *Lin*.
   ⊙ Coltivasi = V. Maggia (fino a Campo e a Bosco V. M.) — Airolo — Olivone — Agno ecc.
   F. ceruleo-vivo. — [Apr.—Lug.]

(¹) Generoso (Mari). La var. *strictum*, Gottardo ecc. (Favrat).

3. **L. alpinum** L. (*L. montanum* Schl.)
   ♃ Prati di mont. = M. Camoghè e Generoso (Comolli). (Conf. Gremli ed. franc. 1886).
   F. ceruleo. — [Giug.—Lug.]
4. **L. catharticum** L. sp. 1. 401.
   ⊙ Prati e pascoli di pian. e mont. = Locarno.
   F. bianco. — [Apr.—Ag.]

Fam. Malvaceae.

Malva.

1. **M. Alcea** L. sp. 1. 971.
   ♃ Colli aprichi, siepi, rive dei campi = Locarno a S. Biagio — Minusio alle Fracce.
   F. rosso-pallido. — [Lug.—Ag.]
2. **M. sylvestris** L. sp. 1. 969.
   ⊙ Siepi, luoghi incolti, immondezzai, macerie, margine dei campi = Locarno — Cadenazzo — Mendrisio — Lugano.
   F. rosso-pallido. — [Giug—Lug.]
3. **M. rotundifolia** L. sp. 969. (*M. vulgaris* Fries. = *M. neglecta* Wallr.)
   Ital. *Malva*, *Malva comune*. — Tic. *Malva*, *Malba*.
   ⊙⊙ Orti, lungo strade = Locarno ecc.
   F. rosa pallido. — [Giug.]

?4. **M. borealis** Wallmann. sec. Fries. Nov. ed. 2. p. 218. (¹)
   ⊙ Luoghi coltivati, lungo strade = Locarno (nel mio giardino e al Belvedere).
   F. rosso. — [Giug.—Ott.]
   Questa specie e le precedenti sono emollienti e in uso per la resoluzione dei tumori.

Althæa.

?1. **A. officinalis** L. sp. 2. p. 966.
   ♃ Coltivata ne' giardini; raramente allo stato quasi spontaneo negli immondezzai.
   L' ho vista nel Mendrisiotto, credo a Riva S. Vitale.
   F. bianco-incarnato. — [Lug.—Ag.]
2. **A. rosea** Willd. sp. pl. 3. p. 773.
   Ital. *Malva rosa*, *Malvone*, *Rosoni*. — Tic. *Popolan*.
   ⊙ o ♃ Coltivata ne' giardini di quasi tutto il Cantone.
   F. bianchi, rosei, purporini, gialli, screziati. — [Giug.—Ott.]

(¹) Affine alla *M. rotundifolia* L., ne differisce per il calice appena più lungo della corolla e pei frutti raggrinzati.

Hibiscus.

1. **H. syriacus** L. sp. 978. (¹)
   ♄ (arbusto). Spesso coltivato e nelle siepi quasi spontaneo = Ascona, siepi lungo la strada presso il cimitero.
   F. bianco porporino con macchia sanguigna alla base dei petali.
2. **H. Trionum** L. sp. 981.
   ⊙ Coltivata ne' giardini, ove si riproduce spontaneamente = Locarno.
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]

Fam. Tiliaceae.

Tilia.

1. **T. parvifolia** Ehrh. (*T. ulmifolia* Scop.)
   Ital. *Tilio maremmano, Tilio selvatico.* — Tic. *Téi.*
   ♄ (13—17 m.). Selve frondose, lungo i fiumi = Locarno — Tenero — Ascona — Losone — Maggia ecc.
   F. giallognolo. — [Giug.—Lug.]
   Infuso fiori sudorifero; legno per lavori da falegname, da tornitore; corteccia per far corda, carta grossolana e turare le fessure delle barche.
2. **T. grandifolia** Ehrh. (*T. platyphylla* Scop.)
   Ital. *Tilio nostrale, d' Olanda.* — Tic. *Téi.*
   ♄ Selve frondose, lungo i fiumi = Tenero ecc.
   F. giallognolo. — [Lug.]
   Legno più molle e spongioso del precedente, meno buono. Fiori e corteccia servono agli usi medesimi del precedente.

Fam. Hypericineae.

Androsæmum.

1. **A. officinale** Allion. pedem. 2. p. 47.
   ♄ Luoghi umidi, lungo rivi = Moscia sopra Ascona — Sopra il rivo delle seghe a Lugano — Tra Ponte Tresa e le Fornasette — Mendrisio, nella valletta della Molina.
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]
   Resinoso, risolvente, vermifugo, stimolante. L'olio giova nelle scottature e contusioni.

(¹) Coltivato in alcuni giardini a Lugano e in V. Solda lungo la riva del lago, tra Albogasio e S. Mammete (Lentiechia) e presso Morcote (Favrat).

Hypericum.

1. **H. perforatum** L. sp. 1. 1104.
   Ital. *Iperico, Erba S. Giovanni, Caccia Diavoli.*
   ♃ Prati aridi, scopeti, luoghi sassosi; dal piano fino alle prime alpi = Locarno — Cevio — Bellinzona — Biasca — Olivone ecc.
   F. giallo. — [Giug.—Ag.]
   Qualità identiche a quelle dell' Androsemum.
2. **H. humifusum** L. sp. 1. 1105.
   ♃ Scopeti, pascoli, campi, strade = Brione sopra Minusio, lungo la strada e ne' campi — Tegna presso Locarno.
   F. giallo (spesso tetrapetalo). — [Mag.—Sett.]
3. **H. quadrangulare** L. sp. 1. 1104.
   ♃ Pascoli selvatici, lungo i rivi e fossi = M. Generoso.
   F. giallo. — [Lug.—Ag.]
4. **H. tetrapterum** Fries. novit. ed. 2. p. 236.
   ♃ Prati e declivi uliginosi, lungo fossi e rivi = Losone, ne' prati — V. Verzasca, a circa 400 m.
   F. giallo. — [Giug.—Lug.]
5. **H. montanum** L. sp. 1. 1106.
   ♃ Selve, luoghi sassosi aprichi e fra virgulti; da 220—1200 m. = Locarno, alla rupe del Sasso fra virgulti — Campo V. Maggia — Sornico, alveo Maggia — Gandria (Lenticchia).
   F. giallo. — [Giug.—Ag.]
6. **H. hirsutum** L. sp. 1. 1105.
   ♃ Selve e colli incolti, fra virgulti = Fra Agno e Ponte Tresa.
   F. giallo. — [Giug.—Lug.]

Fam. Acerineae.

Acer.

1. **A. pseudo-platanus** L. sp. 1495.
   Ital. *Acero.* — Tic. *Agher, Ager.*
   ♄ Selve da 700—1600 m. = M^ti. di Cugnasco — M^ti. di Biasca — Campo V. M. ecc.
   F. verdi. — [Apr.—Mag.]
   Legno eccellente per fuoco, lavori da tornio, tarsia; radice di un bel marezzo adoperata per far pipe; dal fusto, mediante incisione, cola in Marzo e Novembre un succo zuccherino.
2. **A. campestre** L. sp. 2. 1497.
   Ital. *Oppio.* — Tic. *Olmo, Romp, Rompor.*
   ♄ Siepi e selve; coltivasi anche nei campi per maritargli la vite = Locarno — Lugano — Mendrisio.
   F. verdo-oscuri — [Apr.—Mag.]
   Serve di sostegno alle viti, dà eccellente legno da fuoco, forse il migliore.

Fam. Hippocastaneae.

Aesculus.

1. **A. Hippocastanum** L. sp. 1. 488.
   Ital. *Castagno d' India.* Tic. *Castagn d' India.*
   ♄ (da 12—20 m.). Coltivato di frequente — Locarno — Bellinzona — Lugano.
   F. bianco. — [Mag.]

Fam. Ampelideae.

Vitis. (1)

1. **V. vinifera** L. sp. 293.
   Ital. *Vite.* — Tic. *Vigna, Vid.*
   ♄ Coltivata; ascende fino a 600 m.
   F. verde. — [Ging.]

Fam. Geraniaceae.

Geranium.

1. **G. nodosum** L. sp. 933.
   ♃ Luoghi sassosi, aprichi — Dintorni di Lugano — Caprino, presso le Cantine — Capolago, presso le Cantine — Tra Arzo e Besazio, lungo strada.
   F. violacei con 5 strie rosse. — [Mag.—Ging.]
2. **G. sylvaticum** L. sp. 953.
   ♃ Selve e prati di mont. — Broglio — Lunescio (V. Maggia) — S. Bernardino (2).
   F. purpureo-violacei. — [Ging.—Lug.]
3. **G. pratense** L. sp. 1. p. 954.
   ♃ Prati di mont., fra cespugli e luoghi umidi — M. Bolia, ne' pascoli (Comolli) — Bellinzona, vigne.
   F. cerulei. — [Mag.—Lug.]
4. **G. sanguineum** L. sp. 1. p. 958.
   ♃ Colli aprichi, fra cespugli, selve — Solduno, alle Vettagne (3).
   F. purpureo. — [Mag.—Sett.]

---

(1) Coltivasi anche *Vitis Labrusca* L. e l'*Ampelopsis quinquefolia* R. Sch. Quest' ultimo arbusto, proveniente dall' America del Nord, ha le foglie che diventano rosse in autunno, serve per coprire muri e pergole. Lo si vede nel giardino del Penitenziere a Lugano ed in altri giardini e nelle stazioni ferroviarie da Giubiasco a S. Nazzaro.

(2) M. Generoso (Erb. Lenticchia).

(3) Abbondante ne' dintorni di Lugano, p. es. Castagnola, Gandria, S. Salvatore.

5. **G. pyrenaicum** L. mant. 976.
   ♃ Selve, prati e strade della reg. mont. e subalp. fino a 1300 m. = Campo di Cimalmotto e Bosco V. Maggia, lungo strada — V. Bavona (Ball).
   F. rosso. — [Lug.—Ag.]
6. **G. pusillum** L. sp. 2. 957.
   ⊙ Luoghi incolti, siepi, strade = Locarno, Lugano ecc.
   F. ceruleo. — [Giug.—Lug.]
7. **G. dissectum** L. sp. 2. p. 956.
   ⊙ Luoghi incolti, lungo strade, fra le messi = Minusio alle Fraccie (strada).
   F. porporino. — [Apr.—Lug.]
8. **G. columbinum** L. sp. 2. p 956.
   ⊙ Campi, siepi, colli = Bellinzona (nella vigna von Mentlen) — Mendrisio — Lugano.
   F. rosei. — [Giug.—Lug.]
9. **G. rotundifolium** L. sp. pl. 2. p. 957 (1).
   ⊙ Vigne, campi, cespugli = Bellinzona.
   F. incarnato. — [Giug.—Lug.]
10. **G. molle** L. sp. pl. 2. p. 955.
   ⊙ Frequente ne' luoghi incolti, strade = Locarno al Tazzino — Lugano, sui muri vecchi ecc.
   F. porporini. — [Mar.—Mag.]
11. **G. Robertianum** L. sp. pl. 2. p. 955.
   Ital. *Cicuta rossa*, *Erba cimicina*.
   ⊙ Selve ombrose, rupi, muri, strade, macerie; freq^{mo}.
   F. rosso e più raramente bianco. — [Mag.—Ott.]
   Vulneraria. I contadini l'applicano alle articolazioni, ne' reumatismi. Linneo dice che i pastori la danno in infusione alle pecore affette da pisciasangue.

Erodium.

1. **E. cicutarium** L' Heritier in Ait. hort. kew. ed. 1. vol. 2. p. 414.
   Ital. *Erba cicutaria*.
   ⊙ Luoghi aridi, arenosi, strade, prati, campi = Muralto, lungo strada presso scalo ferrovia e sulla scarpa della strada lungo il lago — Biasca, lungo strada per Malvaglia.
   F. roseo. — [Apr.—Sett.]
2. **E. moschatum** L' Heritier v. 2. p. 414.
   Ital. *Geranio muschiato*, *Erba moscata*. — Tic. *Müsch*.
   ⊙ Coltivato frequentemente e si è quasi fatto spontâneo ne' giardini = Locarno (2).
   F. roseo. — [Apr.—Mag.]

(1) M^{ti} della V. Colla (Erb. Lentiechia).
(2) Coltivato anche a Lugano.

3. **E. ciconium** Willd. sp. 3. 629 [1].
⊙ Rive erbose de' campi, luoghi incolti, strade = Mendrisiotto.
F. roseo. — [Apr.—Mag.]

Fam. Balsamineae. [2]

Impatiens.

1. **I. noli tangere** L. sp. 1329.
Ital. *Erba impaziente.*
⊙ Selve, luoghi aspri ombrosi di coll. e mont. = Orselina, nella valletta del Rebissale — V. di Campo V. M. al Gerlone — Bellinzona, dietro la rocca di S. Michele — Tra Vira e Magadino lungo un torrentuccio — M. Ceneri — Arogno (Mari).
F. giallo. — [Giug.—Ag.]
Diuretica. Le foglie e i fiori ponno servire a tingere in giallo.

2. **I. Balsamina** L. sp. 2. 1328.
Ital. *Balsamina, Begli nomini.* — Tic. *Bejomen.*
⊙ Coltivata ne' giardini a fiori doppi, bianchi, rossi, lilacini, sereziati.
[Giug.—Ag.]

Fam. Oxalideae.

Oxalis.

1. **O. acetosella** L. sp. 620.
Ital. *Acetosella, Pancuculio, Trifoglio acetoso.* — Tic. *Pan moin, Panicuc.*
♃ Selve, cespugli da 250—1700 m. = Locarno, strada del Sasso — Campo V. M. — S. Bernardino — Lugano ecc.
F. bianco con vene rosee. — [Mar.—Apr.]
Dalle foglie si ottiene l'ossalato di potassa. Il succo si applica con profitto nelle infiammazioni e nelle ulcere scrofolose. È di un sapore acido, amabile.

2. **O. stricta** L. sp. pl. 1. p. 624.
⊙ Luoghi arenosi, aprichi, muri, strade, non ascende ai monti = Locarno — Minusio — Gandria.
F. giallo. — [Giug.—Sett.]

3. **O. corniculata** L. sp. pl. 1. p. 623.
Ital. *Acetosella, Pancuculio, Trefoglio acetoso.* — Tic. *Pan moin, Panicuc.*
♃ Luoghi arenosi, soleggiati, strade, muri, giardini; frequentissimo = Locarno — Bellinzona — Lugano — Gandria — Mendrisio.
F. giallo. — [Feb.—Ott.]
Queste due ultime specie ponno servire agli stessi usi della Oxalis acetosella.

---

[1] Si distingue dal *E. cicutarium* pel caule ascendente, per le foglie piccinolate e per il rostro lunghissimo e pubescente.

[2] Coltivato frequentemente nei giardini di Lugano il *Tropeolum majus* L. (Capuccina).

Fam. Rutaceae.

Ruta.

1. **R. graveolens** L. sp. pl. 1. p. 548 var. *γ*. (*R. hortensis* Mill.)
   Ital. *Ruta*. — Tic. *Erba Rüga*.
   ♃ Luoghi rupestri di coll. = Tra Castagnola e Gandria — Sul S. Giorgio, dalla parte di Brusino (Lenticchia). Coltivasi anche.
   F. giallo. — [Ging.—Lug.]
   Amara, di odore particolare, usata nell' isterismo, epilessia, coliche flatulente. L' infusione nell' acquavite dicesi rinforzi lo stomaco.

Dictamnus.

1. **D. albus** L. sp. pl. 1. p. 548.
   Ital. *Dittamo bianco*, *Frassinella*, *Limonella*.
   ♃ Selve di monti e luoghi scoscesi = Tra Castagnola e Gandria — M. Caslano (Lavizzari) (1).
   F. bianco, odoroso. — [Mag.—Giug.]
   Odore forte e stupefacente. L' olio etereo che si sviluppa in gran quantità dalle glandole, ond' è coperta, ne' giorni caldi e sereni massime verso sera, produce un' atmosfera che si accende (Allgem. Bot. Zeit. 2. Abth. S. 315).

Subclassis Caliciflorae.

Fam. Celastrineae.

Evonymus.

?1. **E. europæus** L. sp. pl. p. 286. (2)
   Ital. *Evonimo*, *Fusaggine*, *Fusaro*, *Beretto da prete*. — Tic. *Berettin da prevet*.
   ♄ Comune nelle siepi e nei dumeti di pian. e di collina = Locarno — Tenero — Arcegno — Castagnola.
   F. verde-giallognolo, pentamero. — [Mag.]
   Legno giallo, duro, adoperato per lavori da tornio, per fare stuzzicadenti, istrumenti da fiato, ma nel lavorarlo cagiona malessere e vomito; da buon carbone. Frutti drastici e purgativi.

---

(1) M. Generoso (Mari).

(2) *β intermedius* Gand. Fl. helv. II, 226; Synopsis p. 200. Sopra Bellinzona (Gand.) — Madonna del Sasso, Trinità dei Monti sopra Locarno, tra Lugano e Gandria, Agno, Morcote, Bironico (erb. Muret) — Ponte-Brolla (erb. Favrat). *Fiori tetrameri*. Forse il tipo specifico non cresce nel Ticino, ma solamente la varietà (Favrat).

?2. **E. latifolius** Scop. carn. 1. p. 165.
ℏ Siepi di coll. = Mendrisiotto verso Castello S. Pietro? (1)
F. verde-giallognolo. — [Mag.]

Fam. Rhamneae.

Zizyphus.

1. **Z. vulgaris** Lam. illustr. t. 185. f. 1.
Ital. *Zizzola, Giuggiolo.* — Tic. *Zenzoin, Zizzola.*
Coltivato raramente ne' giardini = Locarno nel giardino Belvedere — Bellinzona (un bel esemplare nel giardino Sacchi).
F. verdi. — [Giug.—Lug.]

Paliurus.

1. **P. aculeatus** Lam. ill. t. 210. (*P. australis* Gärtn. = *Rhamnus paliurus* L.)
Ital. *Marruca, Marruca nera, Paliuro.*
ℏ Siepi coltivate = Lugano, lungo strada per Ponte Cassarina.
F. verdognolo. — [Mag.—Giug.]

Rhamnus.

1. **R. cathartica** L. sp. pl. 1. 279.
Ital. *Ramno catartico, Spino cervino.* — Tic. *Spin corvin.*
ℏ (arbusto da m. 2.50—3.40). — Selve e dumeti = Tra Rovio e Arogno (frequentissimo) — M. S. Giorgio, ai pozzi.
F. bianco-verdi. — [Mag.]
Pianta di odore nauseoso. Il siroppo delle bacche, come quello della corteccia, è purgativo; esso è dapprima dolce, poi d' un gusto amaro nauseoso.
2. **R. saxatilis** L. sp. 1671.
Ital. *Ramno sassatile.*
ℏ Luoghi aprichi, sassosi = Lugano piede S. Salvatore — Tra Castagnola e Gandria (rupi).
F. verde-giallo. — [Mag.—Giug.]
3. **R. alpina** L. sp. 280.
ℏ Pendii rocciosi delle A. fino al piede delle montagne = Campo alla Torba (?).
F. verdognoli. — [Mag.—Giug.]

---

(1) Chiavenna (Lachenal et Chatelain in Gaud. Fl. helv.).

4. **R. pumila** L. sp. 241.
   ♄ Siepi reg. alp. e subalp. = Campo di V. Maggia — Campo alla Torba — M. Generoso (Comolli) — Salvatore.
   F. verdognoli. — [Giug.—Lug.]
5. **R. Frangula** L. sp. 280. (*Frangula alnus* Mill.)
   Ital. *Frangula, Alno nero.* — Tic. *Alniscia selvadega.*
   ♄ Selve ombreggiate e fra virgulti = Ascona, lungo strada presso S. Materno — Arcegno (selve) — Campo V. Maggia.
   Corteccia e bacche in decozione purgative.
   F. biancastri. — [Mag.]

Fam. Terebintaceae.

Rhus.

R. Cotinus L. sp. 383.
Ital. *Scotano, Cotino.* — Tic. *Scodan.*
♄ (3—4 m.) Luoghi rupestri al piè del S. Salvatore — Tra Gandria e Castagnola, lungo strada. Coltivato come arboscello d' ornamento.
F. giallognoli. — [Mag.—Giug.]
Foglie odorose, tingono la lana in rossigno e servono come il legno e la radice per la concia delle pelli. Corteccia febbrifuga.

R. typhina L. sp. 380.
♄ (5—7 m.). Coltivato frequentemente ne' giardini a Locarno, Giumaglio; quasi naturalizato nel Cantone.
[Giug.—Lug.]
Originario dalla Virginia e dalle Caroline. I frutti danno bibita refrigerante, la corteccia serve alla concia delle pelli. Il legno striato di verde e di giallo utile a lavori da tornio e tarsia.

Fam. Papilionaceae.[1]

Ulex.

U. europæus L. sp. 1045.
Ital. *Ginestrone spinoso, Ginestre marina.* — Tic. *Ginestra spinosa.*
♄ (1—2 m.). M. S. Bernardo sopra Lugano (Mari, Favrat)[2].
F. giallo. — [Mag.]

---

[1] D' aggiungere: *Colutea arborescens* L. Castagnola, Gandria, S. Salvatore.
Robinia pseudo-acacia L. Coltivata e propagantesi spontaneamente per getti sotterranei, nelle siepi, lungo fiumi (Cassarate).

[2] Trovasi anche copioso nel bosco tra la villa Trevano e Comano. Vi è spontaneo evidentemente (conf. Gremli ed. francese, 1886, *Addenda*).

Sarothamnus.

S. **scoparius** Wimmer (*Spartium scoparium* Lin. = *Genista scoparia* Lam.).

Ital. *Ginestra.* — Tic. *Ginestra, Ginester.*

♄ (1—1.70 m.). Selve, luoghi arenosi; sparsa in grande quantità fino alle alte valli e sempre in società col *Cytisus nigricans;* comunissima in tutta la V. del Ticino da Giornico a Locarno, nelle V. Maggia, V. Calanca verso le spalle del Monte tra Castanetta e Molina — M. S. Giorgio — M. Generoso ecc.

F. giallo. — [Mag. al piano, Ging. — Lug. al monte].

Usata per scope, strame e fuoco. Corteccia atta a dare filo per funi e reti. I germogli assai amari surrogati al luppolo nella fabbricazione della birra. L' arbusto contiene molto tannino, la sua cenere dà molta potassa.

Genista.

1. G. **tinctoria** L. sp. 998 (1).

Ital. *Ginestra selvatica, Ginestrella, Ginestrina.*

♄ (0,30—0,70 m.). Prati aridi di pianura e di coll. — Tenero — Mondacce presso Locarno ecc.

F. giallo. — [Mag.—Ging.]

Tinge in giallo e verde la seta o la lana. I giovani germogli rendono amaro il latte delle capre e delle bovine, che se ne pascono.

22. G. **ovata** Waldst. in Kit. pl. rar. hung. 1. p. 86.

♄ Colli aridi. Trovasi nel Cantone secondo Hegetschweiler (Fl. d. Schw. p. 690), Koch (Handbuch) e secondo Gremli (Suppl. che cita Zollikofer) (2).

F. giallo. — [Ging.—Lug.]

3. G. **germanica** L. sp. 999 (3).

Ital. *Bulimacola di bosco, Scardiccione, Ginestra spinosa.*

♄ (0,30—0,80 m.). Selve, luoghi aspri, aprichi — Locarno, tra Mad. Sasso e Fregera lungo il sentiero dei Monti — Luganese, p. es. alla Valletta del Tazzino (Lenticchia).

F. giallo. — [Mag.—Ging.]

Cytisus.

1. C. **Laburnum** L. sp. pl. 2. p. 1041.

Ital. *Avorniello, Maggiociondolo.* — Locarno, *Doir;* Gandria, *Maino.*

♄ (3—4 m.). Boschi, siepi del piano e monte — Magadino, valleta della Molina — Bignasco al M° Cantone — Melano — Luganese, p. es. al S. Salvatore, Gandria ecc. (Lenticchia).

F. giallo in magnifiche pannocchie. — [Mag.—Ging.]

Legno duro di un bel giallo atto a lavori da tornio. Foglie mangiate con avidità dal bestiame. Semi purgativi ed emetici. Radice fresca fetente.

---

(1) La v. *Marii* Favrat nei dintorni di Lugano, sopra Cadro, al piè del Ceneri verso Cadenazzo, Moscia. La v. *mantica* Poll. (Perreymondi Lois.), sopra Gandria ecc. (Favrat).

(2) Non ho veduto nel Ticino la *G. ovata*, ma solamente la v. *mantica* della *G. tinctoria* (Favrat). Conf. Gremli, ed. francese, 1886.

(3) Una var. *nana*, forse specie, al Generoso, strada sotto l' albergo della cima (Favrat).

2. **C. alpinus** Mill. dict. n° 2.
   Ital. *Avorniello*, *Maggiociondolo*, *Eghelo*. — Volg. *Eghen*.
   ♄ Selve mont. e subalp. = M. Generoso, verso la cima; (lo vidi nell' erbario Comolli)(1).
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]
3. **C. nigricans** L. sp. pl. 2. 1401 (2).
   ♄ Selve, scopeti, luoghi rupestri in coll. = Locarno sopra Mad. Sasso — Tra Brione e Contra — Sopra le Fracce ecc.
   F. giallo. — [Giug.—Lug.]
4. **C. sessilifolius** L. sp. pl. 2. 1041.
   ♄ Selve, scopeti. Nel C. Ticino (Hegetschw. Fl. d. Schweiz. p. 691). Io non l' ho mai trovato nel Cantone (3).
   F. giallo. — [Giug.—Ag.]
5. **C. glabrescens** Sartorelli Alb. bosch. Ital. sup. p. 282.
   ♄ M^ti di Cadro (Denti della Vecchia) — M. Galbiga (Koch).
   F. gialli con strie rosso-scure. — [Mag.—Giug.]
6. **C. capitatus** Jacq. fl. austr. p. 22.
   ♄ Selve apriche = M. Generoso — Vicinanze di Lugano (Comolli) (4).
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]
7. **C. hirsutus** L. sp. 2. pl. 1402.
   ♄ Selve e luoghi rupestri di mont. = M. Tamar, tra l' alpe di Cortenovo e di Caneggiolo — M. S. Salvatore — Melide — V. Mara presso Arogno — Tra Ascona e Ronco (Muret).
   F. giallo. — [Mag.—Lug.]

Lupinus.

1. **L. albus** L. sp. pl. 2. p. 1018.
   Ital. *Lupino*. — Tic. *Lupin*.
   ⊙ Coltivato nel Mendrisiotto.
2. **L. angustifolius** L. sp. pl. 2. 1015.
   Ital. *Lupino*. — Tic. *Fascu da caffè*.
   ⊙ Coltivato nel Locarnese come succedaneo al caffè.
   F. ceruleo. — [Giug.—Lug.]

---

(1) Confermato da Mari (erb. Mari).

(2) Nuova la v. *nana* Favrat. Denti della Vecchia (1400—1500 m.). N. B. zur Fl. d. Schw. IV° fasc. p. 4.

(3) Nell' erbar. del Liceo di Lug. alcuni esemplari del Generoso (Cat. Gab. St. Nat. Lic. Lug. p. 54).

(4) Bolia, Denti della Vecchia (Favrat).

Ononis.

1. **O. spinosa** Lin. sp. pl. 2. p. 1006 var. d.
   Ital. *Arrestabue*, *Bullimacola*, *Anonide*.
   ♃ Pascoli e luoghi sterili = Losone (prati) — Tra Solduno e Ponte della Maggia — Luganese (Lentiechia).
   F. rossi. — [Mag.—Giug.]
   Radice diuretica.
2. **O. procurrens Wallr.** (*O. repens* Koch).
   ♃ Campi, prati = Locarno — Tenero — Bellinzona.
   F. rossi. — [Mag.—Giug.]
   var. **fallax** (*O. hircina* auct. helv. non Jacq.).
   ♃ Prati e rive dei campi in coll. = Losone — Dintorni di Lugano (Lentiechia).
   F. rossi. — [Mag.—Giug.]
3. **O. Columnæ** Allion. pedem. 1. p. 318.
   ♃ C. Ticino (Koch, Taschenb. p. 113).
   F. gialli. — [Mag.—Lug.]
4. **O. Natrix** L. sp. pl. 2. p. 1008.
   ♃ Luoghi aprichi, ghiaie torrenti, strade = Piè del M. S. Salvatore, tra S. Martino e Melide — Coldrerio, lungo ferrovia verso Balerna.
   F. gialli. — [Giug.—Lug.]

?5. **O. rotundifolia** L. sp. pl. 2. p. 1010.
   ♃ Reg. subalp. = C. Ticino, secondo Hegetschw. (Fl. d. Schw.) Io non la vidi mai, nè so sia stata trovata [1].
   F. rossi. — [Lug.—Ag.]

Anthyllis.

1. **A. vulneraria** L. sp. 2. p. 1012.
   Ital. *Vulneraria*.
   ♃ Prati secchi di pian. e coll. = Locarno, ne' saleggi. [2]
   F. giallo, talvolta rossi. — [Mag.—Giug.] Ve ne sono alcune varietà.
2. **A. montana** L. sp. pl. 2. p. 1012.
   ♄ (caule inferiormente legnoso). Monti e alpi = Alpe Piancabella in V. Colla (Comolli) — M. Generoso (Mari).
   F. rosso azzurri. — [Mag.—Giug.]

---

[1] C. Ticino (Gremli ed. francese 1886).

[2] Abbondante ne' prati del Sottoceneri; in montagna subisce qualche variazione (v. *rubriflora*, M. Brè).

Medicago.

1. **M. sativa** L. sp. pl. 2. p. 1096.
   ♃ Spontaneo e coltivato = Locarno, prato alla Ramogna.
   F. cerulescente. — [Lug.—Ag.]
   Buon foraggio, principalmente pe' cavalli.
2. **M. falcata** L. sp. pl. 2. p. 1066.
   ♃ Prati secchi e rive campi = Tra Gudo e Bellinzona.
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]
   Buon foraggio.
3. **M. lupulina** L. sp. pl. 2. p. 1097.
   Ital. *Trefoglio selvatico.*
   ⊙ Prati, campi, orti, strade; dal piano alla reg. subalp. = Locarno — Bellinzona — Bignasco — Olivone — Campo V. Maggia — Lugano (Lenticchia).
   F. giallo. — [Apr.—Ott.]

Melilotus.

1. **M. vulgaris** Willd. en. p. 970 (*M. alba* Desr.).
   ⊙ Luoghi incolti = Tra Ascona e Ponte sulla Maggia (strada) — Arbedo, arene del Ticino — Luganese, lungo il Cassarate (Lenticchia).
   F. bianco. — [Giug.—Ott.]
   Buon foraggio, dà miele alle api; ritenevasi calmante e risolvente.
2. **M. officinalis** Desr. (*M. arvensis* Wallr.)
   ⊙ Margini campi, strade = Luganese — Mendrisiotto.
   F. giallo. — [Giug.—Ott.]
   Buon foraggio, dà miele alle api.

Trifolium. [1]

1. **T. pratense** L. sp. pl. 2. 1082.
   ♃ Prati, strade; coltivato = Losone — Tenero — S. Gottardo — Lugano.
   F. rosso. — [Apr.—Ott.]
   Buon foraggio.
2. **T. medium** L. Faun. svec. ed. 2. p. 588.
   ♃ Dumeti, selve, prati di mont. = V. di Blenio.
   F. porporino — [Giug.—Lug.]
3. **T. alpestre** L. sp. pl. 2. p. 1082.
   ♃ Pascoli mont. virgulti, luoghi rupestri = V. di Peccia.
   F. porporino. — [Giug.—Ag.]

---

[1] Aggiungere: *T. alpinum L.* — Gottardo, Naret, Piora (erbar. Liceo di Lug.) — Pizzo di Claro (Calloni. ann. C. A. T. p. 130. 1886).

4. **T. rubens** L. sp. pl. 2. p. 1081.
   ♃ Luoghi rupestri, selvatici di coll. e mont. = Locarno, boscaglie sotto Mad. Sasso, fra le due strade — Losone, rupi verso Mad. Fontana — Presso Ronco d'Ascona — M^te rimpetto alla Bignaschina presso Bignasco — Olivone — M. S. Giorgio, pascoli — Gandria (Lentiecchia).
   F. rosso. — [Mag.—Giug.]
5. **T. ochroleucum** L. syst. nat. 3. 233.
   ♃ Selve subalp. = C. Ticino (Comolli) — Castagnola (Mari).
   F. giallognolo. — [Giug.—Lug.]
6. **T. incarnatum** L. sp. pl. 2. p. 1083.
   Ital. *Trifoglio rosso*, *Erba greca*.
   ⊙ Coltivato e spontaneo anche ne' prati e strade = Tra Genestrerio e Coldrerio (coltiv.).
   F. porporino. — [Giug.—Lug.]
   Buon foraggio.
7. **T. arvense** L. sp. pl. 2. p. 1085.
   ⊙ Campi, strade = Ascona — Solduno.
   F. porporino. — [Giug.—Lug.]
8. **T. fragiferum** L. sp. 1086.
   ♃ Prati subumidi = Magadino — Tra Cadenazzo e la chiesa Von Mentlen — Tra Solduno e Ponte Brola, strada.
9. **T. montanum** L. sp. pl. 2. p. 1087.
   Prati e pascoli di coll. e mont. fino a 1600 m. = Locarno, monti — Campo V. Maggia — Airolo — Alpe Casaccia — M. S. Giorgio.
   F. bianco. — [Mag.—Lug.]
10. **T. repens** L. sp. pl. 2. p. 1080.
   ♃ Prati, luoghi colti, strade = Locarno, prati alla Maggia — Lungo la Melezza.
   F. bianco, talvolta carneo. — [Mag.—Ott.]
?11. **T. pallescens** Schreb. in Sturm. Deutschl. Fl. Heft 15.
   ♃ Alpi più elevate = M. S. Gottardo (Hegetschweiler).
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]
12. **T. caespitosum** Reynier (*T. Thalii* Vill.).
   ⊙ Luoghi aridi = Me Lucomagno, non lungi dall'Acqua-Calda, lungo strada — Casaccia, pascoli — S. Gottardo.
   F. bianco. — [Lug.]
13. **T. hybridum** L. sp. pl. 2. p. 1079.
   ♃ Prati fertili = Tra Bellinzona e Cadenazzo (Comolli) — Riazzino, tra Gordola e Cugnasco.
   F. bianco porporino. — [Mag.—Sett.]

14. **T. elegans** Savi bot. etr. p. 42.
    ♃ Prati di coll. e mont. = Riazzino, presso Cugnasco, prati uliginosi — Tra Cadenazzo e S. Antonio, prati, strada.
    F. bianco rosco. — [Giug.—Lug.]
15. **T. badium** Schreber in Sturm Deutschl. Fl. fasc. 16.
    Luoghi e boscaglie umide delle prealpi dai 280—700 m. = Brione Verzasca — Tra Pianezzo e S. Antonio in V. Morobbia (strada) — Campo V. Maggia — S. Bernardino.
    F. giallo. — [Giug.—Lug.]
16. **T. agrarium** L. sp. pl. 2. p. 1087 (*T. aureum* Poll.)
    ⊙ Campi e pascoli, dal piano alla reg. subalp. = Locarno.
    F. giallo e poi bruno. — [Mag.—Ott.]
17. **T. procumbens** L. sp. 1088 (*T. campestre* Schreb.).
    ⊙ Campi, pascoli, strade = Locarno, strada della Mad. Sasso — Brione s. Minusio, strada.
    F. giallo. — [Mag.—Ott.]
    β. *minus*. Bellinzona, valletta del Dragonato.
18. **T. patens** Schreb. in Sturm. h. 16.
    ⊙ Luoghi erbosi = Locarno, al Riazzino, a Brione sopra Minusio — Bellinzona — Tra Cernese e S. Pietro Pambio presso Lugano — Manno — Melano — Capolago — Valletta del Nebbiano presso Mendrisio (1).
    F. giallo dorato. — [Giug.—Sett.]
19. **T. filiforme** L. sp. 1088. (*T. minus* Relh.)
    ⊙ Prati, campi, strade = Locarno — Piano di Magadino, strada.
    F. giallo. — [Mag.—Ott.]

Dorycnium.

1. **D. herbaceum** Vill. Delph. 3. 416.
    ♃ Dirupi e pascoli aprichi di coll. e mont. = M. S. Salvatore — M. S. Giorgio (assai frequente) — Tra Rancate e Meride — Tra Obino e Monte nella V. di Muggio.
    F. bianco. — [Giug.—Lug.]

Lotus.

1. **L. corniculatus** L. sp. 1092.
    ♃ Pascoli, selve; comune = V. Sambuco, nel greto della Lavizzara (var.?) (2).
    F. giallo. — [Mag.—Ott.]
    var. **hirsutus** (*Lotus villosus* Thuill.).
    Locarno, tra la Madonna del Sasso e Fregera.

---

(1) Muzzano, sotto Rovio, ecc. (Favrat).
(2) Forma alpina, che si trova anche al Camoghè e probabilmente corrisponde al *L. tenuis* L.

2. **L. uliginosus** Schkuhr. Hand. 2. p. 412. (*L. maior* Scop.)
Fossi, luoghi paludosi = Tenero, sotto ponte Verzasca in acque stagnanti.
F. giallo. — [Giug.—Ag.]

Tetragonolobus.

1. **T. siliquosus** Roth. tent. Fl. germ. 1. p. 323.
♃ Prati umidi del piano, strade = Comolli lo dice frequente nel Cantone Ticino senza indicarne le località.
F. giallo. — [Mag.—Giug.]

Phaca.

1. **Ph. frigida** L. syst. nat. ed. 10. p. 1173.
♃ Pascoli alpini, luoghi sassosi e fra virgulti = M. Lucomagno, presso il lago Ritom (Scheuchzer) — S. Gottardo al Rossbodenstock.
2. **Ph. alpina** Wulf in Jacq. miscell. 2. p. 93.
♃ Dirupi della reg. subalp. e alp. = Campo V. Maggia — V. di Peccia, tra il Piano e Frodalte.
F. giallo. — [Lug.—Ag.]
3. **Ph. australis** L. mont. 103. (*Astragalus australis* Pater.)
♃ Pascoli e luoghi ghiaiosi = Alpe Piora, presso il lago Ritom.
F. bianco-violaceo. — [Lug.]
4. **Ph. astragalina** De C. Prodr. 2. p. 274. (*Astragalus alpinus* L. sp. 1070.)
♃ Pascoli alp. = A. di Bosco V. Maggia — Campo alla Torba — Passo Nufnen (Lavizzari) — M. Camoghè (Comolli).
F. bianco-ceruleo-violaceo. — [Lug.—Ag.]

Oxytropis.

1. **O. campestris** De C. astr. n° 10.
♃ Frequente ne' luoghi sassosi delle alpi, da 1450—2600 m. = M. S. Bernardino, salita del Piano di S. Giacomo — V. Sambuco — Campo alla Torba, tra il primo e il secondo „Corte" — Rossbodenstock del S. Gottardo.
F. bianco-giallognolo. — [Lug.—Ag.]
2. **O. montana** De C. prod. 2. 275.
♃ Pascoli della reg. mont. e alp. (1).
F. pallido-ceruleo. — [Giug.—Ag.]

---

(1) Nuova, v. *sericea* Gremli, Generoso (Favrat).

Astragalus.

1. **A. onobrychis** L. sp. 1070.
   ♃ In varie località del Cantone (Hegetschw.) = M. Lucomagno, presso l' Acqua-Calda — M. Generoso (Mari).
   F. purpureo. — [Giug.—Ag.]
2. **A. glycyphyllos** L. sp. pl. 2. p. 1066.
   ♃ Prati selvatici di pian. e mont. = Tenero — Bellinzona — Massagno e al Generoso (Lenticchia).
   F. giallognolo. — [Mag.—Ag.]
3. **A. depressus** L. sp. 1073.
   ♃ V. Sambuco, tra Fusio e Naret, nel greto del torrente.
   F. giallognolo. — [Mag.—Lug.]
4. **A. aristatus** L' Héritier. stirp. 170.
   ♄ V. Bavona, ad un' ora da S. Carlo nella salita verso l'alpe di Robiei.
   [Mag.—Ag.]

?5. **A. monspessulanus** L. sp. pl. 2. p. 1072.
   ♃ Luoghi erbosi di coll. e mont. Hegetschweiler lo indica proveniente dai confini meridionali del Cantone (1).
   F. porporino. — [Giug.—Lug.]

Coronilla.

1. **C. Emerus** L. sp. pl. 2. 1046.
   Ital. *Emero, Erba cornetta, Ginestra selvatica.*
   ♄ Fra virgulti e siepi del piano e colli; frequente; ascende anche ai monti della reg. subalp. = Tenero — Sotto Intragna, al ponte sull' Onsernone — Mendrisiotto (comune) — M. S. Giorgio — S. Salvatore e Gandria (Lenticchia).
   F. giallo. — [Apr.—Mag.]
2. **C. vaginalis** Lam. Enc. 2. p. 121.
   ♄ Pascoli della reg. mont. e alp. = Sopra Chiovasso (2) (Comolli) — Lungo il Cassarate (Mari).
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]
3. **C. varia** L. sp. pl. 2. p. 1038.
   ♃ Siepi, prati, margini campi = Melano — Tra Balerna e Chiasso — Luganese, freq^e (Lenticchia).
   F. bianco-rosso. — [Giug.—Sett.]

Hippocrepis.

1. **H. comosa** L. sp. pl. 2. p. 1037.
   ♃ Prati, luoghi aprichi = Saleggio di Locarno, prati — Ponte Brola, declivi erbosi. (3)
   F. giallo. — [Mag.—Sett.]

---

(1) Nell' erbario Franzoni non vi sono che esemplari di Tremezzo.
(2) Località della V. Colla presso S. Lucio.
(3) Freq^te nel Sottoceneri, anche in mont., come al S. Salvatore, Generoso.

Hedysarum.

1. **H. obscurum** L. sp. pl. 2. p. 1057.
   ♃ Torrenti e pascoli reg. subalp. e alp. = Campolungo (Lavizzari) — Olivone — Lucomagno.
   F. porporino. — [Giug.—Ag.]

Onobrychis.

1. **O. sativa** Lam. fl. fr. 2. p. 652. (*O. viciaefolia* Scop.)
   Ital. *Lupinella*, *Sanofieno*, *Fieno maremmano*.
   ♃ Prati di coll. e mont., anche coltivato.
   F. rosso. — [Giug.—Lug.]
2. **O. montana** De C.
   ♃ Pascoli reg. subalp. e alp. = Acqua-Calda sul Lucomagno.
   F. rosso. — [Giug.—Lug.]

Cicer.

1. **C. arietinum** L. sp. pl. 2. 1040.
   Ital. *Cece*. — Tic. *Sciser*.
   ⊙ Coltivato a Locarno.
   F. bianco. — [Giug.]
   I semi mangiansi in minestra e in *puré*.

Vicia.

?1. **V. pisiformis** L.
   ♃ Coldrerio, presso S. Antonio (siepe).
   F. giallognoli. — [Lug.—Ag.]
2. **V. sylvatica** L. sp. pl. 2. p. 1035.
   ♃ Selve di mont. = M. Generoso (Comolli).
   F. biancastri, venati di ceruleo. — [Lug.—Ag.]
3. **V. dumetorum** L. sp. pl. 2. p. 1035.
   ♃ Boschi di mont. = Maroggia — Arogno.
   F. rosso-violacei. — [Mag.—Ag.]
4. **V. cracca** L. sp. pl. 2. p. 1035.
   ♃ Virgulti, prati = Presso Ronco d'Ascona — Gandria (Lenticchia).
   F. rosso-violacei. — [Mag.—Ag.]
?5. **V. tenuifolia** Roth. tent. fl. germ. 1. p. 309.
   ♃ Prati selvatici = Olivone.
   F. violaceo-rosso. — [Mag.—Lug.]

?6. **V. onobrychioides** L. sp. 1036.
♃ Dumi, prati = Mendrisio, nella valletta del Paolaccio presso la cartiera al di là del torrente.
F. carnicino-violacei. — [Lug.—Ag.]

7. **V. faba** L. sp. pl. 2. p. 1039.
Ital. *Fava.* — Tic. *Fava, Bâgiona.*
⊙ Coltivata.
F. bianchi con macchia nera.

8. **V. sepium** L. sp. pl. 2. p. 1038.
♃ Siepi, selve, dumi = Mendrisio, siepi — V. di Muggio
F. ceruleo-violacei. — [Giug.—Lug.]

9. **V. sativa** L. sp. pl. 2. p. 1037. var. *α.*
Ital. *Uova di trotta.* — Tic. *Oeuv de trütta.*
⊙ Coltivata.
F. ceruleo-porporini. — [Giug.]
I semi si mangiano come le lenti.

10. **V. lughanensis** Schl. (*V. angustifolia* Roth. = *V. segetalis* Koch.)
⊙ Campi = Solduno e Rivapiana presso Locarno — Lugano.
F. rossi. — [Apr.—Mag.]

11. **V. lathyroides** L. sp. 1037.
⊙ Locarno, strada — Maggia, campi.
F. ceruleo. — [Mag.—Giug.]

12. **V. hirsuta** Koch. Syn. fl. Germ. ed. 1. p. 191 (*Ervum hirsutum* L.)
⊙ Tra le biade a Mappo presso Locarno (1).
F. azzurrognolo. — [Giug.—Ott.]

13. **V. tetrasperma** Koch. (*Ervum tetraspermum* L.)
⊙ Fra le biade = Solduno presso Locarno.
F. azzurrognolo. — [Mag.—Giug.]

Ervum.

1. **E. Lens** L. sp. 1039. (*Vicia Lens* Coss.)
Ital. *Lente, Lenticchia.* — Tic. *Lanticc.*
⊙ Coltivata e quasi spontanea.
Stendardo bianco con vene lilacine. — [Giug.—Lug.]

---

(1) Freq^e ne' prati dei dintorni di Lugano.

Pisum.

1. **P. sativum** L. sp. pl. 2. p. 1026.
   Ital. *Pisello.* — Tic. *Arbei, Arbion, Taccol.*
   ⊙ Coltivato.
   F. bianco. — [Mag.—Giug.]
2. **P. arvense** L. sp. pl. 2. p. 1027.
   Ital. *Pisello.*
   ⊙ Coltivato.
   F. purpureo-violaceo. — [Mag.—Giug.]

Lathyrus. (1)

1. **L. Aphaca** L. sp. pl. 2. p. 1029.
   ⊙ Campi di coll., luoghi incolti, aprichi = Orselina — Castello S. Pietro — Besazio.
   F. giallo. — [Mag.—Lug.]
2. **L. Nissolia** L. sp. pl. 2. p. 1029.
   ⊙ Campi di coll. e pian. = Tenero, presso Locarno — Vicinanze di Lugano.
   F. porporino. — [Mag.—Giug.]
3. **L. sphæricus** Retz. obs. 3. p. 39.
   ⊙ Campi = Lugano — Mendrisio.
   F. roseo. — [Mag.—Giug.]
4. **L. pratensis** L. sp. pl. 2. p. 1033 (2).
   ♃ Prati, dumi = Losone — Olivone.
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]
5. **L. sylvestris** L. sp. 1033.
   ♃ Luoghi erbosi, declivi = Locarno al Ronco del Belvedere — Mendrisio (3).
   F. roseo-verdognolo. — [Giug.—Ag.]
6. **L. latifolius** L. sp. pl. 2. p. 1034.
   ♃ Dumi, siepi, prati, ghiaie de' torrenti = Bignasco — Tra Cerentino e Bosco V. Maggia — Tra Lottigna e Torre — Albogasio in V. Solda (Lentichia).
   F. roseo. — [Giug.—Lug.]

Orobus.

1. **O. vernus** L. sp. pl. 2. p. 1028.
   ♃ Selve e prati di pian. e mont.; ascende fino verso 1300 m. = Losone — Locarno (4).
   F. prima porporino, poi azzurognolo, oppure verdognolo. — [Apr.—Mag.]

---

(1) Aggiungere: *L. heterophyllus* L. Generoso (Siegfried). Confer. Rhiner, 1868, 1870, 1872.

(2) La forma subalpina quasi glabra, con grandi fiori (L. Lusseri Heer) a Cimadera in V. Colla (Erb. Lentiechia) e ad Airolo (Brügger).

(3) Tra Airolo e Giornico (Brügger). Conf. Rhiner.

(4) M. Bré, M. S. Salvatore etc. (Erb. Lentiechia).

2. **O. gracilis** Gaud. fl. helv. 4. p. 500 (1).
   ♃ Selve, prati, dumi = Losone alla Madonna della Fontana — Bellinzona, selva della valletta del Dragonato, oltre la chiesuola della Madonna della Neve — Cima del S. Salvatore (Muret, Lenticchia, Favrat).
   F. bianco-ceruleo. — [Mag.—Giug.]
3. **O. tuberosus** L. sp. pl. 2. p. 1028 = *O. montanus* Bernh. = *O. macrorrhizus* Wimm.
   ♃ Selve, declivi erbosi del piano e dei colli = Locarno — Orselina — Losone (2).
   F. rosco-porporino. — [Apr.—Mag.]
   I tuberetti hanno sapore dolciguo e sono mangiabili. Dai fiori traggono miele le api.
4. **O. luteus** L. sp. pl. 2. p. 1028.
   ♃ Prati e selve di mont. = Generoso (Comolli).
   F. giallo. — [Giug.—Lug.]
5. **O. niger** L. sp. pl. 2. p. 1028.
   ♃ Selve di pian. e mont. = Cevio.
   F. purpureo-ceruleo. — [Mag.—Giug.]

Phaseolus.

1. **P. multiflorus** Willd. sp. 3. 1030.
   Ital. *Fagiuolo.* — Tic. *Faseu de Spagna.*
   ♃ Coltivato nelle due v. a fior rosso e bianco. — [Giug.—Sett.]
   La radice è perenne, ma non resiste ne' nostri climi.
2. **P. vulgaris** L. sp. pl. 2. p. 1016.
   ⊙ Se ne coltivano diverse varietà. — [Mag.—Sett.]

Fam. Amygdaleae.

Persica.

1. **P. vulgaris** Mill. dict. ed. germ. 3. p. 465.
   Ital. *Pesco, Persico.* — Tic. *Persigh.*
   ♄ (albero). Coltivato in diverse var.
   F. rosco. — [Mar.—Apr.]

---

(1) È la v. *gracilis* Gaud. del *O. vernus* L.

(2) La v. *linifolius* Reich. si trove al piede e sulle pendici del S. Salvatore, sotto i castagni (Em. Thomas, Schleicher, Muret, Favrat).

La forma tipica a Castagnola, al Generoso e Altanca (Erb. Lenticchia).

Prunus. (1)

1. **P. Armeniaca** L. sp. 679.
   Ital. *Albicocco.* — Tic. *Arbicocch, Mugnagh, Remignagh.*
   ♄ (albero). Coltivato.
   F. bianco. — [Mar.—Apr.]
2. **P. spinosa** L. sp. 681.
   Ital. *Pruno, Prugnolo, Prugno selvatico, Susino di macchia.* — Tic. *Brugneu.*
   ♄ (arbusto). Selve, siepi, macchie = Locarno (saleggi) — Someo e Cevio (saleggio (2).
   F. bianco. — [Mar.—Apr.]
   Frutto astringente; corteccia e legno atti a conciare le pelli.
3. **P. domestica** L. sp. 680 (3).
   Ital. *Susino, Pruno.* — Tic. *Brügn.*
   ♄ (albero). Coltivato in diverse varietà.
   F. bianco. — [Mar.—Apr.]
   Legno duro, venato di rosso, ottimo per lavori da falegname.
4. **P. avium** L. sp. 580 (4).
   Ital. *Cigliegia bisciolina, Visciola ciregiuola.* — Tic. *Sceresa selvadiga.*
   ♄ Selve di pian. e mont. = Tenero — Locarno, al Tazzino — Luganese, come a Castagnola, Viganello ecc. (Lenticchia).
   F. bianco. — [Mar.—Apr.]
5. **P. Cerasus** L. sp. 679.
   Ital. *Cigliegio.* — Tic. *Scerès, Sciüres.*
   ♄ (albero). Coltivato in diverse varietà (5).
   F. bianco. — [Apr.—Mag.]
   Legno buono per mobili.
6. **P. Padus** L. sp. 677.
   ♄ Boschi umidi, dumi, rive = Lugano — Valle di Muggio.
   F. bianco. — [Apr.—Mag.]
7. **P. Lauro-Cerasus** L. sp. 678.
   Ital. *Lauro ceraso, Lauro regio, Lauro di Trebisonda.* — Tic. *Laur.*
   ♄ (albero). Si coltiva e cresce quasi spontaneo (6).
   F. bianco. — [Mag.]

---

(1) Aggiungere: *Prunus Mahaleb* L. — Locarno — Lugano, tra Cassarate e Castagnola (Lavizzari, Escursioni nel C. Ticino. 1865. p. 805).

(2) S. Giorgio — V. Intelvi, sotto Laino.

(3) Due specie sono qui contenute: *P. insititia* L. a frutti rotondi e *P. domestica* L. a frutti bislunghi (Favrat).

(4) Coltivansi le v. *juliana* DC. a polpa molle e la v. *duracina* DC. (Cigliegia duracina) a carne dura. Dai frutti si distilla il Kirschwasser.

(5) v. *acida* Ehrh. (It. Marena), v. *austera* (Marena), v. *caproniana* Schübl. a frutto agro-dolce (It. Visciole. — Tic. Visciol).

(6) P. Es. nella valletta di Ponte Cassarina, nei boschi di Cassarate.

Le foglie e la corteccia contengono acido idrocianico; l'olio volatile può cagionare la morte anche in piccola dose. Le foglie servono a condire latticini non senza pericolo. I frutti, sebbene scipiti, si mangiano.

Fam. Spiræaceae.

Spiræa.

1. **S. Aruncus** L. sp. 702.
   Ital. *Barba caprina.*
   ♃ Luoghi ombrosi, umidi, lungo i rivi, ascende anche nella reg. subalp. = Locarno, scogli della Mad. del Sasso, Tazzino, Tenero (1).
   F. bianco. — [Mag.—Giug.]
2. **S. Ulmaria** L. sp. 702.
   Ital. *Barba caprina, Regina dei prati, Olmaria.*
   ♃ Prati umidi, lungo rivi e fossi = Losone — Piano di Magadino, fra i canneti di *Phragmites vulgaris* — Bellinzona — Lottigna — Bironico — Piano Scairolo.
   F. bianco. — [Giug.—Lug.]
   Ve n'ha una var. pelosa, che cresce ne' luoghi secchi (2).
   Pianta a odore forte e ricca di acido cianidrico. Può servire a conciare le pelli.
3. **S. Filipendula** L. sp. 436.
   ♃ Prati, tra il Ponte di Ascona e S. Materno, ora Villa Brunati — M. S. Giorgio, ne' boschi e prati alla Cascina sopra Meride.
   F. bianco, raremente rosso. — [Giug.—Lug.]

Fam. Rosaceae.

Dryas.

1. **D. octopetala** L. sp. 717.
   ♄ (suffrutice). Pascoli subalp. e alp. = Fusio — Campo V. Maggia — S. Gottardo — Campo alla Torba — S. Bernardino — Lucomagno — Camoghè — Noresso (Lenticchia).
   F. bianco. — [Lug.—Ag.]

Geum.

1. **G. urbanum** L. sp. 716.
   Ital. *Ambretta selvatica, Cariofillata.*
   ♃ Boschi, strade, luoghi umidi = Locarno (3).
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]
   Radice astringente, usata già nella diarrea dissenterica.

---

(1) Nel Sottoceneri, come a Cassarate, Sorengo, valletta del Tazzino ecc.
(2) È la var. *discolor* (Favrat).
(3) Fra Castagnola e Gandria, Maggia (Erb. Lenticchia).

2. **G. rivale** L. sp. 717.
   Ital. *Benedetta, Cariofillata acquatica.*
   ♃ Prati umidi, lungo fossi, rivi; dal piano alle alpi = Losone — S. Bernardino (1).
   F. giallo. — [Mag.—Lug.]
   Radice febbrifuga, non usata e forse a torto.
3. **G. reptans** L. sp. 717. (*Sieversia reptans* Sprgl.)
   ♃ Pascoli e luoghi ghiaiosi delle A. elevate = A. di Vignone sul S. Bernardino.
   F. giallo. — [Lug.—Ag.]
4. **G. montanum** L. sp. 717. (*Sieversia montana* Sprgl.)
   ♃ Pascoli subalp. e alp. = S. Gottardo — A. di Bosco V. Maggia — Motto Minaccio sopra Campo — A. di Arnavo — S. Bernardino — Camoghè (Lenticchia) (2).
   F. giallo. — [Lug.—Ag.]

Rubus. (3)

1. **R. Idæus** L. sp. 706.
   Ital. *Lampone selvatico, Amponello.* — Tic. *Fambreus.*
   ♃ Comune ne' monti, ascende fino a 1000 m. = M^ti d' Intragna, di Lodano, di Campo V. Maggia — M^ti del Sottoceneri (Lenticchia).
   F. bianco. — [Giug.—Lug.]
   Frutti refrigeranti, eduli, atti a far conserve, gelati, bibite gradite.
2. **R. fruticosus** L. sp. 707 (4).
   Ital. *Rovo, Rovo di macchia.* — Tic. *Rüvid* (la pianta), *Mora* (il frutto).
   ♃ Comunissimo nelle boscaglie, luoghi incolti, vicino ai muri = Locarno, ecc.
   F. bianco o roseo. — [Mag.—Lug.]
   Il frutto si mangia e da anche un vino saporito ma chesa un po' di muffa e non si conserva a lungo.
3. **R. cæsius** L. sp. 906.
   Ital. *Rovo dal fior bianco.*
   ♃ Fra crepacci, lungo torrenti, ne' campi = Locarno — Lugano ecc.
   F. bianco. — [Giug.—Lug.]

---

(1) Airolo — M. Generoso, sotto Rovio (Erb. Lenticchia).

(2) La v. *nanum* Gaud. al Pizzo di Claro. (Silvio Calloni. Appunti della flora culminicola del Pizzo di Claro. Ann. C. A. T. 1887. p. 139).

(3) Aggiungere: *R. tomentosus* Borkh. Tra Maroggia e Rovio, ecc. (F^t). — *R. Radula* Weihe. Piano di Crespera nei dintorni di Lugano; presso Capolago (F^t). — *R. bifrons Vest.* Sopra Cadro (F^t). — *R. thyrsoideus* Wimm. (*R. candicans* Weihe?). Castagnola (Mari). — *R. cæsius-ulmifolius.* Parecchie forme per tutta la pianura e sui colli (F^t). — *R. tomentosus-ulmifolius.* Sotto Rovio, ecc. (F^t). — *R. Radula-ulmifolius.* Capolago, alle cantine (F^t). Ho trovato parecchie altre specie, ma non sono ancora determinate (F^t).

(4) Il *R. fruticosus* di Franzoni (*R. ulmifolius* Schott. figlio) communissimo per tutta la pianura e sui colli (Favrat).

4. **R. sexatilis** L. sp. 708.
   Ital. *Rovo erbaiolo, gramignello.*
   ♃ Luoghi selvatici, rupestri; ascende fino a 1500 m. = M. Camoghè — M^ti di V. Colla.
   F. bianco. — [Giug.—Lug.]

Fragaria.

1. **F. vesca** L. sp. 709.
   Ital. *Fragola selvatica di bosco.* Tic. *Maggioster.*
   ♃ Freq. lungo strade, declivi; dal piano fino a 1500 m. = Locarno — Campo V. Maggia — Lucomagno, ecc.
   F. bianco. — [Mag. - Lug.]
2. **F. Indica** L.
   ♃ Locarno, lungo le strade, quà e là. Direbbesi acclimatizzata.
   F. bianco. — [Ag.]
3. **F. grandiflora** Ehrh. Beit. 7. p. 25.
   ♃ Coltivasi.
   F. bianco. — [Mag.—Giug.]
4. **F. chilensis** Ehrh. Beitr. 7. p. 26.
   ♃ Coltivasi.
   F. bianco. — [Mag.—Giug.]

Comarum.

1. **C. palustre** L. sp. 718.
   ♃ Luoghi paludosi, riva dei fossi = S. Gottardo — S. Bernardino, laghetto presso il villagio.
   Calice fusco purpureo internamente. — [Lug.—Ag.]

Potentilla.

1. **P. supina** L. sp. 711.
   ⊙ Campi, strade, lettamai = Presso Agno e piano di Bellinzona (Comolli).
   F. giallo. — [Giug.—Ag.]
2. **P. rupestris** L. sp. 711.
   ♃ Fessure rupi, luoghi sassosi, rupestri = Ponte Brola, rupi — M^to del Cantone presso Bignasco — Tra Cavigliano e Intragna — Tra Bosco e Cerentino — Collina di Pedrinate (Mari) — S. Salvatore — M. Brè — M. Bolia.
   F. bianco. — [Mag.—Giug.]

3. **P. Anserina** L. sp. 710.
Ital. *Argentina*, *Piè d'oca*, *Piè di gallo*.
♃ Prati umidi, fossi, strade = Presso Agno.
F. giallo. — [Mag.—Lug.]

4. **P. grammopetala** Moretti.
♃ Mesocco al Corno, rupi a diritta della Valle Forcola (Brügger, Muret). Conf. Gremli, fl. suis. ed. franc. 1886. p. 196.

5. **P. recta** L. sp. 711.
Ital. *Cinquefoglio*, *Fragolaccio*.
♃ Margini erbosi dei campi di pianura, declivi = Locarno, sotto alla Motta — Tra Brione e Minusio — Tra Sementina e Gudo.
F. giallo. — [Giug.—Lug.]

6. **P. argentea** L. sp. 712.
♃ Strade, luoghi incolti, sabbiosi, margine dei campi = Locarno — Orselina — Bellinzona — Tra Bodio e Giornico — Airolo.
F. giallo. — [Mag.—Lug.]

7. **P. reptans** L. p. 714.
♃ Strade, rive dei fossi, margine dei campi = Muralto, strada — Castagnola (Lenticchia).
F. giallo. — [Giug.—Ag.]

8. **P. aurea** L. sp. pl. 1. p. 712.
♃ Pascoli asciutti dei monti e delle alpi; freq. da 1200—2000 m. = M. Tamar — S. Gottardo — Naret — S. Bernardino — Pizzo di Claro (Calloni).
F. giallo. — [Giug.—Lug.]

9. **P. salisburgensis** Haenke in Jacq. collect. 2. p. 68. 1788. (*P. villosa* Crantz, *debilis* Schl., *baldensis* Kern.)
♃ Pascoli da 1100 a 2000 m. = M. Tamar, al Poncione di Neggio, freq^{e}.
F. giallo. — [Giug.—Lug.]

10. **P. verna** L. sp. 712 (1).
♃ Luoghi aprichi, secchi = Locarno, al Tazzino, a S. Biagio — Mendrisio, M. Brè ecc. (Lenticchia) (2).
F. giallo. — [Mar.—Mag.]

---

(1) Secondo Zimmeter, la *P. verna* = *P. salisburgensis* Haenke var. *firma* Gand. (var. *sabauda* DC.) — Questa var. *firma* probabilmente sul S. Bernardino, sul Gottardo, ecc. (F^{t}).

(2) A S. Zeno e Crespera si trova una var. *glandulifera* Krasan, secondo Zimmeter.

11. **P. opaca** L. sp. pl. 1. p. 713.
    ♃ Luoghi sassosi, fra virgulti, nelle rupi = M. Lucomagno — M. Ceneri, lungo la strada verso la Valle del Ticino (Comolli) (1).
    F. giallo. — [Mag.—Giug.]

12. **P. grandiflora** L. sp. 715.
    Ital. *Fragolaccia trifogliata.*
    ♃ Pascoli della reg. alp. = Sopra Cimalmotto in V. di Campo — Sopra Rima nella Lavizzara (Dr. Pometta) — S. Bernardino — M. Camoghè — A. di Piancabella in V. Colla (Comolli).
    F. giallo. — [Lug.—Ag.]

?13. **P. nivea** L. sp. pl. p. 715.
    ♃ Luoghi erbosi delle A. elevate da 1900 a 2300 m. = M. Ghiridone (Dr. Ferrini).
    F. giallo. — [Lug.—Ag.]

14. **P. alba** L sp. pl. 713.
    Ital. *Pentafillo bianco.*
    ♃ Selve, rupi = Bellinzona, rupi e rive tra il Ponte del Ticino e Carasso — Gorduno, prati al Galbisio, lungo i muri e fra muschi, ne' luoghi ombreggiati — M. S. Salvatore (2).
    F. bianco. — [Apr.—Mag.]

15. **P. caulescens** L. sp. pl. 2. p. 713.
    ♃ Rupi dei monti e delle alpi fino a circa 2300 m. = M. S. Salvatore — M. Generoso.
    F. giallo. — [Lug.—Ag.]

16. **P. Fragariastrum** Ehrhart. herbar. 146, Pers. syn. 2. 56.
    Ital. *Fragola secca, sterile.*
    ♃ Colline, rupi, muri vecchi, strade = Brione sopra Minusio, strada — Brissago — Ronco d'Ascona.
    F. bianco. — [Febb.—Apr.]

17. **P. micrantha** Ram. in De Cand. fl. franc. 4. p. 468.
    ♃ Luoghi rocciosi, sassosi = M. Generoso (Comolli) (3).
    F. bianco. — [Apr.—Mag.]

---

(1) Secondo Zimmeter, *P. opaca* L. = *P. verna* auct., e *P. opaca* auct. = *P. rubens* Crantz. Quest' ultima non ho mai veduta nel Cant. Ticino (Ft). Sarebbe stata trovata dal Prof. Penzig sul M. Generoso (Penzig: Emmerazione delle piante del M. Generoso, 1879) (Lenticchia).

(2) M. Generoso (Erb. Liceo Lugano).

(3) Astano (Erb. Lenticchia). — Vacallo (Muret, Favrat).

Tormentilla.

1. **T. erecta** L. sp. 716 = *Potentilla Tormentilla* Sibth.
   Ital. *Tormentilla*.
   ♃ Luoghi aridi di coll., selve, fra virgulti = Locarno — Brione — Luganese, freq^e (Lenticchia).
   F. giallo. — [Mag.—Giug.]

Sibbaldia.

1. **S. procumbens** L. sp. 307.
   ♃ Rupi delle A. da 1800—2400 m. = Motto Minaccio sopra Campo V. M. — A. di Bosco V. M. — Naret — S. Gottardo — Lucomagno — S. Bernardino.
   F. giallo. — [Lug.—Ag.]

Agrimonia.

1. **A. Eupatorium** L. sp. 643.
   ♃ Siepi, virgulti, campi aridi; dal piano fino a 1600 m. = Locarno — Mappo, strada — Campo V. M. — Olivone — S. Bernardino — Lugano — Manno — Mendrisio.
   F. giallo. — [Lug.—Ag.]

Rosa. (1)

1. **R. alpina** L. sp. 703.
   Tic. *Rosa selvadega*.
   ♄ Luoghi sassosi reg. subalp. e alp. fino a 1500 m. = Sopra Cimalmotto — Campo V. Bavona — M. Generoso (Comolli).
   F. rosco. — [Giug.—Lug.]
2. **R. Franzonii** Christ. (2)
   ♄ Boscaglie fra Mogno e Fusio, lungo strada carrozzabile. Scoperta e raccolta da me nell' Agosto 1866.

?3. **R. glandulosa** Koch. non Bellardi (*R. montana* Chaix).
   ♄ Campo V. M.
   F. rosei. — [Giug.]

---

(1) D' aggiungere:
R. abietina Gren. Selve presso Pazzallo (Mari) — Airolo — Monte Caprino — Presso Arogno (Favrat).
R. ferruginea Vill. — *rubrifolia* Vill. — M. Bisbino (Mari).
R. coriifolia Fr. — V. Maggia (Christ).
R. arvensis Huds. — Reg. mont.; M. di Cadro — Bolia, ecc. (Favrat); var. *transalpina* Christ. a f. bianchi. — [Giug.—Lug.]

(2) Ibrido *R. ferruginea* × *pomifera* Christ.

4. **R. canina** L. sp. 704.
   ♄ Siepi, luoghi incolti = Locarno, saleggi — Arcegno — Gudo — Bellinzona.
   v. *lutetiana* Lem. — Vezia (Pad. Agostino Daldini).
   v. *dumalis* Bechst. — Tra Losone e Golino — Muralto, strada — Locarno, saleggi.

?5. **R. collina** Jacq. (¹)
   ♄ Maroggia.
   [Giug.]

6. **R. dumetorum** Thuill.
   ♄ Campo V. M.
   [Lug.]

7. **R. Reuteri** God. (*R. glauca* Vill.)
   ♄ Airolo (Erb. Favrat) ecc.

8. **R. rubiginosa** L. mant. 564.
   Ital. *Rosa di macchia*, *Roselline di pruni*. — Tic. *Rosa selvadega*.
   ♄ Siepi, luoghi incolti = Locarno, saleggi — Bellinzona.
   F. roseo. — [Mag.—Giug.]

9. **R. pomifera** Herrm.
   Campo V. M. — Tra Mogno e Fusio — Airolo — M. Bolia (Erb. Favrat).
   [Lug.—Sett.]

?10. **R. systyla** Bast. (*R. stylosa* Desv.).
   M. S. Salvatore (P. Agostino Daldini, Luglio 1874).

11. **R. tomentella** Lem.
   Saleggi di Mappo presso Locarno — Bellinzona, dumi.
   [Giug.]

12. **R. subglobosa** Smith. (*R. tomentosa* Sm. v. *subglobosa* Sm.)
   Loco a S. Antonio, prati — Campo V. M., boschi.
   [Giug.]

13. **R. micrantha** Smith.
   Saleggi da Someo a Ruè.
   [Lug.]

14. **R. gallica** L.
   M. Bolia (Favrat) — M. S. Giorgio (Mari).

Le specie più comunemente coltivate ne' giardini sono:
R. lutea Mill. (Rosa gialla).
R. alba, ibrido della *R. gallica* (see. Gremli e Christ).

(¹) Specie critica, dumetorum × gallica?

R. damascena Mill.

R. centifolia L. (*Rosa centofoglie, Rosa d'Olanda*) e la sua var. **muscosa** (*Rosa borracina, Rosa della Teppa*) — **R. semperflorens** Ser.

Fam. Sanguisorbeae.

Alchemilla.

1. **A. vulgaris** L. sp. 178.
   ♃ Prati e pascoli delle valli, ascende nella reg. alp. = Broglio — Campo — Airolo — M. Generoso (Lentiechia).
   F. giallo-verdognolo. — [Giug.]
2. **A. subsericea** K. (*A. montana* Willd.)
   S. Bernardino — Campo V. M. — S. Gottardo?
   F. giallo-verdognolo. — [Giug.]
3. **A. fissa** Schummel. in Wimm. et Grab. fl. siles. 1. p. 136.
   ♃ M^ti ed alpi di V. Bavona verso il lago Nero e di V. di Peccia sopra l'alpe della Bolla — Motto Minaccio sopra Campo V. M.
   F. giallo-verdognolo. — [Ag.—Sett.]
4. **A. pubescens** M. Bieberst. fl. taur. cauc. 1. 114.
   ♃ Presso villaggio S. Bernardino, secondo Moritzi (Gremli Suppl. p. 72—73) — Tamaro, alpe di Neggio.
   F. giallo-verdognolo. — [Giug.—Lug.]
5. **A. alpina** L. sp. 179.
   ♃ Luoghi rupestri e ghiaiosi dei monti, da 1000—2000 m. = Campo V. Maggia — S. Gottardo — Lucomagno — S. Bernardino — M. Tamaro, sotto la forcorella sino alla cima. M^ti della V. Colla (Lentiechia) (¹).
   F. giallo-verdognolo. — [Giug.—Ag.]
   Radice aromatica, utile nelle diarrea e atonia di stomaco.
6. **A. pentaphyllea** L. sp. 179.
   ♃ Luoghi umidi, ghiaiosi delle alpi; da 1600—2500 m. = Motto Minaccio sopra Campo V. Maggia (freq^te) — S. Bernardino, strada postale poco sotto e sopra l'ospizio — S. Gottardo — Naret.
   F. verde. — [Lug.—Ag.]
7. **A. arvensis** Scop. car. 1. 115. (*Aphanes arvensis* L. sp. 179.)
   ⊙ Campi e luoghi incolti = Solduno — Vezia (Pad. Daldini).
   F. verde. — [Mag.—Sett.]

(¹) var. *subsericea* Rent. non Koch., in Gremli ed. fr. 1886. — V. Tremola (Muret, Favrat) — Sopra Nante verso il Passo di Sassello, comune (Favrat).

Sanguisorba.

1. **S. officinalis** L. sp. 169.
   ♃ Prati di pian. e di mont. fino a 1800 m. = Losone — Salciolo sotto Tenero — S. Bernardino (1).
   F. rosso-scuro. — [Giug.—Ag.]

Poterium.

1. **P. Sanguisorba** L. sp. 1411. (*Sanguisorba dictyocarpa* Spach.)
   ♃ Prati mont., fino a 1100 m. = Tra Giornico e Chironico — Campo — Luganese, freq^e (Lenticchia).
   F. verdognolo. — [Giug.—Ag.]

Fam. Pomaceae.

Cratægus.

1. **C. oxyacantha** L. sp. 683. (*Mespilus Oxyacantha* Gærtn.)
   Ital. *Bianco-spino*, *Marruca bianca*, *Azzarolo selvatico*. — Tic. *Spin bianc*, *Maniscieui*.
   ♄ arbusto. Siepi, boscaglie, ghiaie lungo fiumi = Lungo la Verzasca, la Maggia, il Ticino — Mendrisio, siepi ecc.
   F. bianco. — [Apr.]
   Frutti dolci, astringenti, farinacei, eduli. — Legno durissimo per lavori da tornio e bastoni.
2. **C. monogyna** Willd. (*Mespilus monogyna* Jacq.)
   ♄ Salciolo, alle Brerre presso Locarno.
   F. bianco. — [Mag.]
3. **C. Azarolus** L. sp. pl. 1. p. 683.
   Ital. *Azzarolo*, *Lazzerolo*, *Pomo imperiale*. — Tic. *Lazzarin*.
   ♄ arbusto. Coltivato.
   F. bianco. — [Mag.]
   Frutti eduli, rossi, bianchi o gialli. — Legno durissimo atto a molti lavori.

Cotoneaster.

1. **C. vulgaris** Lind. trans. linn. Soc. 13. p. 101.
   Ital. *Cotognastro*.
   ♄ fruttice. Luoghi mont., rupi = M. Ghiridone, trà Ronco e la Porera — Mendrisiotto.
   F. rosso. — [Apr.]
2. **C. tomentosa** Lindh.
   ♄ Rupi calcari del M. S. Salvatore.
   F. bianco. — [Apr.—Mag.]

(1) Airolo (Rhiner).

Mespilus.

1. **M. germanica** L. sp. 684.
   Ital. *Nespolo.* — Tic. *Münispür.*
   ♄ arbusto. Luoghi mont., fra dumi = Sotto Avegno, valletta di S. Biagio — Rebissale — M. S. Salvatore (Lenticchia).
   F. bianco. — [Apr.—Mag.]
   Frutti eduli; foglie astringenti.

Cydonia.

1. **C. vulgaris** Pers. syn. 2. 40.
   Ital. *Cotogno, Melo cotogno.* — Tic. *Pomm codogn.*
   ♄ Coltivato.
   F. bianco. — [Mag.]
   Frutti per cotognate; i semi per emulsioni.

Pyrus.

1. **P. communis** L. sp. 686.
   Ital. *Pero.* — Tic. *Per.*
   ♄ albero da 6—12 m. Coltivato in moltissime varietà; allo stato selvatico fra Giumaglio e Someo.
   F. bianco. — [Apr.]
   Legno atto a fare mobiglia.
2. **P. Malus** L. sp. 686.
   Ital. *Melo, Pomo, Melo selvatico.* — Tic. *Pom.*
   ♄ alb. da 4—10 m. Coltivato e anche selvatico; ascende fino a 800 m.
   F. bianco. — [Apr.]
   Legno buono per mobiglia.

Aronia.

1. **A. rotundifolia** Pers. Syn. 2. p. 39. (*Amelanchier vulgaris* Mœnch.)
   ♄ Declivi e fessure rupi de' monti = M. S. Salvatore — Mondascie presso Locarno — Colli d'Ascona.
   F. bianco. — [Mag.]
   Frutto edule.

Sorbus.

1. **S. aucuparia** L. sp. 684.
   Ital. *Sorbo selvatico.* — Tic. *Tamarin, Tameja e Tamegna* (V. Mag.).
   ♄ Monti, fin quasi a 1700 m. = M^ti di Bignasco, di V. Bavona, di V. di Campo — M. Tamaro — M^ti della V. Colla e tra Castagnola e Gandria. (Lenticchia).
   F. bianco. — [Mag.]
   Legno forte, duro, per lavori da tornio, intarsio e mobiglia. Frutti astringenti, grato pascolo ai tordi. Pianta per conciare le pelli e tingere in nero lana e seta.

2. **S. Aria** Crantz. aust. fasc. 2. p. 46.
Ital. *Lazzeruolo di montagna.* — Tic. *Sorba* (frutto).
♄ albero da 12—14 m. Boschi da 300—1400 m. = Solduno — Sopra e sotto Loco — M^ti di Golino — V. di Peccia a S. Carlo — V. Bavona a S. Carlo, freq^mo — Melano — Rovio, selve lungo strada — S. Salvatore (Lenticchia) (¹).
F. bianco. — [Mag.—Giug.]
Legno durissimo per lavori da torno. Frutti eduli, pascolo ai tordi.

3. **S. Chamæmespilus** Crantz. aust. p. 83.
Ital. *Salciagnolo.*
♄ arbusto. Declivi rupestri, luoghi umidicci dei monti = Alpi di Piancabella e di Sonvico (V. Colla).
F. bianco. — [Mag.—Giug.]

Fam. Granateae.

Punica.

1. **P. Granatum** L. sp. 618.
Ital. *Melagrano.* — Tic. *Pumm granaa, Pomm granat.*
♄ albero da 5—8 m.. Coltivato.
F. rosso vivo. — [Mag.—Giug.]
Frutto acidulo, edule. Corteccia, fiori e testa dei frutti contenenti molto tannino ed acido gallico; la radice ritenuta potente rimedio contro il verme solitario.

Fam. Onagrarieae.

Epilobium. (²)

1. **E. angustifolium** Koch. (*E. spicatum* Lam.)
Ital. *Epilobio, Camenerio, Sfenice, Garofanini d'acqua, Violine d'acqua.*
♃ Selve; luoghi umidi di coll. e mont. fino a 1400 m. = Tra Brontallo e Broglio — Campo V. Maggia — S. Bernardino — Sopra Domenica in V. Calanca, tra la strada della valle e il fiume — M. Ceneri — Greto della Maggia (Lenticchia).
F. porporini. — [Giug.—Ag.]
La radice si cuoce e si mangia come gli asparagi.

(¹) D'aggiungere: *S. hybrida* L. (*Pyrus pinnatifida* Scop., Ehrh. = *P. hybrida* Smith).
Pochi individui di questa pianta, credo gli unici in tutta la regione, vegetano a Ponna in V. Intelvi.
(²) D'aggiungere: *E. Fleischeri* Hochst. — S. Maria al Lucomagno (Mari) — Gottardo, Bernardino, ecc. (Favrat). Discende quà et là coi torrenti.

2. E. **Dodonaei** Koch. (*E. rosmarinifolium* Mœnch.)
   ♃ Alveo dei fiumi = Campo V. Maggia, fiume Rovana — Locarno, fiume Maggia — Piede S. Salvatore (Lenticchia) ecc.
   F. porporini. [Ging.—Ag.]
3. E. **hirsutum** L. sp. 494.
   Ital. *Epilobio, Garofanini d'acqua, Violine di padule.*
   ♃ Fossi = M. Ceneri.
   F. porporini. — [Mag. Lug.]
4. E. **parviflorum** Schreber. spicileg. p. 146. 1771.
   ♃ Prati paludosi, ascende nella reg. subalp. = Locarno — Bellinzona — M. Ceneri — Lucomagno (v. a stelo glabro)(1).
   F. rosso. — [Mag. -Lug.]
5. E. **tetragonum** auct. non. L. (*E. adnatum* Gris. in Gremli, ed. fr. 1886.)
   ♃ Luoghi umidi, fossi — Arcegno.
   F. rosso. — [Ging.—Lug.]
6. E. **collinum** Gmel. bad. 4. 265. (v. *collinum* K. del *E. montanum* L.)
   ♃ Muri e scogli — Navegna presso Locarno(2).
   [Ging.]
7. E. **montanum** L. sp. 494.
   ♃ Selve, virgulti = M. Ceneri.
   F. rosso. — [Mag.—Lug.]
8. E. **palustre** L. sp. 495.
   ♃ Prati paludosi, fossi = M. Ceneri — V. Canadra (Rhiner).
   F. rosso. — [Mag.—Lug.]
9. E. **roseum** Schreb. spicil. p. 147.
   ♃ Luoghi umidi, selve = Tra Rovio e Arogno — Pazzalino presso Lugano (Mari) — Ambri (Rhiner).
   F. rosso. — [Ging.—Lug.]
10. E. **alpinum** auct. non. Lin.(3) (*E. anagallidifolium* Lam.)
    ♃ Luoghi uliginosi = S. Bernardino, non lungi dalla fonte — M. Generoso (Mari).
    F. roseo. — [Lug.]
11. E. **origanifolium** Lam.
    ♃ Margine rivi nelle Alpi = Naret — S. Bernardino
    [Ag.]

---

(1) Mti della V. Colla (Lenticchia. Ann. C. A. T. 1886. p. 16).
(2) Airolo e sotto Ambri (Rhiner).
(3) L' *E. alpinum* L. contiene 4 specie, secondo Hausskneht.

Oenothera.

1. **O. biennis** L. sp. 492.

Ital. *Blattaria virginiana*, *Rapunzi*. — Tic. *Erba vitella*.

⊙ Rive dei fiumi = Locarno e Losone, rive della Maggia — Bellinzona, rive del Ticino. — Sigirino, lungo il Vedeggio (1).

F. giallo. — [Giug.—Lug.]

Isnardia.

1. **I. palustris** L. sp. 175.

♃ Luoghi uliginosi, fossi = Muralto, riva del lago — Laghetto di Muzzano (Mari) — Agno, fossi.

F. apetalo, verde. — [Lug.—Ag.]

Circæa.

1. **C. lutetiana** L. sp. 12.

Ital. *Circea*, *Erba Maga*.

♃ Abbonda nelle siepi, muri, luoghi ombrosi, fino a 800 m. = Locarno, alla Chiesuola presso Muralto — Giornico — Olivone (2).

F. bianco. — [Giug.—Lug.]

2. **C. intermedia** Ehrh.

Ital. *Erba Maga*.

♃ Lungo torrenti, fra dumi, della reg. subalp. = Valle di Vergelletto — Palagnedra — Rasa.

F. bianco o rossigno. — [Lug.—Ag.]

3. **C. alpina** L. sp. 12.

Ital. *Circea montana*, *Erba maga minore*.

♃ Selve ombrose, montane = Campo, selve lungo la Rovana — M. Lucomagno tra Campegli e l'Acqua-Calda — M. Tamaro, alpe di Caneggiolo — M. Generoso.

F. bianco o rossigno. — [Lug.—Ag.]

Trapa. (3)

1. **T. natans** L. sp. 175.

Ital. *Tribolo acquatico*, *Castagna d'acqua*, *Lagana*. — Tic. *Tabaccher*.

⊙ Piano di Magadino, fossi alla Carbonaia e in quelli delle Tabacchiere — Laghetto di Muzzano (4), d'Agno — Laghetto d'Origlio (Lentiechia).

F, bianco. — [Giug.—Lug.]

Frutti freschi eduli; ove abbondano si danno ai porci, che ne sono avidi.

---

(1) A Lugano, lungo il Cassarate, p. es. presso ponte di Davesco — Capolago ecc.

(2) V. Intelvi sopra Osteno, sui muri, ad Agnuzzo, freq.

(3) La *T. verbanensis* De Not. del lago Maggiore (Isole Borromee), secondo Jäggi, è una forma di *T. natans* L. col frutto a 2 spine (N. B. z. Fl. d. Schw. Fasc. IV° p. 8).

Coi frutti secchi si fanno collane, d'appendere ai quadri. che si vendono alla fiera di S. Provino ed Agno e a Locarno.

(4) Il Prof. Schrœter indica la Trapa di Muzzano come una var. (v. *Muzzanensis*) distinta per la presenza di 4 tubercoli.

Fam. Haloragcae.

Myriophyllum.

1. **M. verticillatum** L. sp. 1410.
   ♃ Agno, fossi — Riva di Mappo (¹).
   [Lug.—Ag.]
2. **M. spicatum** L. sp. 1410.
   ♃ Locarno al Roncaccio, nel lago — Vira, lago.
   [Lug.—Sett.]

Fam. Hippurideae.

Hippuris.

2. **H. vulgaris** L. sp. 6.
   Ital. *Coda di cavallo, Sperula d'acqua.*
   ♃ Fossi, luoghi uliginosi = Locarno al Roncaccio — Magadino, pozzanghere — Ponte di Tenero — S. Bernardino, laghetto presso il villaggio.
   F. bianchi. — [Mag.—Sett.]

Fam. Callitrichiaceae.

Callitriche (²).

1. **C. stagnalis** Scop. carn. 2. p. 251.
   Ital. *Erba gamberaja, Stellaria acquatica.*
   ♃ Acque stagnanti o correnti = Burbaglio, nell' acque del Rebissale (³).
   [Mar.—Ott.]
2. **C. vernalis** Kützing.
   Ital. *Erba gamberaja.*
   ♃ Acque = Locarno.
   Dalla primavera all'autunno.
3. **C. autumnalis** L. sp. 6.
   Ital. *Erba gamberaja.*
   ♃ Fossi = Locarno, roggia degli Orelli — Foce del rivó delle Seghe al Roncaccio.
   Autunno.

Fam. Ceratophylleae.

Ceratophyllum.

1. **C. submersum** L. sp. 1409.
   ⊙ Fossi = Locarno, nel Naviglio (raro — Piano d'Agno — Casoro, nel Ceresio.
   [Lug.—Ag.]

(¹) Laghetto di Chiasso (Cat. Gab. Lic. Lug. p. 55).

(²) Aggiungere: *C. minima* Hoppe (forma terrestre della *C. Hamulata* Kützing in litteris). Indicata da Rhiner nella V. Camadra.

(³) M. Ceneri (Rhiner).

2. **C. demersum** L. sp. 1409.
⊙ Fossi e acque stagnanti = Piano di Magadino, alle bolle (freq^{mo}).
[Ag.—Sett.]

Fam. Lythrarieae.

Lythrum.

1. **L. salicaria** L. sp. 640.
Ital. *Salicaria*, *Salcerella*, *Spergola*, *Verga rossa*. — Locar. *Çanestrell*.
♃ Fossi, lungo i fiumi, luoghi umidi; fino a 700 m.; frequente = Locarno — Piano Magadino — Tra Losone e Golino — Lungo il Vedeggio, il laghetto di Muzzano ed in altri luoghi del Luganese (Lenticchia).
F. rosso. — [Giug.—Sett.]

Peplis.

1. **P. Portula** L. sp. 474.
⊙ Luoghi umidi = Muralto, riva del lago — Agno — Riva S. Vitale, riva Ceresio — Tenero, nei pozzi, fra le rupi sotto al ponte col *Scirpus mucronatus* (1).
F. rosso. — [Lug.—Sett.]

Fam. Tamariscineae.

Myricaria.

1. **M. germanica** Desvaux ann. sc. nat. p. 349.
Ital. *Tamarice*. — Tic. *Tamars*.
♄ Alveo dei fiumi = Alveo del Ticino, tra Piotta e Ambri, Bellinzona — Alveo della Maggia, tra Somico e Peccia, Locarno (2).
F. carnei. — [Giug.—Lug. — Rifiorisce in Sett.]
Frutti danno un buon color nero.

Fam. Philadelpheae.

Philadelphus.

1. **Ph. coronarius** L. sp. 671.
Ital. *Gelsomino de' frati*.
♄ Coltivato nelle siepi e quasi spontaneo.
F. bianchi, odorosi. — [Mag.—Giug.]

Fam. Cucurbitaceae.

Cucurbita.

1. **C. Pepo** L. sp. 1435.
⊙ Coltivato. — F. gialli — [Giug.—Sett.]

---

(1) Sotto Naret verso Fusio (Rhiner).
(2) Luoghi incolti, sabbiosi e alveo de' fiumi nel Sottoceneri, come nel Cassarate.

Coltivansi le seguenti varietà

α. *Zucca comune, Zucca da mangiare* (Frutto oblongo).

β. *Zucca arancia* (Fr. sperico, nudo).

γ. *Zucca pera o Peretta* (Fr. piriforme od ovale).

δ. *Zucca rognosa o Cedrato* (Fr. ovato, verrucoso).

ε. *Zucca a pasticcino* (Fr. clipeiforme, depresso-umbonato).

2. **C. Melopepo** (L. sp. 1435).
Ital. *Zucca turca, Zucca turbante.*
⊙ Coltivata. — F. gialli — [Giug.—Sett.]

3. **C. lagenaria** L. sp. 1434.
Ital. *Zucca da tabacco, Zucca da pescare.* — Tic. *Zucca del coll.*
F. bianchi. — [Giug.—Sett.]
var. *Zucca da pellegrino* (Fr. in forma di fiasco).
I frutti divenuti legnosi si vuotano e servono a diversi usi (1).

Cucumis.

1. **C. sativus** L. sp. 1437.
Ital. *Cocomero.* — Tic. *Cocümer.*
⊙ Coltivato. — F. giallo — [Mag.—Sett.]

2. **C. Melo** L. sp. 1436.
Ital. *Poppone.* — Tic. *Melon.*
⊙ Coltivato in qualche orto. In generale se ne fa poco uso.
F. giallo — [Giug.—Ag.]

Bryonia.

1. **B. dioica** Jacq. austr. 2. p. 59. t. 199.
♃ Siepi e dumi = Fra Quartino e Cadenazzo, freq^{e} — Solduno (2).
F. giallognolo — [Mag.—Giug.] — Bacche rosse.

Fam. Portulaceae.

Portulaca.

1. **P. oleracea** L. sp. pl. 638.
Ital. *Erba da porci, Erba grassa, Porcellana selvatica.*
⊙ Giardini, orti, strade; freq^{te} a Locarno (3).
F. giallo — [Giug.—Ag.]
Si mangia da taluni in insalata e si tiene per antiscorbutica e diuretica..

---

(1) Aggiungere: **Cucurbita Citrullus** L. sp. 1435.]
Ital. *Anguria, Cocomero domestico.* — Tic. *Angüria.*
⊙ Coltivata in alcuni luoghi bene esposti al sole nel Luganese, dove il frutto giunge a maturazione verso la fine di Settembre. Qui non se ne fa grande consumo, perchè in generale non piace.

(2) Siepi nei dintorni di Lugano, come presso la stazione ferroviaria, il Paradiso ecc.

(3) Biasca. Lugano (Rhiner).

Montia.

1. **M. fontana** L. sp. 129 (*M. minor* Gmel.).
   ⊙ Rive laghi, strade = Muralto, Rivapiana, Burbaglio (riva lago Maggiore) — Fracce (fossi e strade) — Bellinzona.
   F. bianco — [Feb.—Apr.]
2. **M. rivularis** Gmel.
   ♃ Fossi = Presso Sonvico (Muret) — Sotto Brontallo, fossatello lungo strada — V. Calanca presso Arvigo — Sotto Broglio (Rhiner).
   F. bianco — [Mag.] — Autunno

Fam. Paronychieae.

Herniaria. (1)

1. **H. alpina** Vill. Delph. 2. 256.
   ♃ Rupi delle alpi = Naret, lungo discesa nella V. Torta verso Airolo.
   [Giug.—Ag.]

Illecebrum.

1. **I. verticillatum** L. sp. 280.
   ♃ Luoghi arenosi, umidi = Vicinanze di Mendrisio (2) — Arona.
   [Luglio.]

Fam. Scleranthea.

1. **Scleranthus annuus** L. sp. 580.
   Ital. *Centograni, Renajola.*
   ⊙ Campi, luoghi incolti, strade del piano = Locarno — Magadino (3).
   [Mag.—Giug.]
2. **S. perennis** L.
   Luoghi secchi, sabbiosi = Locarno, alla Maggia — M. Tamar.
   [Mag.—Giug.]

Fam. Crassulaceae.

Rhodiola.

1. **R. rosea** L. sp. 1465 (*Sedum Rhodiola* DC).
   Ital. *Radice idea.*
   ♃ Rupi delle alpi; da 1300—2000 m. = Bosco V. Maggia — Campo, sotto Gravirola — V. Bedretto — Sopra S. Maria al Lucomagno — M. Camoghè.
   F. rosso — [Lug.—Ag.]

---

(1) Aggiungere: *H. glabra* L. Camoghè (Mari) — Piotta (Brügger in Rhiner).
(2) Non vi si trova più.
(3) Sale anche nei monti, p. es. sul Garzirolo (Lenticchia. Ann. C. A. T. 1886. p. 160).
Aggiungere: *S. collinus* Horng. (*S. biennis* Reut.) — Sopra Airolo (Amstad in Rhiner).

Sedum [1].

1. **S. maximum** Sut. fl. helv. 1. p. 270.
   Ital. *Erba da calli, Erba S. Giovanni, Fabaria, Fava grassa.*
   ♃ Muri, rupi, luoghi sassosi delle valli basse = Da Locarno a Giornico — M. Tamar, Mairengo (Lenticchia).
   F. giallognolo — [Lug.—Sett.]

2. **S. Cepæa** L. sp. 617.
   ⊙ Luoghi sassosi, ombreggiati, muri, rupi = Locarno, alla Mad. del Sasso e al Tazzino — Rivapiana — Cugnasco — Lugano — Mendrisio.
   F. bianco — [Giug.—Lug.]

3. **S. atratum** L. sp. 617.
   ⊙ Luoghi sassosi, rupi, alpi; da 1300—2300 = S. Gottardo — S. Bernardino — Naret — Forca di Bosco. — Garzirola (Lent.).
   F. giallo-verdognolo — [Lug.—Ag.]

4. **S. annuum** L. sp. 620.
   ⊙ Rupi, muri, strade; dalla reg. montana alla nivale = V. Verzasca, tra Vogorno e Lavertezzo — Campo V. Maggia — Airolo — S. Gottardo.
   F. giallo — [Giug.—Ag.]

5. **S. album** L. sp. 619.
   Ital. *Erba granellosa, Erba grassa, Erba pignola.* — Tic. *Ris di ratt.*
   ♃ Muri e rupi = Locarno — Ponte Brola — Bellinzona — Giornico — Sottoceneri (Lenticchia).
   var. α. a petali più lunghi e segnati da striscia rosea al dissotto.
   var. β. a petali più stretti = Ronco d'Ascona — [Giugno.]

6. **S. dasyphyllum** L. sp. 618.
   Ital. *Erba della Madonna, Erba grassa, Erba muraria.* — Tic. *Ris de ratt.*
   ♃ Muri vecchi, rupi tanto di pian. che delle valli = Locarno — Bignasco — Bellinzona — Giornico — Lugano ecc.
   F. bianco — [Giug.—Lug.]

7. **S. acre** L. sp. 619.
   Ital. *Barracina, Erba da colli, Erba pignola, Erba grassa.* — Tic. *Ris de ratt.*
   ♃ Abbonda ne' luoghi aridi, muri, strade = Locarno — Bellinzona — Cevio [2].
   F. giallo — [Giug.—Lug.]

---

[1] Aggiungere: *S. purpurescens* Koch. — Osco sopra Faido.
[2] Airolo (Rhiner). — Piora (Lenticchia).

8. **S. sexangulare** L. sp. 620.
   ♃ Luoghi aridi, muri, rupi = Locarno — Bellinzona — M^ti della V. Colla (Lenticchia).
   F. giallo — [Giug.—Lug.]
9. **S. reflexum** L. sp. 618 (*S. rupestre* v. *reflexum* L.).
   Ital. *Erba grassa, Sopravvivolo dei muri.*
   ♃ Luoghi aridi, rupestri, arenosi = Locarno, saleggio — Ponte Brola, rupi (1).
   F. giallo — [Giug.—Lug.]

Sempervivum (2).

1. **S. tectorum** L. sp. 664.
   Ital. *Barba di Giove, Carcioffi grassi, Semprevivo.* — Tic. *Semperviv, Erba di call.*
   ♃ Frequente sui tetti, rupi di pian. e mont., fino a 1700 m. = Locarno, al Belvedere, S. Biagio, Tazzino (tetti e muri) — Ponte Brola, rupi — Mattignello sopra Cimalmotto, rupi — Bellinzona, — S. Salvatore e Gandria (Lentiichia).
   F. scuro-purporini — [Giug.—Ag.]
2. **S. montanum** L. sp. 665.
   ♃ Rupi delle alpi da 2000—2700 m.; scende nelle valli fino a 350 m.; freq. = Dalle cime del Gottardo per tutta la Laventina fino a Bellinzona — Campo V. Maggia — M. Camoghè (Lenticchia).
   F. rosso — [Giug.—Ag.]
3. **S. arachnoideum** L. sp. 665.
   ♃ Rupi delle alpi; da 1000—2000 m. = Gottardo — Campo V. Maggia (freq^te).
   F. roseo — [Lug.—Ag.]

Umbilicus.

1. **U. pendulinus** DC. pl. grass. t. 156.
   ♃ Muri, rupi = Belgirate, Lesa. — Finora non fu trovato nel C. T.
   F. canino — [Mag.—Giug.].

Fam. Cacteae.

1. **Opuntia vulgaris** Mill. dict. n. 1.
   ♃ Rupi = Scogli lungo burrone della Navegna presso Brione (Padre Agostino). — Scogli sopra Aseona e verso Losone (P. Agostino) — In un monte (?) a tre ore da Lugano (Gaudin).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
   Coltivasi quà e là ne' giardini e dicesi *erba dei colli.*

---

(1) Vira, Loco (Rhiner) — Cevio, Gandria (Lenticchia).

(2) D' aggiungere: *S. alpinum* Grisb.; sarebbe una forma del *tectorum*, da cui differisce per le foglie caulinari pelose, petali più lunghi, ciliati, di un bel rosa (V. Maggia sec. Christ).

Fam. Grossularieae.

Ribes.

1. **R. grossularia** (¹) L. sp. 291.
   Ital. *Grossularia, Uva spina.* — Tic. *Ribes, Uga spina.*
   ♄ Luoghi incolti, rupestri = S. Carlo in V. Peccia, freq^{te}.
   [Mag.]
   Coltivato anche ne' giardini. — Bacche eduli.
2. **R. nigrum** L. sp. 291.
   ♄ Coltivato.
   [Mag.]
3. **R. rubrum** L. sp. 290.
   Ital. *Ribes rosso.* — Tic. *Crosei.*
   ♄ Coltivato, talvolta subspontaneo.
   [Apr.—Mag.]
4. **R. petræum** Wulf. in Jacq. misc. 2. p. 36.
   ♄ Rupi, alpi, fino a 2000 m. = S. Bernardino, nella discesa verso la Valdireno (Comolli). Anche coltivato.
   [Lug.]
   Frutti di sapore assai astringente.

Fam. Saxifrageae.

Saxifraga.

1. **S. cotyledon** L. fl. lap. ed. 2. p. 141.
   Ital. *Sannicola delle Alpi, Sempreviro.*
   ♃ Rupi delle alpi granitiche; freq^{te} = Da Locarno a Faido — In tutta la V. Maggia fino a Campo e a S. Carlo in V. di Peccia (²).
   F. bianco — [Apr.—Lug.]
2. **S. Aizoon** Jacq. Fl. Austr. 5. p. 438. t. 438.
   ♃ Rupi delle alpi = Motto Minaccio sopra Campo (v. *brevifolia* Sternb.) — Bosco V. Maggia — V. di Peccia Lucomagno = A. Campo La Torba (Lent.) (³).
   F. bianco = [Lug.—Ag.]

(¹) È una forma del *R. uva crispa* L. a frutti più grandi, guernita di peli setacei. La specie è indicata da Rhiner nelle foreste sopra Airolo.

(²) M. S. Bernardo presso Lugano e M. Garzirolo.

(³) M. Generoso (Cat. Gab. Lic. Lug. p. 55).

3. **S. mutata** L. sp. 570.
   ♃ Rupi dei monti = M. Generoso — S. Bernardino — S. Giorgio, M[1]. sopra Cimadera (Lent.)
   F. ranciato — [Giug.—Lug.]
4. **S. cæsia** L. sp. 571.
   ♃ Rupi della reg. alpina e subalp. = Lucomagno, sopra Casaccia — S. Gottardo — M. Camoghè — M[1] sopra Cimadera (Lent.).
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
5. **S. oppositifolia** L. sp. 575.
   ♃ Rupi delle alpi = S. Bernardino — S. Gottardo, sopra il ponte di V. Tremola — M. Camoghè (Comolli) — Basodino in V. Bavona (1).
   F. rosso-ceruleo — [Giug.—Lug.]
6. **S. biflora** All. ped. 2. p. 71.
   ♃ Rupi delle alpi elevate = Forca di Bosco V. Maggia.
   F. bianco o roseo — [Lug.—Ag.]
7. **S. aspera** L. sp. 572.
   ♃ Luoghi petrosi e rupi nelle alpi e convalli = Campo V. Maggia —. S. Carlo in V. di Peccia — S. Gottardo — Novena — Comoghè — Bosco V. M., Piora, S. Lucio (Lent.).
   F. giallognolo — [Giug.—Ag.]
8. **S. bryoides** L. sp. 572.
   ♃ Rupi aride delle alpi = Alpi della Lavizzara (Dr. Pometta) — S. Gottardo, piedi della cima di Prosa (2).
   F. giallognoli — [Lug.—Ag.]
9. **S. aizoides** (3) L. sp. 576.
   ♃ Ghiaie torrenti alp. e subalp., fino nelle valli = Campo — Fusio — Valle di Peccia — Airolo — Bedretto — Novena — S. Gottardo — M. Lucomagno — S. Bernardino — Lostallo in Mesolcina — Brione Verzasca.
   F. giallo — [Giug.—Ag.]
10. **S. stellaris** L. sp. 572.
   ♃ Lungo rigagnoli e luoghi umidi delle alpi = Campo, sopra Quadrella, alpe di Sfilla — V. di Peccia a Frodalta — S. Gottardo — Lucomagno — Novena — M. Camoghè (Lavizzari).
   F. bianco — [Giug.—Ag.]

---

(1) M. Generoso (Cat. G. Lic. Lug. p. 55).
(2) Pizzo di Claro (Calloni. Ann. C. A. T. 1886. p. 139). — Tra Cerentino e Bosco V. M. (Lent.).
(3) *S. aizoides* × *mutata* — Grigna (Christ).

11. **S. Clusii** auct. helv. non Gouan. (*S. stellaris* L. v. *robusta* Engl.).
    ♃ Valli, lungo i rigagni = Da Bignasco a Broglio in V. Lavizzara, lungo strada.
    F. bianco — [Giug.—Lug.]
12. **S. cuneifolia** L. sp. 574.
    ♃ Rupi ombrose da 270—2000 m. = Locarno — S. Gottardo — M. Camoghè — Brissago, monti — Generoso (Lentiechia).
    F. latteo — [Mag.—Ag.]
13. **S. exarata** Vill. Delph. 4. 674 (*S. caespitosa* Gaud. non L.).
    ♃ Rupi e greti dei torrenti alp. = Campo, nella Valle di Cravairola, greti torrenti — Alpe di Piora, rupi e muricci — Piz Vigera, Predalp (Brügger) — S. Gottardo (v. *maculata* Rchb.), nelle alte vette.
    F. giallo — [Lug.—Ag.]
14. **S. compacta** Hegetschweiler Fl. d. Schw. N. 1175. p. 388 (forma della *S. Aizoon.* Conf. Heg. loc. cit.).
    ♃ Rupi = M. Camoghè (scoperta dal Prof. Heer a 2000 m.).
    F. piccoli, giallo-bianchi — [Lug.—Ag.]
15. **S. planifolia** Lapeyr. pyr. p. 31.
    ♃ Rupi ombrose delle alpi, da 1700—2700 m. = Motto Minaccio e Forca di Bosco V. Maggia — S. Gottardo (Lavizzari).
    F. giallognolo — [Lug.—Ag.]
16. **S. Seguierii** Spreng. cent. nov. pl. in mant. hal. p. 46. n. 38.
    ♃ Rupi delle alpi elevate = S. Gottardo — Naret — Motto Minaccio.
    F. giallo — [Lug.—Ag.]
17. **S. androsacea** Lin. sp. 571.
    ♃ Luoghi sassosi, umidi delle alpi = S. Gottardo, laghetto di Lucendro (Lavizzari).
    F. bianco — [Lug.—Ag.]
18. **S. tridactylites** Lin. sp. 578.
    ⊙ Luoghi aridi = Lugano — Mendrisio, prati — Bellinzona? muri — Arona, strada che conduce a San Carlo [1].
    F. bianco — [Apr.—Mag.]
19. **S. rotundifolia** Lin. sp. 576.
    Ital. *Erba stella.*
    ♃ Luoghi umidi della reg. subalp. e alp. = V. Bavona, sopra Foroglio verso Nassa — V. Campo, sbocco torrente Mattignello — M. Cumino sopra Intragna — Olivone — Lucomagno — M. Tamaro — M. Camoghè, alpe di Pesciarot — M. Generoso (Lentiechia).
    F. bianco — [Giug.—Ag.]

[1] Pendici del M. S. Salvatore, rupi calcari tra Menaggio e Nobialo.

Chrysosplenium.

1. **C. alternifolium** Lin. sp. 569.
   ♃ Luoghi umidi, ombrosi, lungo rigagnoli = Locarno, alla Guta, alla Fregera — Sottoceneri, freq^{e}. (Lenticchia) (1).
   F. gialli — [Mar.—Apr.]

Fam. Umbelliferae (2).

Sanicula.

1. **S. europea** Lin. sp. 339.
   Ital. *Erba fragolina*, *Sanicola*.
   ♃ Selve e luoghi ombrosi, umidi, dal piano fino a 1400 m. = Locarno, valletta della Guta, Mondascie — M. S. Giorgio.
   F. roseo — [Mag.—Giug.]

Astrantia (3).

1. **A. minor** Lin. sp. 340.
   ♃ Pascoli e selve da 350—2500 m. = Piano d'Albigo — V. Onsernone — M. Camoghè — A. Grande di Bosco V. M., Denti della Vecchia, Bolia, Generoso (Lenticchia).
   F. bianco — [Giug. - Sett.]
2. **A. major** Lin. sp. 330.
   ♃ Pascoli montani della reg. subalp. = Losone — M. Ceneri — Caprino — M^{ti} di Ronco d'Ascona — Sottoceneri, freq^{e}. (Lenticchia).
   F. bianco — [Mag.—Ag.]
   Radice, molto purgativa, adoperata dai veterinari.

Eryngium.

1. **E. campestre** Lin. sp. 337.
   ♃ Luoghi sterili = Bellinzona, arene del Ticino — Arbedo, presso gli argini del Ticino, nelle sabbie.
   F. verdognoli — [Lug.]

---

(1) Come nella Valletta di Ponte Cassarina presso Lugano, a Casima sul M. Generoso.

(2) Aggiungere: *Trinia vulgaris* DC. Freq^{e}. al S. Salvatore. Cresce anche sugli alti monti, come al Pizzo Claro (Calloni, Ann. C. A. T. 1886. p. 140), Cima Noresso in V. Colla (Lenticchia) e cima del Generoso (Siegfried).

(3) Aggiungere: *A. alpina* F. Schultz. Sul M. Ceneri con *A. major* e *minor* (Brügger 1863, Rhiner 1864).

Apium.

1. **A. graveolens** Lin. sp. 379.
Ital. *Sedano.* — Tic. *Seller.*
⊙ Coltivato. F. bianco — [Lug.—Ag.]
Si mangiano le radici e le foglie imbianchite.

Petroselinum.

1. **P. sativum** Hoffmann umb. gen. 1. p. 78.
Ital. *Prezzemolo.* — Tic. *Pedressegn.* —
⊙ Coltivato. F. giallognoli — [Giug.—Ag.]

Helosciadium.

1. **H. nodiflorum** Koch. umb. 126.
♃ Prati umidi, strade, fossi = Lugano — Riva S. Vitale — Tra S. Antonio di Balerna e Pontegana — Bellinzona.
F. bianchicci. — [Giug.—Lug.]

Aegopodium.

1. **A. Podagraria** Lin. sp. 379.
♃ Siepi, muri, dal piano ai monti = Locarno — Tenero — Bellinzona — Lugano (Lent.)
F. bianco — [Mag.—Giug.]
Pianta velenosa. La radice già in uso contro la podagra.

Carum.

1. **C. Carvi** Lin. sp. 378.
A Intragna detto *Caresg* (*Aegopodium* o *Carum?*).
⊙ Prati dei monti = M^a di Gordola — Campo e Rosco V. Maggia — Generoso (Mari), ecc.
F. bianco — [Mag.—Lug.]
Aromatica. Si adoperano i semi per condire il pane; la pianta è buon foraggio.

Berula.

1. **B. angustifolia** Koch. (*Sium angustifolium* L.).
♃ Fossi, ruscelli, stagni = Luvino, Agno. (?)
F. bianco — [Giug.—Lug.]

Pimpinella.

1. **P. magna** Lin. mant. 219 (¹).
♃ Prati = Locarno, a Burbaglio in un fossatello d'un prato dietro l'ultima casa del villaggio (1864) — Bellinzona — Paradiso, Cortivallo presso Lugano (Lenticchia).

(¹) *v. rubra* Hoppe (Calloni. Ann. C. A. T. 1886. p. 140).

2. **P. saxifraga** Lin. sp. 378.
♃ Pascoli = Madon. del Sasso a Locarno, rupi — Castagnola, S. Salvatore (Lent.).
F. bianco — [Mag.—Giug.]

Bupleurum.

1. **B. stellatum** Lin. sp. 340.
Ital. *Erba camozzina.*
♃ Rupi dei monti e delle alpi = M^e di Corzello sopra Corippo in V. Verzasca — Sopra Airolo (Rhiner) — Campo V. M. — Fusio — S. Bernardino — Camoghè.
F. verdognolo — [Giug.—Ag.]
2. **B. ranunculoides** Lin. sp. 243.
♃ Rupi reg. mont. = M. Camoghè — Generoso (Mari).
F. giallo — [Lug.—Ott.]
3. **B. caricifolium** Rchb. non Willd. (*B. ranunculoides* L. v. *canalense* Wulf).
♃ Rupi nel C. Ticino (Hegetschweiler) = Sopra Mandello sul Lario (Christ) (1).

Oenanthe.

1. **O. Lachenalii** Gmel. fl. bad. 1. p. 678.
Prati uliginosi = Piano di Magadino presso Riazzino
[Mag.]

Aethusa.

1. **A. Cynapium** Lin. sp. 367.
Ital. *Prezzemolo selvatico*, *Cicuta aglina*, *Erba aglina.*
⊙ Luoghi colti, giardini = Locarno — Castagnola e S. Salvatore (Lenticchia).
F. bianco — [Giug. - Aut.]
Velenosa, si confonde, con danno, col prezzemolo.

Fœniculum.

1. **F. officinale** All. ped. 2. p. 25 (*F. vulgare* Gærtn.).
♃ Rupi e declivi = Locarno, Tazzino, Ronchi d' Orselina, di Solduno e d' Ascona.
F. giallo — [Giug.—Ag.]

Seseli.

1. **S. coloratum** Ehrh. herb. p. 113 (*S. bienne* Reichb. = *S. annuum* L.).
⊙ Luoghi aprichi, rupestri = Bellinzona, rupi presso il ponte del Ticino.
[Lug.—Sett.]

---

(1) M. Generoso (Mari), Bolia, S. Giorgio (Favrat). S. Salvatore (Muret, Favrat, ecc.), Cima Noresso, Denti della Vecchia (Lenticchia). Il *graminifolium* non cresce nel Ticino, conf. Gremli ed. fr. 1886.

Cnidium.

1. C. **apioides** Spreng. umb. prodr. p. 40. (*Ligusticum apioides* Lam.).
   ♃ Prati di mont. = M. Generoso, alpe di Melano — S. Giorgio (Muret, Favrat, Jäggi).
   [Ging.—Ag.]

Athamantha.

1. A. **cretensis** Lin. sp. 352.
   ♃ Prati e rupi de' monti e delle alpi = M^ti di Campo V. Maggia — Monti sopra Cevio — Creste di Cadro presso Lugano — M. Generoso, sulla cima, var. *angustisecta* (Favrat, in Gremli N. Beitr., III p. 9).
   F. bianco — [Ging.—Ag.]

Ligusticum.

1. L. **Seguieri** Koch. umb. 105 (*Selinum Seguieri* L.).
   ♃ Prati mont. = M. Generoso, sopra l'Alpe di Melano (Gaud.) — M. S. Giorgio.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]

Meum.

1. M. **Mutellina** Gærtn. (*Phellandrium Mutellina* L. —
   Tic. *Erba Mottellina*, *Erba Mottarina*.
   ♃ Pascoli subalp. e alp. = S. Bernardino — S. Gottardo — Campo V. Maggia — Campo alla Torba — M^ti sopra Faido (Lenticchia).
   F. bianco o roseo — [Lug.—Ag.]

Gaya.

1. G. **simplex** Gaud. helv. 2. p. 389 (*Pachypleurum simplex* Rechb.).
   ♃ Pascoli delle alpi elevate = A. di Piora — A. di Bosco V. Maggia — A. di Campo alla Torba — Lucomagno.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]

Selinum.

1. S. **carvifolia** Lin. sp. 350.
   ♃ Prati umidi, ombreggiati, selve = Locarno, alla Guta, alle Mondascie — Maggia, selve.
   F. bianco — [Lug.—Sett.]

Angelica.

1. A. **sylvestris** Lin. sp. 361.
   ♃ Rivi, fossi, selve ombreggiate di pian. e mont. = Locarno, roggia degli Orelli, S. Biagio — Maggia, Gentilino (Lenticchia).
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
   Radice aromatica, stimolante.

2. **A. montana** Schleich. cat. 1815 (*Angelica sylvestris* L. v. *montana* Schl.).
♃ Luoghi ombreggiati, lungo torrenti e rivi = Locarno, sopra Fregiera lungo al Romagna.
F. bianco — [Lug.—Ag.]
Radice molto aromatica.

Peucedanum.

1. **P. Cervaria** Lap. abr. p. 149 (*Athamantha Cervaria* L.).
♃ Prati e selve montane = Tra Cavigliano e il ponte sull' Onsernone presso Intragna, rupi lungo la strada — M. S. Giorgio — Sul S. Salvatore e a' suoi piedi tra S. Martino e Melide — Tra Moscia e Ronco d'Ascona.
F. bianco — [Lug.—Ag.]
2. **P. Oreoselinum** Mœnch. meth. 82 (*Athamantha Oreoselinum* L.).
Ital. *Oreoselino* — Tic. *Seller de praa.*
♃ Prati, declivi aridi, selve; freq. = Locarno, prati dei Saleggi, S. Biagio, Tazzino, Monti — Tenero, prati del Salciolo.
F. bianco — [Giug.—Ag.]
3. **P. venetum** Koch. (1) (*Selinum venetum* Spreng.).
♃ Luoghi aridi di mont. e coll. = Ronco d'Ascona, strada da Moscia a ponte di Ronco — Cadenazzo, strada del M. Ceneri — Gordunio — Mendrisio — Castello S. Pietro — Balerna.
F. bianco — [Giug.—Ag.]
4. **P. rablense** Koch. umb. p. 94.
♃ Prati de monti = M. Generoso (2) e Gandria (Comolli) — S. Giorgio (Muret, Favrat).
F. bianchi — [Lug.—Ag.]

Imperatoria.

1. **I. Ostruthium** Lin. sp. 371 (*Peucedanum Ostruthium* Koch.).
♃ Pascoli pietrosi della reg. subalp e mont. = Campo e Bosco V. Maggia — Orselina, valletta del Rebissale — Airolo — S. Gottardo.
F. bianco — [Lug.—Ag.]
2. **I. angustifolia** Bellard (*Peucedanum angustifolium* Rchb.). Monte tra Lugano e Bironico (3) (Erb. Schleicher nel museo di Losanna!).
F. bianco — [Giug.—Lug.]

---

(1) *P. alsaticum* L., che ha fiori verdi, è più basso, divaricato del *P. venetum* Koch., manca nel Ticino.

(2) Conf. Siegfried (Rhiner) Fl. Tab. 1872).

(3) Forse sulle pendici meridionali del Tamaro; dalla parte dl settentrione non ho travato la rara ombrellifera (Favrat).

Pastinaca.

1. **P. sativa** Lin. sp. 376.
   ☺ Prati e colli = Locarno, prati lungo la strada cantonale.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]

Heracleum. (1)

1. **H. Sphondylium** (2) Lin. sp. 358.
   Volg. *Ortovena* (a Bignasco).
   ☺ Prati e selve umide = Locarno, S. Biagio, Tazzino, Belvedere — Tenero, prati del Saleiolo — Bignasco — Cavergno — S. Carlo in V. Bavona, ecc.
   F. bianco — [Ging.]
   Usansi le foglie per ingrassare i maiali, che ne sono assai ghiotti.
2. **H. asperum** M. B. (*H. montanum* Schleich.)
   ⊙ Prati, margini dei campi = Bignasco.
   F. bianchi — [Ging.—Ag.]

Tordylium.

1. **T. maximum** Lin. sp. 345.
   ☺ Colli incolti, fra dumi = Locarno, fra i dumi nelle campagne verso Solduno.
   F. bianco — [Ging.—Ag.]

Laserpitium.

1. **L. latifolium** Lin. sp. 356.
   ♃ Prati della reg. mont. e subalp. = Campo V. Maggia.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
2. **L. marginatum** (3) Waldst. et Kit. pl. rar. ung. 2. p. 210, t. 192. (*L. Gaudini* Moretti.)
   ♃ Luoghi aspri di mont., fra i frutici = M. Generoso.
   F. giallognolo — [Lug.—Ag.]
3. **L. Siler** Lin. sp. 357.
   ♃ Rupi della reg. mont. e subalp. = M. S. Giorgio, tra Meride e la Cascina — Sopra Airolo (Rhiner) — Lugano, rupi del S. Salvatore a S. Martino.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]

---

(1) Aggiungere: *H. sibiricum* L. M. Generoso, prati a circa 1300 m. (Penzig. Ennum. del M. Generoso 1879).

(2) La v. *elegans* Jacq. è la forma tipica specialmente delle Prealpi.

(3) La v. *roridum* in V. Maggia (Gremli, ed. fr. 1886 p. 258).

4. **L. peucedanoides** Lin. sp. 358.
   ♃ Reg. mont. e prealp. = Arcegno (1).
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
5. **L. hirsutum** Lam. fl. fr. 3, 648 (*L. panax* Gouan.).
   ♃ Prati della reg. alp. e subalp. = Campo V. Maggia — M^ti di Cevio — S. Gottardo.
   F. bianco — [Giug.—Ag.]
6. **L. pruthenicum** Lin. sp. 357.
   ⊙ Selve = Cadenazzo, salita del M. Ceneri — Maggia, selve castanili lungo la strada tra il ponte di Moghegno e il villaggio (2).
7. **L. nitidum** Zanted. (Koch. Taschenbuch p. 218).
   ♃ Rupi de' monti = Koch lo dà crescente nel Ticino, dove? (Taschenb. d. deutsch. und schw. Fl. 218. 1865) (3).

Daucus.

1. **D. Carota** Lin. sp. 348.
   ⊙ Prati, pascoli = Dapertutto.
   F. bianco — [Giug.—Ott.]
   Si coltiva per uso economico.

Torilis.

1. **T. Anthriscus** Gmelin. Fl. bad. 1. p. 163.
   ⊙ Luoghi selvatici, siepi, dumi = Locarno, strada — Bodio, ecc.
   F. bianco — [Giug.—Lug.]

Scandix.

1. **S. Pecten Veneris** Lin. sp. 368.
   Ital. *Spillettone, Pettine di Venere.*
   ⊙ Campi secchi in luoghi aprichi; comune = Mendrisio, valletta del Nebbiano — Balerna, tra S. Antonio e Pontegana ecc.
   F. bianco — [Mag.—Ag.]

Anthriscus.

1. **A. sylvestris** Hoffm. umb. p. 40.
   ♃ Prati, siepi, declivi; ascende fino alle alpi = Locarno — Brione — Orselina, prati, freq. — Lugano, ecc.
   F. bianco — [Mag.—Giug.]

---

(1) Grigna merid. (Christ).
(2) Abbonda sopra Airolo (Hofstetter. Conf. Rhiner. 1872).
(3) Grigna merid. (Christ).

2. **A. Cerefolium** Hoffm. umb. 41 (*Scandix Cerefolium* L.).
Ital. *Cerfoglio.*
☺ Coltivato = Locarno.
F. bianco — [Mag.—Giug.]

3. **A. vulgaris** Pers. syn. 1. 320 (*Scandix Anthriscus* L. = *Torilis Anthriscus* Gærtn.).
☺ Siepi, macerie, luoghi incolti = Mendrisio.
F. bianco — [Apr.—Mag.]

Chærophyllum (¹).

1. **C. temulum** Lin. sp. 370.
Ital. *Anacio selvatico, Pastricciani selvatici.* — Volg. *Cicutaria, Büg* (Bignasco).
☺ Luoghi incolti, siepi, dumi = Locarno — Tenero — Losone — Bellinzona — M. Generoso (Lentiechia) — M. Caprino (Brügger).
F. bianco — [Giug.—Lug.]
Velenoso, rifiutato dalle bestie.

2. **C. hirsutum** Koch. non L. (*Ch. cicutaria* Vill.)
♃ Prati, lungo rigagnoli, selve umide; dal piano alle alpi = Bignasco — M. San Bernardino (*β roseum*) (²) — M. Generoso (Mari).
F. bianco o roseo (var. *β*) — [Giug.—Ag.]

Molopospermum.

1. **M. cicutarium** DC. prodr. 4. p. 230 (*Ligusticum peloponesiacum* L.)
♃ Prati, margini selve = Bignasco, M^to del Cantone — Chironico di Leventina — Lucomagno, alla Casaccia — M. Generoso, all' alpe di Melano, alla Cascina, fra Cragno e Baldovana — M. S. Giorgio — Bogno in V. Colla.
F. bianco — [Giug.—Lug.]
Le foglie usansi a curare la rogna.

Conium.

1. **C. maculatum** Lin. sp. 349.
Ital. *Cicuta* — Tic. *Ciciita.*
☺ Luoghi incolti = Tra Melano e Capolago, strada — Scudellate.
F. bianco — [Giug.—Lug.]
Velenosa, produce delirio, vertigini e talvolta la morte. Usata nelle malattie del sistema ghiandolare, nell' ostruzione dei visceri e nella tisi scrofolosa.

(¹) D'aggiungere: *Ch. Villarsii* Koch., Cima Noresso in V. Colla (Lentiechia) e *Ch. aureum* L. M. Generoso (Mari).

(²) Anche a Brugiasco, Altanca in Leventina e al M. Generoso.

Pleurospermum.

1. **P. austriacum** Hoff. umb. p. 9.
   Ital. *Cicutaria*, *Cicutino*.
   ♃ Sopra la reg. del faggio = M. Generoso, discendendo dalla Crocetta verso Rovio.
   F. bianchi, grandi — [Giug.—Lug.]

Fam. Araliaceae.

Hedera.

1. **H. Helix** Lin. sp. 292.
   Ital. *Edera*, *Ellera* — Tic. *Ellora*, *Lellora*.
   ♄ Selve, rupi, muri; freq. dapertutto.
   F. verdi — [Ottobre]. Le bacche maturano nella primavera seguente.
   I tronchi adulti danno, per incisione, una resina ritenuta risolvente; i semi olio da ardere; le foglie pascolo gratissimo alle pecore; il legno bianchissimo serve per lavori da tornio.

Fam. Corneae.

Cornus.(1)

1. **C. sanguinea** Lin. sp. 171.
   Ital. *Sanguina*, *Verga sanguigna*. — Tic. *Sanguinella*.
   ♄ Siepi, dumi, pendii sassosi; dal piano ai monti più bassi = Locarno — Tenero — Arona — Breganzona, Castagnola ecc. (Lenticchia).
   F. bianchi — [Mag.—Giu.]
   Legno bianco-cenerognolo si presta per lavori da tornio.
2. **C. mascula** Lin. sp. 171.
   Ital. *Corniolo*.— Tic. *Cornaa*.
   ♄ Siepi = Locarno — Solduno — S. Martino, al piede del S. Salvatore (Lenticchia).
   F. gialli — [Feb.—Mar.]
   La conserva dei frutti, refrigerante e astringente, si usa nelle diaree de' fanciulli. — Legno duro e bianco, atto a lavori da tornio e a fare bastoni.

Fam. Loranthaceae.

Viscum.

1. **V. album** Lin. sp. 1451.
   Ital. *Vischio*. — Tic. *Visch*.
   ♄ Parassita sui rami di varii alberi, pomi, nocciuoli, frassini, ecc. = Vira Gambarogno — Cavergno — Broglio, boschi, freq. sulla quercia — Tra la Collinasca e Linesio in V. Rovana (2).
   F. giallognolo — [Mar.—Apr.]
   Dalle bacche bianche, poste in macerazione, si ottiene un buon vischio.

---

(1) Aggiungere: *C. stolonifera* Michz. (*C. alba* auct.) a foglie grigie al dissotto e a frutti bianchi. Siepi a Castagnola.

(2) Curreggia presso Lugano, sui nocciuoli.

Fam. Caprifoliaceae.

Adoxa.

1. **A. moschatellina** Lin. sp. 527.
   Ital. *Dentaria moscatellina*, *Fumaria*, *Ranuncolino muschiato*.
   ♃ Selve e siepi umide — Tra Faido e Osco — Mendrisio.
   F. verde, d' odore di muschio — [Mar.—Apr.]

Sambucus.

1. **S. Ebulus** Lin. sp. 385.
   Ital. *Ebolo*, *Sambuchella*. — Tic. *Sambüg selvadigh*.
   ♃ Luoghi incolti, dumi, strade, selve, spesso in compagnia della *Pteris aquilina*; fino a 1400 m. — Tra Gudo e Sementina, sotto la strada cantonale — Mendrisiotto — Luganese.
   F. bianco, esternamente rosseggiante. — [Giug.—Ag.]. Coccole nere.
   Decozione della corteccia e delle foglie contro le idropi; siroppo delle coccole diuretico; le foglie verdi vuolsi preservino i granai dai sorci.
2. **S. nigra** Lin. sp. 385.
   Ital. *Sambuco*. — Tic. *Sambüg*.
   ♄ Selve, siepi, presso ruscelli e le case dei contadini, freq. = Locarno, al Biagio, al Salciolo — Sottoceneri (Lenticchia).
   F. bianco — [Mag.—Giug.] — Coccola nera.
   Infusione de' fiori sudorifera; se ne usa per condire certi panetti di melica.
3. **S. racemosa** Lin. sp. 386.
   Ital. *Sambuco di montagna*. — Tic. *Sambüg de montagna*.
   ♄ Selve della reg. mont. e subalp.; fino a 1700 m. = Campo V. Maggia, freq.
   F. bianco — [Mag.—Giug.]. Coccola rosea.

Viburnum.

1. **V. Tinus** Lin. sp. 383.
   Ital. *Lauro selvatico*, *Lauro tino*.
   ♄ Coltivato ne' giardini. F. bianco — [Mar.—Apr.]. Rifiorisce in autunno — Coccole di color ceruleo metallico.
2. **V. Lantana** Lin. sp. 384.
   Ital. *Lantana*, *Lentaggine*, *Viburno*.
   ♄ Siepi, selve = Mendrisiotto — Melano — M. S. Giorgio, freq. — S. Salvatore (Lenticchia), ecc.
   F. bianco — [Apr.—Mag.]. Coccole prima verdi, poi rosse, nere alla maturanza.
   Dalla macerazione della corteccia ottiensi buon vischio.

3. **V. Opulus** Lin. sp. 384.
Ital. *Sambuco acquatico, Pallone di neve.* — Tic. *Ball de nev.*
♄ Siepi, lungo ruscelli, torrenti, luoghi umidi del piano e del monte = Tenero — Brione, lungo la Navegna — Arcegno.
Coltivata una v. a cime globose e fiori neutri.
F. bianco — [Mag.—Giug.]
Le bacche acerbe producono il vomito.

Lonicera. (¹)

1. **L. caprifolia** Lin. sp. 246.
Ital. *Madreselva, Caprifoglio.* — Tic. *Madresilva.*
♄ Selve di coll. = Locarno, a S. Biagio — Mendrisio, cantine.
Coltivata anche ne' giardini per ornamento.
F. bianchicci o purpurei — [Mag.—Giug.]
2. **L. etrusca** Santi.
♄ Selve di coll. = Orselina (P. Agostino Daldini).
F. bianchicci o purpurei — [Mag.]
3. **L. xylosteum** Lin. sp. 248.
Ital. *Gisilostio, Madreselva pelosa.*
♄ Selve, dumi di pian. e mont. = Locarno, salleggi — Tenero — Arcegno — Mendrisio (Lentiechia).
F. giallognolo-pallido — [Mag.—Giug.]. Coccola rossa.
Le coccole purgano con forza ed eccitano il vomito; le foglie gradite alle capre.
4. **L. cœrulea** Lin. sp. 249.
♄ Luoghi aperti, dirupi; reg. mont. e alp. = Campo V. Maggia — S. Gottardo.
F. bianco-gialli — [Mg.—Giug.]. — Coccole nere coperte di trina cerulea.
5. **L. alpigena** Lin. sp. 248.
♄ Selve mont. = M. Generoso.
F. rossigni — [Mag.—Giug.]

Linnæa.

1. **L. borealis** Lin. sp. 880.
♃ Serpeggiante fra i muschi ne' boschi spinosi delle alpi = Cimalmotto; boschi appiè della salita di Sfille — S. Bernardino — Airolo, sopra e sotto Nante (?).
F. bianco con striscie sanguigne nell' interno — [Lug.]

(¹) Aggiungere: *L. nigra* L. — Presso Casaccia, a 1600 m. (Erb. Lentiechia) e *L. Periclymenum* L. — Sepi a Locarno (Jäggi e Schröter).

Fam. Stellateae.

Sherardia.

1. **S. arvensis** Lin. sp. 149.
   ⊙ Campi di pian. e coll. = Locarno — Ronco d' Ascona — Bellinzona — Dintorni di Lugano, M. Brè ecc. (Lenticchia).
   F. violaceo — [Mag.]
   Le radici atte a tingere in rosso.

Asperula.

1. **A. taurina** Lin. sp. 150.
   Tic. *Vaniglia selvadiga.*
   ♃ Siepi e selve — Pedevilla — Melano — Da Riva S. Vitale alla cima del S. Giorgio — Mendrisio — Tra Salorino e Cragno — Castagnola — S. Salvatore (Lenticchia) — Capolago, cantine (Favrat).
   F. bianco — [Mag.—Giug.]
   Radice atta alla tintura della lana in rosso.
2. **A. longiflora** Waldst. et Kitaib. Pl. rar. Hung. 2. p. 162. t. 150 (*A. flaccida* Ten.; Gremli ed. ted. 1885, ed. fr. 1886).
   ♃ Boschi, dumi = Lugano, piè del S. Salvatore — Gandria — Generoso (Mari) [1].
   F. bianco — [Mag.—Ag.]
3. **A. cynanchica** Lin. sp. 151.
   Ital. *Asprello montano.*
   ♃ Luoghi aridi, aprichi; ascende fino a 1700 m. = Mendrisio — M. Generoso — S. Bernardino.
   F. bianchi o carnei — [Mag.—Giug.]
4. **A. odorata** Lin. sp. 150.
   Ital. *Asperella odorata.*
   ♃ Selve frondose di mont. = Orselina, alla valletta del Rebissale nelle selve castanili sopra il molino, fra fossi — M. S. Salvatore — M. S. Giorgio, in vari luoghi — M. Generoso, tra Salorino e Cragno.
   F. bianco — [Mag.—Giug.]
   L' erba disseccata dà buon odore; usata come ingrediente di un the economico per cura di primavera; la radice buona per tingere in rosso. In Germania se ne fa ricerca per dar profumo nel mese di Maggio al vino del Reno.

---

[1] M^di sopra Cimadera, Bolla (Lenticchia. Ann. C. A. T. 1886. p. 160) — Monte Caprino (Favrat).

Galium [1].

1. **G. cruciata** Scop. carn. 1. p. 100 (*Valantia cruciata* L.).
   Ital. *Valanzia cruciata.*
   ♃ Prati selvatici, dumi, siepi = Locarno — Luganese, freq. (Lenticchia) [2].
   F. giallo — [Apr.—Mg.]
   La radice dà color rosso.
2. **G. vernum** Scop. carn. 1. p. 99. t. 2 (*Valantia glabra* L.).
   ♃ Selve, prati, strade = Locarno, verso S. Biagio, Madonna del Sasso — V. Mesolcina (Moritzi) [3].
   F. giallognolo — [Mar.—Apr.]
3. **G. pedemontanum** All. Auct. 2.
   ⊙ Selve a Locarno verso Orselina e Brione (Io e P. Agostino Daldini) — Cevio, muricci presso la chiesa (Io, 1865) — Cadro (Muret).
   F. giallognolo — [Mag.]
4. **G. Aparine** Lin. sp. 157.
   Ital. *Attaccamani.*
   ⊙ Siepi, campi, luoghi incolti = Locarno — Bellinzona — Sottoceneri, comune (Lenticchia).
   F. bianco — [Mag.—Ag.]
5. **G. uliginosum** Lin.
   ♃ Prati uliginosi.
   F. bianchi — [Mag.]
6. **G. parisiense** Lin. sp. pl. 1. p. 157.
   ⊙ Soldano, campi — Mendrisio, campi (var. *litigiosum* DC.) [4].
   F. verde-giallognolo, esternam. rossigno — [Giug.—Ag.]
7. **G. palustre** Lin. sp. 153.
   Ital. *Gaglio palustre o acquatico.*
   ♃ Fossi, stagni, margini ruscelli = Someo (V. Maggia) — Cadenazzo — Magadino [5].
   F. bianco — [Mag.—Ag.]

---

[1] Aggiungere: *G. tricorne* With. Tesserete (Mari).

[2] A Laino in V, Intelvi ho trovato una forma a verticilli fogliari vicinissimi tra loro, quasi combaciantisi, e a foglie più lungamente lanceolate.

[3] Lugano, S. Salvatore, Generoso (Gremli, N. B. z. Fl. d. Schw. fasc. IV°. 1887. p. 9), Medeglia, tra Cugnasco e Gordola (Favrat) — Giornico.

[4] Tra Lugano e Gandria, sui muri, le due var.: a frutti rugosi, *ruricolum* Jord., e a fr. irsuti, *litigiosum* DC. (Favrat).

[5] Saleggi della Maggia a Cevio.

8. **G. rotundifolium** L. sp. 156
   ♃ Selve ombrose = Locarno, verso Solduno.
   F. bianco — [Giug.—Lug.]
9. **G. verum** Lin. sp. 155.
   Ital. *Gaglio giallo.*
   ♃ Margini dei campi, strade = Locarno — Ascona — Bellinzona — M. S. Giorgio — Generoso (1).
   F. giallo — [Giug.—Ott.]
   Il succo dell' erba fa cagliare il latte; la radice dà una tinta rossa.
?10. **G. verosimile** R. S. (considerato quale var. del *G. verum* L.).
   ♃ Luoghi ombrosi nel C. Ticino (Hegetschw. Fl. helv. p. 127).
   F. gialli — [Lug.—Ag.]
11. **G. purpureum** Lin. sp. 156.
   ♃ Luoghi incolti = Lugano, a S. Martino — Gandria — Da Melano a Rovio, strada — Salvatore, tra Castagnola e Brè (Favrat) — S. Giorgio (Lentiechia).
   F. rosso-sanguigno — [Giug.—Ag.]
12. **G. sylvaticum** Lin. sp. 155.
   ♃ Selve del piano e dei monti meno elevati = Locarno, a Orselina nella valletta del Rebissale.
   F. bianco — [Giug.—Ag.]
13. **G. aristatum** Lin. (*G. laevigatum* L.).
   ♃ Luoghi sassosi = Mergoscia in V. Verzasca — Lugano — M. S. Giorgio — M. Generoso, sopra e sotto l' alpe di Melano — M. Ceneri, M. Caprino ecc. (Favrat) — M. S. Salvatore (Muret).
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
14. **G. insubricum** Gaud. helv. 1. p. 421 (*G. elatum* Thuil.).
   ♃ Luoghi erbosi = Golino, nella vigna Maggetti — Rivera — Bironico — Capolago — Melano — Casòro — Tra Cernese e S. Pietro Pambio — Mendrisio, valletta del Nebbiano — Tra Pontegana e Vacallo (2).
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
15. **G. Mollugo** Lin. sp. 155.
   ♃ Prati secchi, strade, selve = Locarno — Bellinzona — Pedevilla.
   F. bianco — [Mag.—Giug.]

---

(1) La var. *præcox* Lang., Ticino (Gremli ed. fr. 1886). Confermato Lentiechia pei seguenti luoghi = Tra Castagnola e Gandria — Cima M. Brè — Paradiso — S. Salvatore. Gli exemplari del S. Salvatore hanno foglie quasi capillari, assai folte; quelli del M. Brè pannocchie compatte, voluminose, profumate e di un giallo assai carico.

(2) Presso Agno, Capolago, piè del Salvatore (Favrat).

16. **G. lucidum** auct. non All. (*G. rigidum* Vill. = *G. cinereum* Gaud.).
♃ Luoghi sassosi, sterili = Locarno, all' Annunziata — Solduno, rupi verso Ponte Brola — Bellinzona, rupi presso il ponte del Ticino — Gandria (1).
F. bianco — [Giug.—Ag.]

17. **G. rubrum** Lin. sp. 156.
♄ Prati secchi e strade di mont. = Orselina — Brione Verzasca — Golino, monti — Auressio in V. Onsernone — Gandria (2).
F. roseo — [Giug.—Ag.]

18. **G. sylvestre** Pollich. Fl. palatin. n. 151.
♃ Scopeti, margine selve = Colli d' Ascona, alla Mad. della Fontana — M^ti sopra Someo — Campo V. Maggia (3).
F. bianco — [Giug.—Ag.]

Fam. Valerianeae.

Valeriana.

1. **V. officinalis** Lin. sp. 45.
Ital. *Valeriana silvestre*, *Valeriana*, *Amantilla*.
♃ Selve, prati umidi, dumi, rivi; mont. e pian. = Losone, prati — Bignasco, M^e del Cantone — Sotto Cimalmotto, sbocco della valletta di Mattignello (4).
F. carnicino — [Mag.—Ag.]
Radice aromatica, vantasi efficace nelle affezioni nervose, epilessia, emicrania, ballo di S. Vito, febbri verminose e a far cessare i crampi; serve anche a confezionare l' esca per la pescagione.

2. **V. dioica** Lin. sp. 44.
Ital. *Valeriana palustre*, *Valeriana acquatica*.
♃ Prati umidi, paludi = Losone — Piano di Magadino, al Riazzino (5).
F. bianco — [Mag.—Giug.]

3. **V. tripteris** Lin. sp. 45.
Ital. *Valeriana alata*, *Valeriana trifogliata*, *Nardo montano trifogliato*.

---

(1) Faido, verso Airolo (Gremli. N. B. z. Fl. d. Schw. fasc. 14° 1887. p. 9). — Bogno — Tra Castagnola e Gandria la v. *erectum* (*G. dumetorum* Rap.).

(2) M^ti della V. Colla (Lentiechia; Ann. C. A. T. 1886 p. 160) — Sotto Cadro, a Nante e in Val Sambucco sopra Corte (Favrat).

(3) M. Generoso (Mari). La v. *anisophyllum* Vill. al Pizzo Claro (Calloni). Al Passo di Sassello la var. *hirtellum* Gaud. (Favrat).

(4) M. Generoso (Cat. Gab. Lic. Cant. Lug. p. 57). La var. *angustifolia* Tausch. sui monti, luoghi erbosi, petrosi.

(5) Attorno al laghetto di Muzzano, a Paolaccio presso Mendrisio (Cat. Gab. Lic. Lug. p. 56).

♃ Siepi, rupi dei monti = Mad. del Sasso sopra Locarno, rupi a tramontana — Colli sopra Losone — M^te del Cantone sopra Bignasco — Dirupi sopra Campo V. Maggia — Castello S. Michele di Bellinzona — M. Camoghè — V. Colla — M. S. Salvatore — M. Generoso — M. Tamaro [1].

F. bianco — [Mag.—Giug.]

Radice aromatica.

4. **V. montana** Lin. sp. 45.

Ital. *Valeriana montana, Nardo montano fatuo.*

♃ Rupi della reg. subalp. e alp. = Bignasco, M^te del Cantone — Nufenen — M. Generoso — Alpi di Cureggia e Sonvico.

F. bianco — [Giug.—Ag.]

5. **V. saxatilis** Lin. sp. 45.

Ital. *Nardo rupino.*

♃ Rupi alp. e subalp. = M. Noresso — Alpi di Sonvico — M^te di Meride — Denti della Vecchia (Muret, Favrat).

F. bianco — [Mag.—Lug.]

Aromatica e usabile come le altre specie.

Centranthus.

1. **C. ruber** DC. fl. fr. 4. p. 239.

Ital. *Valeriana rossa.*

♃ Luoghi aspri, montuosi = Locarno, alla Mad. del Sasso, ne' muri; forse coltivato.

Valerianella.

1. **V. olitoria** Mœnch. meth. p. 493 (*Valeriana locusta olitoria* L.).

Ital. *Dolcetta, Morbidello, Cecerello.* — Tic. *Formentin.*

⊙ Campagna di Solduno — Sottoceneri, comune (Lenticchia).

F. bianco — [Apr.—Mag.]

La pianta tenera si mangia in insalata.

2. **V. dentata** DC. fl. fr. 4. p. 241 (var. γ *dentata* DC. della *V. auricula* DC.).

Ital. *Locusta liscia, Dolcetta, Gallinelle.*

⊙ Campagna di Solduno, d'Ascona.

F. bianco — [Apr.—Mag.]

Si mangia come la precedente.

---

[1] M. Bré, M. Caprino.

Fam. Dipsaceae.

Dipsacus.

1. **D. sylvestris** Mill. dict. n. 2.
   Ital. *Scardiglione selvatico.*
   ⊙ Strada, margine campi = Tra Melano e Capolago — Tra Balerna e Chiasso.
   F. bianco — [Giug.—Lug.]
2. **D. pilosus** Lin. sp. 141.
   Ital. *Scardiglione peloso, Scardalana minore.*
   ⊙ Luoghi incolti, umidi, lungo rigagnoli = Gordola — Cugnasco — Osogna — Biasca — Tra Roveredo di Mesolcina e S. Fedele, comune lungo la strada — Presso la cascata della Buffalora in Mesolcina (1).
   F. bianco — [Lug.—Ag.]

Knautia.

?1. **K. longifolia** Koch (*Scabiosa longifolia* W. Kit.).
   ♃ Luoghi rupestri e pascoli; dal piano alle alpi = M. Ceneri presso il Sasso Corbaro — Alpi di Bosco V. Maggia — Lucomagno.
   F. violaceo-chiaro o lilacino — [Agosto.]
2. **K. sylvatica** Dub. bot. gal. 1. p. 257 (*Scabiosa sylvatica* L.) (2).
   ♃ Selve di coll. e mont. = Locarno, sopra S. Biagio — Tra Pianezzo e S. Antonio in V. Morobbia — Mendrisio — Castello, lungo la strada di Corteglia (freq$^{ma.}$) (3).
   F. rossi — [Lug.—Ag.]
3. **K. arvensis** Coult. dips. p. 29. (*S. arvensis* L.)
   Ital. *Vedovina campestre.*
   ♃ Campi, prati, margine selve = Locarno — Losone — Bellinzona — Mendrisio (4).
   F. cerulei — [Lug.—Ag.]

Succisa.

1. **S. pratensis** Mœnch. meth. 489. (*Scabiosa succisa* L.)
   Ital. *Succisa, Morso del Diavolo.*
   ♃ Prati e selve = Arcegno — M^{ti} di Corippo in Verzasca (5).
   F. cerulei — [Ag.—Sett.]

---

(1) Dongio (Rhiner).

(2) *Scabiosa dipsacifolia* Host. é a foglie più larghe.

(3) La var. *pubescens* Maly? in Gremli N. Beitr. IV° fasc. p. 11 = Capolago, cantine — Generoso ecc., comune nel Sottoceneri e probabilmente esclusiva della regione calda del Ticino, ove non ho veduto il tipo (Favrat).

(4) La var. *glandulifera* a Lugano (Mari); N. B. z. Fl. d. Schw. IV° fasc. 1887. p. 10.

(5) M. Bolia, riva laghetto di Muzzano (Lenticchia) — Sul M. Tamaro, sopra Rivera, si trova una varietá di piccole proporzioni (Jäggi e Schröter).

Scabiosa. (1)

? 1. **S. columbaria** Lin. sp. 143.
♃ Campi e colli aridi = Locarno — Ronco d'Ascona — Olivone — Isco, M. Brè (Lentiechia).
F. azzurro — [Lug.—Sett.].

2. **S. lucida** Vill. Delph. 2. p. 293.
⊙ Pascoli alpini e subalp. = Da Olivone a Campora (2).
F. rosso-lilacini — [Lug.—Ag.]

3. **S. graminifolia** Lin. sp. 145.
Ital. *Scabiosa a foglie di gramigna.*
♃ Luoghi aridi, rupi = Piede e pendici del S. Salvatore — Denti della Vecchia.
F. ceruleo — [Lug.—Ott.]

Fam. Compositae.

A) Corimbiferae.

Eupatorium.

1. **E. cannabinum** Lin. sp. 1173.
♃ Luoghi selvatici, uliginosi, fossi, muri = Locarno — Bellinzona, ecc.; dapertutto.
F. rossi — [Lug.—Ag.]

Adenostyles.

1. **A. albifrons** Reichb. (*Cacalia albifrons* Lin. fil. suppl. 353).
♃ Selve e pascoli subalp. e alp. = Campo di V. Maggia — Foroglio in V. Bavona, alla cascata — V. di Peccia — Lucomagno — S. Gottardo — M. Generoso.
F. rossi — [Giug.—Ag.]

2. **A. alpina** Bluff. e Fing. comp. Fl. germ. 2. p. 329.
♃ Pascoli subalp. e alp. = M. Generoso — Campo alla Torba — S. Gottardo — S. Bernardino.
F. rossi — [Lug.—Ag.]

Homogyne.

1. **H. alpina** Cassini Dict. sc. nat. 21. p. 412.
♃ Pascoli della reg. subalp. e alp.; freq. = M. Tamaro, alla Forcorella — Camoghè (Lavizzari) — Alpi di Bosco V. Maggia — Campo alla Torba — S. Gottardo — S. Bernardino, ecc.
F. rosso-porporini — [Giug.—Ag.]

---

(1) D' aggiungere: *S. agrestis* W. Kit. = Airolo (Siegfried). — Da Faido a Locarno (Christ); Gremli N. Beitr. III° p. 10. — M. Ceneri (Brügger in Rhiner) — M. Tamaro (Jäggi, Schröter).

(2) Cima del Noresso (erb. Lentiechia).

Tussilago.

1. **T. Farfara** Lin. sp. 1214.

Ital. *Farfara Farfugio.* — Tic. *Corberella* (V. Morobbia).

♃ Frequente ne' luoghi umidi, ghiaiosi, gore = Lugano — Tra Mendrisio e Capolago — Mendrisio, valletta del Nebbiano — Meride — S. Giorgio — Losone, prati — V. Morobbia, piedi della salita all' Alpe di Giggio (Gigg) — Lucomagno, alpe di Campora e Casaccia.

F. giallo — [Mar.—Apr.]

Le foglie assai stimate dai contadini come vescicatorie, le applicano ai tumori, alle enfiagioni per farle venire a maturanza.

Petasites. (1)

1. **P. officinalis** Mœnch. meth. 568.

Ital. *Farfaraccio, Tussilaggine maggiore, Petasite.*

♃ Rigagnoli, riva fiumi, prati umidi = Mendrisiotto — Torricella (Lenticchia).

F. rosei e porporini — [Mar.—Apr.]

Radice amara, acre, aromatica, già reputata vermifuga, sudorifera, astringente.

2. **P. albus** Gærtner fruct. 2. p. 416.

♃ Rupi bagnate, lungo rigagnoli e torrenti = Locarno, valletta del Rebissale, di Fregiera, della Guta — Brissago, valletta del Monte — V. Morobbia — Cassarate, in Bogiogna, nella valletta del Tazzino e in altri luoghi del Luganese (Lenticchia).

F. bianco — [Mar.—Apr.]

3. **P. niveus** Baumg. Fl. transilv. 3. p. 94.

♃ Lucomagno, piano della Casaccia, lungo un torrente (Luglio 24. 1876) (2).

F. purpurei — [Mag.—Lug.]

Chrysocoma.

1. **C. Linosyris** Lin. sp. 1178 (*Linosyris vulgaris* Cassini).

♃ Rupi apriche = Locarno, rupi da Solduno a Ponte Brola — Tra Someo e Ruè e tra Ruè e Visletto in V. Maggia — Tra Ascona e Moscia.

F. giallo — [Lug.—Sett.]

---

(1) D' aggiungere: *Nardosmia fragrans* Rchb. (*Petasites fragrans* Presl. = *Tussilago fragrans* L.) — Bosco declive a Castagnola (Mari).

(2) Sotto Ghirone in V. Blenio, in massa (Rhiner).

Aster. (1)

1. **A. alpinus** Lin. sp. 1226.
   ♃ Pascoli secchi; da 1200—2400 m. — S. Gottardo — Lucomagno — S. Bernardino — Campo V. Maggia — Campo alla Torba — Camoghè (Lavizzari) — Generoso (Mari) (2).
   Raggi del fiore cerulei, disco giallo — [Lug.—Ag.]
2. **A. Amellus** Lin. sp. 1226.
   ♃ Rupi, declivi aspri, aprichi = Bellinzona, rupi al ponte del Ticino — Gandria — M. S. Giorgio — Mendrisio — Balerna (3).
   Raggi violacei, disco giallo — [Ag.—Ott.]

Bellidiastrum.

1. **B. Michelii** Cassini Dict. sc. nat. suppl. 4. p. 70.
   ♃ Declivi della reg. alp. e subalp.; s' abbassa nei colli e alla pianura lungo i fiumi, che ne scendono = Lucomagno — Tra Solduno e Ponte Brola — Tra il pian d'Albigo e i mulini di Golino, rupi — Tra Avegno e Gordevio, al sasso Pieggio — Bignasco — M. S. Giorgio (4).
   Raggi bianchi, disco giallo — [Giug.—Ag.]

Bellis.

1. **B. perennis** (5) Lin. sp. pl. 2. p. 1248.
   Ital. *Margherita*, *Bellide perenne*. — Tic. *Margaritin*.
   ♃ Comune ne' prati e rive erbose tanto di pian. che di mont.
   Raggi bianchi, disco giallo — [Feb.—Ottob.]

Stenactis.

1. **S. annua** (6) Cassini Dict. sc. nat. vol. 37. p. 462.
   ⊙ Campi, prati, margine fossi = Bellinzona sotto al Castello d' Unterwalden verso la Mad. della Neve — Mendrisio — Castello S. Pietro — Morbio — Sotto Rovio comune (Favrat) — Gordola (Rhiner).
   Raggi bianchi, disco giallo — [Lug.—Ag.]

(1) D' aggiungere: *Aster parviflorus* Nees; Lugano, sponda del lago presso il Cassarate (Mari Schneider. Favrat).

(2) Forca di Bosco V. Maggia, Pizzo Campello, Garzirola.

(3) Cima S. Salvatore, Denti della Vecchia.

(4) M^ti di Torricella.

(5) Colla v. *meridionalis* Favrat, a capitoli più piccoli: Fontana di Brè, sotto i castagni — sotto l'alpe di Cadro (Favrat).

(6) Originaria dall' America del Nord.

Erigeron. (1)

1. **E. canadensis** Lin. sp. 1209.
   Locar. *Canov selvadigh.*
   ⊙ Luoghi coltivi, ghiaie dei fiumi, strade; frequentissimo dal piano a 1200 m. = Locarno — Cevio — Campo (2).
   Raggi bianchi o rosei, disco giallognolo — [Giug.—Ag.]
2. **E. acris** Lin. sp. pl. 2. p. 1211.
   ⊙ Locarno, prato della Maggia — Bellinzona, pascoli in riva al Ticino — V. Morobbia, greti del torrente sopra la ferriera (3).
   Raggi rosso-violacei, disco giallognolo — [Giug.—Ag.]
3. **E. alpinus** (4) Lin. sp. 1211.
   ♃ Luoghi ghiaiosi delle alpi = Campo V. Maggia.
   Raggi rossigni, disco giallo — [Lug.—Ag.]
4. **E. grandiflorus** Hoppe (5) (var.? del *E. alpinus*).
   ♃ Luoghi aspri della reg. subalp = Campo V. Maggia, nella Auna.
   Raggi lilacini, disco giallo — [Lug.—Ag.]
5. **E. glabratus** Hoppe et Hornsch. Cent. Bl. et Fing. comp. fl. germ. 2. p. 364.
   ♃ Pascoli della reg. subalp. e alp. = Campo V. Maggia.
   Raggi purpuricci, disco giallo — [Lug.—Ag.]
6. **E. uniflorus** Lin. sp. 1211.
   ♃ Luoghi erbosi alpini; da 1700—2700 m. = Forca di Bosco V. Maggia — Generoso (Lentiechia).
   Raggi bianchi e purpuricci, disco giallo — [Lug.—Ag.]

Solidago.

1. **S. Virga aurea** Lin. sp. 1235 (6).
   ♃ Selve, luoghi incolti, strade; dal piano alle alpi; molte varietà = Faido — Bellinzona — Locarno — Cevio — Campo V. Maggia, ecc. — Luganese (Lentiechia).
   F. giallo — [Lug.—Sett.]

---

(1) Aggiungere: *E. angulosus* Gaud. (*E. droebachensis* auct.), Piotta (Brügger, conf. Rhiner; fl. tab. 1868. 1870. 1872), e la v. *Willarsii* Rchb., Valle Morella sopra Cevio (erb. Lentiechia).

(2) Originario dall' America del Nord. Frequentissimo anche nel Sottoceneri.

(3) Brugiasco in Leventina, M. Bolia.

(4) La v. *intermedius* Schl. all' A. di Campo la Torba.

(5) Ha calatidi del doppio più grandi del *E. alpinus* L. — „*Vedere var. macrocephala dell' E. alpinus*" (Koch ed. III, parte prima, p. 304).

(6) Aggiungere: v. *alpestris* W. K. (*S. valesiaca* Bor.), a stelo meno alto, a capitoli meno numerosi, più grandi, e a foglie più strette = A. Grande di Bosco V. Maggia — M^ti di Cevio; v. *cambrica* Sm. = A. Grande di Bosco V. M.

Buphthalmum.

1. **B. salicifolium** Lin.(1) sp. 1278.
   ♃ Prati declivi, dumi = Tra Pianezzo e S. Antonio in V. Morobbia — Mendrisio — Morbio.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
2. **B. speciosissimum** Arduin. sp. p. 26. t. 12. Indicata da Hegetschweiler nella sua Fl. d. Schw.
   Non cresce nella Svizzera italiana, sibbene nei monti di Menaggio, Griante, ecc. della finitima Prov. di Como (2).

Inula.

1. **I. salicina** Lin. sp. 1238.
   ♃ Colline apriche — Mendrisiotto? (3).
   F. gialli — [Lug.—Ag.]
2. **I. spiræifolia** Lin. sp. 1239 (*Inula squarrosa* L. Koch).
   ♃ Boschi e prati declivi = S. Martino, piede del S. Salvatore — Gandria — Mendrisio, prati della valletta del Nebbiano.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
3. **I. hirta** Lin. sp. 1240.
   ♃ Virgulti dei colli e monti = Gandria — M. Generoso — Salvatore.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
4. **I. britannica** Lin. sp. pl. 1237.
   ♃ Magadino, pascoli umidi lungo il Ticino.
   F. gialli — [Lug. -Ag.]

Conyza.

1. **C. squarrosa** Lin. sp. 1205 (*Inula Conyza* DC.).
   ⊙ Colli sterili, margine selve, virgulti. = Locarno, alla Mad. del Sasso — M. Generoso (Erb. Lic. Lug.).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]

---

(1) Abbondante sul M. Brè, Bolia. La v. *grandiflorum* L., a foglie più lunghe e più strette e a scaglie del ricettacolo non troncate, tien luogo della specie nel Sottoceneri (Lentiechia). — Questa var. è freq. al Salvatore, M. Caprino, Generoso, S. Giorgio (Favrat).

(2) Grigna, Corni di Canzo e S. Martino presso Menaggio (Christ).

(3) Nell' erbario Franzoni non ho trovato che esemplari dei dintorni di Losanna.

Pulicaria.

1. **P. vulgaris** Gærtn. fruct. 2. p. 461. t. 173.
   ⊙ Prati umidi, paludi = Magadino — Casòro — Torrazza, riva del lago — Tra Capolago e Riva S. Vitale (Muret).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]

2. **P. dysenterica** Gærtn. idem.
   ♃ Prati umidi, margine paludi, gore = Tra Arbedo e Biasca, strada, freq. — Tra Morbio inferiore e Vacallo.
   F. giallo — [Ag.—Sett.]

Galinsoga.

1. **G. parviflora** Cavanilles (*Wiborgia Acmella* Roth).
   ⊙ Oriunda dal Perù. Campi, luoghi incolti = Belinzona, in alcune vigne (vigna von Mentlen) (1).
   F. bianchi (raggi) — [Lug.—Sett.]

Bidens.

1. **B. tripartita** Lin. sp. 1165.
   ⊙ Luoghi paludosi, lungo fossi = Tenero, alle Brerre — Magadino.
   F. giallo — [Ag.—Sett.]

2. **B. cernua** Lin. sp. 1165.
   ⊙ Fossi, luoghi paludosi = Tenero, strada delle Brerre, frequente (2).
   F. giallo — [Ag.—Sett.]

Helianthus.

1. **H. annuus** Lin. sp. 1276.
   Ital. *Girasole*. — Tic. *Girasou*.
   ⊙ Nativo del Perù. Coltivasi qua e là ne' giardini e campi = Locarno — Maggia, ecc.
   F. giallo — [Ag.—Sett.]
   Dai semi si estrae olio.

2. **H. multiflorus** Lin.
   ♃ Coltivato frequentemente nei giardini pe' suoi fiori = Locarno.
   F. giallo — [Lug.—Sett.]

---

(1) Anche verso Viganello, nei M^ti di Sonvico e tra S. Nazzaro e Gera Gambarogno (margine strada), e sopra Giubiasco.

(2) Riva laghetto di Muzzano.

Carpesium.

1. **C. cernuum** Lin. sp. 1203.
   ⊙ Luoghi aspri, selvatici = Locarno, al Tazzino — Golino — Osogna, strada del paese — Gandria — Tra Ponte Tresa e Luvino — Tra Obino e Casima in V. di Muggio — Capolago, cantine (Favrat) — Lugano (Schulthess).
   F. giallo — [Lug.—Sett.]

Filago.

1. **F. germanica** L.
   var. **pyramidata** Gaud. (*F. spathulata* Presl.).
   Ital. *Bambagia selvatica, Brentini.*
   ⊙ Luoghi ghiaiosi, incolti = Locarno, letto della Ramogna — Bellinzona (Schulthess) — Val Maleneo (Brügger).
   F. giallognoli — [Lug.—Ag.]
2. **F. arvensis** Lin. sp. 1312.
   ⊙ Luoghi incolti, scopeti = Navegna, strada cantonale — Faido (Brügger) — Giornico — Bellinzona (Schulthess) — Morbegno (Salis) (1).
   F. bianchicci — [Ging.—Sett.]
3. **F. minima** Fries. nov. ed. 2. p. 268. (*Filago montana* Gaud.).
   ⊙ Luoghi incolti = Locarno — Moscia — Giornico (Brügger) — Val d'Agno (Br.) — Calanca (Salis) — Morbegno (Br.) — Lugano (Huguenin) (2).
   F. bianchiccio — [Lug.—Ag.]

Gnaphalium.

1. **G. sylvaticum** Lin. sp. 1200.
   ♃ Luoghi incolti, selve castanili = Navegna — Vogorno — Lavertezzo — V. Morobbia — V. Campo, salita da Niva a Campo — V. Bavona (3).
   F. bianchicci — [Ging.—Ag.]
2. **G. norvegicum** Gunner fl. norv. p. 105. 1776 (*G. sylvaticum* v. *fuscatum* Wahl.).
   ♃ Alpi = Campo, al Motto Minaccio — S. Bernardino — Calanca (4).
   F. bianchiccio — [Lug.—Ag.]
3. **G. supinum** Lin. syst. nat. 3. p. 235.
   ♃ Luoghi scoscesi delle alpi, strade = Campo V. Maggia, alpe di Quadrello — S. Gottardo — S. Bernardino — Misocco — M. Generoso (Mari) — Camoghè.
   F. bianchiccio — [Lug.—Ag.]

---

(1) Osco in V. Leventina, abbondante sui muri.

(2) M. S. Bernardo presso Lugano.

(3) Mendrisio (Erb. Lic. Lug.), M. S. Giorgio, Bolia (Lent.). — La v. *citrinum* Gaud. sopra Mendrisio, andando al Generoso (Erb. Muret).

(4) S. Gottardo.

4. **G. uliginosum** Lin. sp. 1196.

⊙ Luoghi umidi da 300—1700 m. = Magadino — Tra Giumaglio e Someo, strada — Campo alla Torba, poco lungi dalla salita al lago — Dazio grande (Heer).

F. bianchiccio — [Lug.—Sett.]

5. **G. luteo-album** Lin. sp. 1196.

⊙ Luoghi incolti, muri = Locarno — Minusio, alle Fracce — Tra Giornico e Chigiogna — Lugano — Isone (Schröter)(1).

F. bianchiccio, involucro paglierino — [Lug.—Sett.]

6. **G. leontopodium** Scop. (*Leontopodium alpinum* Cass.).

♃ Luoghi aprichi delle alpi = Campo alla Torba, salita al lago di Naret — S. Bernardino, alpe di Vignone — S. Gottardo — Forca di Bosco V. M. (Lenticchia).

F. bianco — [Lug.—Ag.]

7. **G. dioicum** Lin. sp. 1199 (*Antennaria dioica* Gærtn.).

♃ Colli aprichi, sterili, scopeti; da 300—2000 m. = Pian d' Albigo, tra Losone e Golino — Ascona, colli — Campo V. Maggia — M. S. Giorgio, sopra Riva S. Vitale (Lavizzari) — M. Ceneri.

F. bianchiccio, involucro talora bianco, talora rosso — [Giug.—Ag.]

8. **G. carpathicum** Wahl (*Antennaria carpathica* Bl. et Fing.).

♃ Pascoli e declivi alp.; da 1700—2400 m. = Forca di Bosco V. Maggia — Naret — S. Gottardo — Faido — Camoghè(2).

F. bianchiccio — [Lug.—Ag.]

Artemisia.

1. **A. Absinthium** Lin. sp. 1188.

Ital. *Assenzio domestico*, *Assenzio renano* — Tic. *Ascenzi*, *Medeghett* (a Olivone).

♃ Letto dei torrenti, luoghi sassosi, aprichi(3) = Olivone — Generoso (Mari).

F. giallognolo — [Lug.—Ag.]

Pianta amara, aromatica, stimolante, vermifuga, febbrifuga. La tintura d' assenzio, acquosa o spiritosa, è in uso massimo per la debolezza di stomaco e come digestivo. Se ne servo per fare *l' estratto d' assenzio.*

2. **A. Mutellina** Will. Delph. 3. p. 244. t. 35.

♃ Rupi apriche, alpi; da 1700—2400 m. = Valletta di Maltignello nella V. di Campo in V. Maggia — Forca di Bosco (Lenticchia).

F. giallognolo — [Lug.—Ag.]

Ha le stesse virtù, ma più efficaci, dell' assenzio e serve parimenti a fare l' estratto d' *absinthe.*

3. **A. Abrotanum** Lin. sp. p. 1185.

Ital. *Abrotano.*

♄ Coltivato ne' giardini = Locarno — Vira Gambarogno — Bellinzona.

F. verdognolo — [Sett.—Ott.]

Odore e sapore aromatici. Creduto vermifugo e stomatico.

---

(1) Gordola (Rhiner).
(2) Pizzo Vigera (Brügger in Rhiner, 1868. 1870. 1871).
(3) Qualche volta coltivato ne' giardini. Spontaneo al S. Giorgio sopra Brusino.

4. **A. pontica** Lin. sp. 1187.

Volg. *Incens pontich.*

♃ Oriunda dalla Dacia. Coltivata ne' giardini a Locarno, V. Maggia, freq.

F. giallo — [Ag.—Sett.]

Pianta aromatica.

5. **A. campestris** Lin. sp. 1185.

♃ Ghiaie de' fiumi, prati aridi, sabbiosi, strade; freq. — Locarno, saleggi — Golino — In tutta la valle del Ticino da Bellinzona fino a Giornico — Generoso (Mari) — Valle Maggia.

F. verdognolo — [Lug.—Sett.]

6. **A. Dracunculus** Lin. sp. 1189.

Ital. *Drogoncello, Dragone.* — Tic. *Estragon.*

♃ Oriundo della Siberia. Coltivato per uso di cucina, massime per aromatizzare l'aceto, a Locarno, Lugano.

F. verdognolo — [Ag.—Sett.]

Pianta aromatica d'odore e sapore d'anice.

7. **A. vulgaris** Lin. sp. 1188.

♃ Prati, luoghi incolti — Locarno — Losone, prati — Bellinzona — Valle Maggia.

F. giallognoli — [Lug.—Sett.]

Odore nauseoso, sapore assai amaro.

Tanacetum.

1. **T. vulgare** Lin. sp. 1148.

Ital. *Tanaceto.* — Volg. *Erba amara, Daneda* (a Locarno).

♃ Declivi incolti, strade; ascende ne' monti fino a 1400 m. — Locarno, ronchi del Belvedere e al Tazzino — Tra Sementina e Gudo — Magadino sup. — M. Tamaro, fra virgulti.

F. giallo — [Lug.—Sett.]

Ha odore di camomilla assai più intenso e sapore amaro, aromatico. Si usa talvolta per la cucina.

Balsamita.

1. **B. major** Desf. Act. Soc. hist. nat. 1. p. 3 (*Tanacetum balsamita* L.).

Ital. *Erba amara.* — Tic. *Erba de S. Peder.*

♃ Coltivata ne' giardini a Locarno, Bellinzona ecc. Presso Lugano non cresce spontanea, come indicarono varii botanici sulla autorità di Haller.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

Odore e sapore aromatici, gradevoli — Usasi nella cucina.

Santolina.

1. **S. Chamaecyparissus** Lin. sp. 1179.

♄ Coltivata ne' giardini a Locarno, Bellinzona.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

Odore e sapore aromatici.

Achillea.

1. **A. Ptarmica** Lin. sp. 1266.
   Ital. *Tarmica, Bottone d'argento, Sternutella.* — Tic. *Botton d'argent.*
   ♃ Fossi, prati umidi, dumi = Tra Melirolo e Carena in V. Marobbia — Presso Germignaga, lungo la Tresa — Locarno — Losone — Ascona — Bellinzona (1).
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
2. **A. alpina** auct. helv. (2) (*A. commutata* Heimerl.)
   ♃ Alpi = S. Gottardo, presso Airolo, secondo Gaudin; a me non riuscì di rinvenirla.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
3. **A. Clavenae** Lin. sp. 1266.
   Ital. *Assenzio ombrellifero.*
   ♃ Alpi = M. Generoso, alla cima (26 Luglio 1837).
   F. bianco-gialloguolo — [Lug.—Ag.]
4. **A. macrophylla** Lin. sp. 1265.
   ♃ Selve subalp. e alp. = M. Tamaro — Naret.
   F. bianco — [Giug.—Ag.]
5. **A. moschata** Wulf. in Jacq. fl. austr. append. p. 45.
   Tic. *Erba liva, Erba livia, Tanada* (in V. Calanca).
   ♃ Alpi, luoghi aspri, sassosi = M^ti di Corippo in Verzasca — Campo V. Maggia, a Quadrella, all'A. di Arnau — Alpi di Bosco — Campo alla Torba — Valle Calanca — S. Bernardino — Lucomagno — S. Gottardo — Val Tremola — Camoghè (Lenticchia).
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
   Di forte e grato aroma. I montanari se ne servono per fare un the, che reputano efficace come sudorifero e febbrifugo. Nella Engadina si raccolgono i fiori, che si mettono in commercio come un the. È uno dei componenti dei the svizzeri.
6. **A. atrata** Lin. sp. 1267.
   Tic. *Erba liva.*
   ♃ Alpi, lungo ruselli = S. Bernardino — Camoghè — M^ti della V. Colla (Lenticchia).
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
   Ha le stesse qualità, ma un po' più deboli della precedente.
7. **A. nana** Lin. sp. 1269.
   ♃ Luoghi sassosi delle alpi alte = Forca di Bosco V. M. — V. Sambuco, greto della Lavizzara — S. Gottardo (Lavizzari) — M. Generoso.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]

---

(1) La v. *alpina* Schl. in Reich. Fl. excurs., tra la V. Tremola e Airolo (Erb. Papon, Tour-de-Peilz, Vaud).

(2) *A. ptarmica* × *macrophylla?* Trovata una sol volta da Thomas all' entrata della V. Bedretto (Gremli, ed. fr. 1886 p. 289).

?8. **A. tomentosa** Lin. sp. 1264.
♃ Colli aspri, ghiaie = C. Ticino, secondo Hegetschw. (Fl. d. Schw.). Io non l'ho trovata.
F. giallo — [Lug.—Ging.]

9. **A. Millefolium** Lin. sp. 1267.
Ital. *Achillea, Millefolio.* — Tic. *Erba del tai, Zerla* (Losone, Comologno).
♃ Communissima = Locarno — Bellinzona ecc.
var. ε *alpestris* K. = Alpi di Campo V. M. — Lucomagno (Luglio).
F. bianco, talvolta roseo — [Ging.—Ott.]
I contadini l'usano per medicare le ferite, che si fanno tagliandosi, e per stagnare il sangue del naso.

10. **A. lanata** Spreng. syst. veg. 3. p. 601.
♃ Prati di mont. = Cima M. Generoso (Comolli) (1).
F. giallognoli — [Lug.—Ag.]

11. **A. tanacetifolia** Vill. herb. non All. (*A. dentifera* DC. = *A. stricta* Schleich.).
♃ Pascoli di mont. = M. Generoso (2) — Fusio — Val Calanca.
F. porporini. — [Lug.—Ag.].

?12. **A. nobilis** Lin. sp. 1268.
♃ Campi e colli aprichi = Luganese — Mendrisiotto.
F. bianco — [Ging.—Ag.]

Anthemis.

?1. **A. tinctoria** Lin. sp. 1263 (3).
♃ Colli aprichi = Trovata dal Padre Daldini (Loc.?), secondo Rhiner.
F. gialli — [Lug.—Ag.]
I fiori servono a tingere in giallo le lane.

2. **A. Triumfetti** Gaud. fl. helv. 5. p. 357.
♃ Prati e selve della reg. mont. e subalp. = M. Generoso, a Melano e nella salità di là all'alpe di Melano nella V. Mara.
F. bianco-giallognolo — [Ging.—Lug.]

?3. **A. austriaca** Jacq. fl. austr. 5. p. 22. t. 144.
⊙ Luoghi coltivati = Gaudin l'indica crescente nell'Elvezia insubrica (4).
[Lug.—Ag.]

---

(1) Divenuta rarissima. È una forma o var. dell'*A. tanacetifolia* (Favrat).
(2) Erb. Muret, Favrat ecc.
(3) L'*Anthemis Triumfetti* non si distingue dall'*A. tinctoria* che per i raggi bianchi.
(4) Probabilmente avventizia.

4. **A. arvensis** Lin. sp. 1261.
Ital. *Camomilla senza odore.*
⊙ Luoghi coltivati e incolti = Lottigna, strada — Luganese — Mendrisiotto.
Raggio bianco, disco giallo — [Giug.—Ag.]

5. **A. Cotula** Lin. sp. 1261.
Ital. *Camomilla mezzana, Cotula fetida, Tribolo.*
⊙ Campi e luoghi incolti = Presso Lugano.(1)
Raggio bianco, disco giallo — [Ag —Sett.]

Matricaria.

1. **M. Chamomilla** Lin. sp. 1256.
Ital. *Camomilla.* — Tic. *Camamella.*
⊙ Campi, giardini, luoghi colti; pian. e coll. = Locarno — Bellinzona ecc.
Raggi bianchi, disco giallo — [Mag.—Ag.]
Infuso dei fiori aromatici sudorifero, giova nelle cardialgie, coliche flatulente, isterismo, febbri intermittenti.

Chrysanthemum.(2)

1. **Ch. Leucanthemum** Lin. sp. 1251 (*Leucanthemum vulgare* DC.).
♃ Prati, selve = Locarno — Bellinzona — Mendrisio ecc.
Raggi bianchi, disco giallo — [Giug.—Lug.]

2. **Ch. montanum** Lin. sp. 1252. (v. *α adustum* Koch. o var. *atratum* del precedente in Gremli).
♃ Pascoli alp. e subalp. = Campo V. M. — Cimalmotto — Val Piora (Heer)(3).
Raggi bianchi, disco giallo — [Lug.—Ag.]

3. **Ch. coronopifolium** Vill. (*Chr. Halleri* Sut. = *Leucanthemum coronopifolium* Vill.).
♃ Luoghi pietrosi delle alpi = S. Gottardo — Motto Minaccio in V. Campo V. M.
Raggi bianchi, disco giallo — [Lug.—Ag.]

4. **Ch. alpinum** Lin. sp. 1253 (*Leucanthemum alpinum* Lam.).
♃ Luoghi rupestri delle alpi = Motto Minaccio — Forca di Bosco — Naret — S. Gottardo — Nufenen (Lavizzari) — Lucomagno — S Bernardino — Camoghè — Alpe Piancabella in V. Colla.

5. **Ch. Parthenium** Pers. Syn. 2. p. 462 (*Leuc. Parthenium* Gr. Godr.).
Ital. *Matricale, Crisantemo Partenio, Erba amara.* — Tic. *Erba mara, Crespola.*
♃ Coltivasi e trovasi anche ne' muri de' giardini e luoghi incolti = Locarno, sotto la Mad. del Sasso, in un luogo rupestre, dove pare quasi naturalizzato(4).
Raggio bianco, disco giallo — [Giug.—Sett.]

---

(1) Lottigna, Dongio (Rhiner).
(2) Aggiungere: *Ch. heterophyllum* DC. (var. b. Koch del *Ch. montanum*), che si trova al S. Giorgio, al M. Bolia (Gremli ed. fr. 1886 p. 292). — *Ch. montanum* L. v. *saxicola* Koch, il vero *Ch. montanum* DC. si dovrebbe trovare nella parte più meridionale della regione. — *Ch. Leucanthemum* var. *subpinnatifidum* Brügger al piè del monte Caprino (Br.) e a Bellinzona (Heer).
(3) Campo alla Torba, Camoghè.
(4) Melide, dietro un grotto (Lent.) — Generoso (Siegfried).

6. **Ch. corymbosum** Lin. syst. 2. p. 562 (*Leuc. corymbosum* Gr. Godr.).
Ital. *Crisantemo corimboso.*
♃ Selve di mont. — Sopra Gudo — M^ti di Ronco d'Ascona, sotto alla Porera — Tra Pianezzo e S. Antonio in V. Marobbia — M. Generoso (1).
Raggio bianco, disco giallo — [Lug.—Ag.]

7. **Ch. indicum** Lin.
Tic. (*Crisantemol.*
♃ Coltivasi frequentemente ne' giardini in molteplici varietà a Locarno, Bellinzona, Lugano, Mendrisio ecc.
F. bianchi, gialli, rossi, purpurini, rosei — [Sett.—Ott.]

Doronicum.

1. **D. Pardalianches** Lin. sp. 1247. var. *β.*
♃ Selve umide, siepi di coll. e mont. = Chiasso, sotto Vacallo — Riva S. Vitale — Melano — M. Generoso (2).
F. giallo — [Mag.—Lug.]

Aronicum.

1. **A. Clusii** Koch Syn. fl. germ. ed. 1. p. 382.
♃ Luoghi umidi e rupi delle alpi elevate — S. Gottardo — Lucomagno, valle de' Termini — Val Piora (Heer) — Generoso (Mari) — Camoghè.
F. giallo — [Lug.—Ag.]

2. **A. scorpioides** Koch idem.
♃ Luoghi pietrosi delle alpi elevate = Passo del Naret, nella discesa alla valle Torta — M. Prosa, 2000 m. (Wahlenb.) — Lucomagno (3).
F. giallo — [Lug.—Ag.]

Arnica.

1. **A. montana** Lin. sp. 1255.
♃ Abbonda ne' prati, luoghi incolti; coll. e mont. = Piano d'Albigo (270 m.) — M^ti di Locarno — M^ti di Someo (1000 m.) — Campo V. Maggia — Cimalmotto — S. Gottardo — S. Bernardino — Generoso ecc. (4)
F. giallo — [Giug.—Ag.]
Aromatica, medicinale. La polvere della radice ottimo rimedio nella diarrea e nelle febbri intermittenti. I fiori, usati freschi, si raccomandano nelle febbri atassiche, cefalalgia, paralisi incipienti. — La tintura alcoolica, preparata colle radici, è eccellente farmaco nelle contusioni e ferite.

---

(1) S. Salvatore — Cima M. Brè — Gandria — Arogno — Maroggia — Lugano — Bellaggio.
(2) Nella valletta di Ponte Cassarina presso Lugano (Erb. Lent.).
(3) Pizzo di Claro (Calloni. Ann. C. A. T. 1886. p. 140).
(4) Valletta del Tazzino presso Lugano.

Cineraria.

1. **C. longifolia** Jacq. austr. 2. p. 49 (*Senecio brachychaetus* DC.).
   ♃ Pascoli alp. = Alpe di Piora, tra l'alpe dell'Uomo e il laghetto più alto.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
2. **C. aurantiaca** Hoppe (*Senecio aurantiacus* DC. Prodr. 6. p. 261).
   ♃ Prati subalpini = Generoso (Comolli, Muret, Favrat ecc.).
   F. rosso-ranciati — [Giug.—Lug.]

?3. **C. capitata** Wahlemb. fl. carp. p. 276. (v. β. *discoidea* K.[1] della *C. aurantiaca*.).
   ♃ Pascoli alpini = M. Generoso.
   F. rosso-ranciato — [Giug.—Lug.]

?4. **C. spatulæfolia** Gmel. (*Senecio spathulaefolius* DC.).
   ♃ Luoghi montuosi, selvatici = M. Generoso (Amoretti)[2].
   F. giallo — [Lug.—Ag.]

Senecio.

1. **S. vulgaris** Lin. sp. 1216.
   Ital. *Cardoncello*, *Calderugia*, *Erba calderina*.
   ⊙ Luoghi colti e incolti, dapertutto.
   F. giallo. Fiorisce quasi tutto l'anno.
2. **S. viscosus** Lin. sp. 1217.
   ⊙ Luoghi incolti = Locarno — Salita da Cevio a Lunescio — Riveo presso Someo, strada — Airolo — Lugano — V. d'Isone, tra Isone e l'alpe di Sartena, sentiero[3].
   F. giallo — [Giug.—Ott.]
3. **S. sylvaticus** Lin. sp. 1217.
   ⊙ Luoghi incolti, boschi = Airolo — Tra Casòro e Cernese, selve castanili e luoghi pietrosi — Isone.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
4. **S. abrotanifolius** Lin. sp. 1219.
   ♃ Luoghi rupestri alp. e subalp. = Alpe di Sassello, sul Sasso Argenteo tra Gordola e Cugnasco — Alpe di Nassa sul M. Tamaro — M. Camoghè, alpe di Sartena — M. S. Jorio, alpe di Gigg, fra i *Rhododendron ferrugineum* — M. Generoso — Bolia — S. Lucio (Lent.).
   F. arancíato, elegante — [Giug.—Ag.]

---

(1) Mancante dei raggi.
(2) Nell'erb. del Lic. di Lugano trovansi esemplari di questa loçalità (Cat. Gab. p. 58).
(3) Ludiano (Rhiner).

5. **S. Jacobea** Lin. sp. 1219.
   Ital. *Erba S. Jacapo, Jacobea.*
   ⊙ Prati, luoghi incolti, selve — Locarno, Consiglio Mezzano.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
6. **S. aquaticus** Huds. angl. 366.
   ⊙ Prati umidi — Piano di Magadino — Cadenazzo — Castione — Tra Malvaglia e Biasca — Arcegno — Porlezza — Misocco (Br.)(1).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
7. **S. cordatus** Koch (*S. cordifolius Clairv.*).
   ♃ Pascoli e selve alp. e subalp., intorno alle cascine delle alpi col *Rumex alpinus* e l'*Aconitum Napellus* — S. Gottardo — S. Bernardino.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
8. **S. incanus** Lin. sp. 1219.
   ♃ Pascoli alp. — Alpi di Bosco V. M. — Alpi tra V. Bavona e V. di Peccia — S. Gottardo — M. Camoghè(2), alle bocchette tra l'alpe di Rivolta e di Sertena e ai pascoli di Sertena — M. S. Jorio — M. S. Lucio — M. Generoso.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
9. **S. carniolicus** Willd. (var. del *S. incanus* L.).
   ♃ Alte alpi = M. Camoghè, alla vetta(3) (Heer) — Colla (Siegfried) — Legnone (Salis).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
10. **S. nemorensis** Lin. sp. 1221 v. *odoratus* Koch (*S. Jacquinianus* Rchb.)(4).
   ♃ Selve di coll. e mont. = Locarno, al Tazzino — Mendrisio, al Paolaccio (Lavizzari).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
11. **S. Fuchsii** Gmelin. Fl. bad. 3. p. 444 (*S. nemorensis* L. v. *Fuchsii* Koch = *S. saracenicus* L. ex. Godr. et Kern.).
   ♃ Selve di mont. = Tra Gordevio e Maggia — Campo V. Maggia — Pianezzo in V. Morobia — Dazio Grande — Maggia — Tra Bosco e Cerentino — S. Salvatore (Siegfried)(5).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
12. **S. paludosus** Lin. sp. 1220.
   ♃ Prati paludosi, fossi = Agno.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]

---

(1) M. Ceneri (Brügger in Rhiner).

(2) Al Camoghè l'ibrido *incanus* × *abrotanifolius* (Siegfried).

(3) Non l'ho veduto (Favrat).

(4) Differisce dal *S. Fuchsii* per le foglie più ovate a picciuolo largamente alato, gli acheni quasi lunghi come il pappo. Trovasi anche alla Mad. d'Ongero sopra Carona e nella valletta di Ponte Cassarina presso Lugano.

(5) La v. *petiolata* al M. Generoso (Mari); N. B. z. fl. d. Schw. IV° fasc. 1887. p. 12. La specie anche al M. S. Giorgio.

13. **S. Doronicum** Lin. sp. 1222.
♃ Luoghi scoscesi, prati della reg. subalp. e alp. = Campo V. Maggia — S. Gottardo — M. Generoso — Valle Calanca (Br.) — Corni di Canzo (Salis).
F. giallo — [Lug.—Ag.]

B) Cynareae.

Calendula.

1. **C. officinalis** Lin. sp. 1304.
Tic. *Fior de S. Peder*, *Fior de Mort*.
⊙ Coltivasi ne' giardini e cresce quasi spontanea nei ruderetì = Locarno.
F. giallo — [Mag.—Ott.]
La pianta intera manda un forte odore; s'usa talvolta in medicina.

Echinops.

?1. **E. sphærocephalus** Lin. sp. 1314.
♃ Vigneti, luoghi sassosi = C. Ticino (Hegetschw.).
F. bianco — [Lug.—Ag.]

Cirsium.(1)

1. **C. lanceolatum** Scop. carn. 2. p. 130.
Ital. *Cardo asinino*. — Locarn. *Insalata d'Asan*.
⊙ Strade, ruderi, fossi, pascoli = Locarno — Cevio — Bellinzona — Mendrisio ecc.
F. rosso — [Lug.—Ag.]
2. **C. eriophorum** Scop. carn. 2. p. 130.
⊙ Luoghi selvatici di mont., strade = Mendrisio — Capolago — Melano — Tra Casòro e Lugano (2).
F. rosso — [Lug.—Sett.]
3. **C. spathulatum** Gaud. Fl. helv. 5. p. 202. (β. *phyllis* (3) del precedente).
⊙ Strade, pascoli = Tra Casòro e Lugano — V. di Muggio, verso Monte.
F. rosso — [Lug.—Ag.]
4. **C. palustre** Scop. carn. 2. p. 128.
⊙ Prati umidi = Locarno — Campo V. Maggia — Airolo — S. Bernardino.
F. purpureo — [Lug.—Ag.]
5. **C. heterophyllum** All. ped. 1. p. 152. t. 34.
♃ Luoghi aspri, selvatici; reg. mont. e subalp. = M. Generoso — M. Tamaro — Sopra Rossa in V. Calanca — Airolo (Schulthess) — Tra Fusio e Mogno — Lucomagno.
F. purpurei — [Lug.—Ag.]

---

(1) Aggiungere: *C. oleraceum* × *Erisithales* (*Candolleanum* Näg.) — Mendrisio (Salis) — Val Asso (Heer). *C. oleraceum* × *palustre* (*lacteum* Koch) — Mendrisio (Salis).
(2) Gozzera dietro Ghirone, Generoso (Siegfried in Rhiner).
(3) Vedi Comolli fl. com. p. 124. 1848.

6. **C. Erisithales** Scop. carn. 2. p. 215.
   ♃ Selve; reg. mont. e subalp. = M. Generoso, sopra Melano — M. S. Giorgio — Carena in V. Morobbia verso la valletta — V. Calanca, tra Arvigo e Selma, strada, freq^{te} — Lucomagno, a Campiglia — Tamaro — Grigna — Como.
   F. giallo-paglierino — [Lug.—Ag.]
7. **C. rivulare** Link (*Carduus rivularis* Jacq.).
   ♃ Prati umidi, ruscelli; reg. mont. e subalp. — V. di Peccia, al fondo — Broglio — Sornico.
   F. rosso — [Giug.—Lug.]
8. **C. oleraceum** Scop. carn. 2. 124.
   ♃ Prati umidi, strade; pian. e coll. = Piano Scairolo, verso Agno.
   F. giallognolo — [Lug.—Ag.]
9. **C. acaule** All. ped. 1. p. 153.
   ♃ Prati secchi; reg. mont. e subalp. = Campo V. Maggia.
   F. porporino — [Lug.—Ag.]
10. **C. spinosissimum** Scop. carn. 2. p. 129.
   ♃ Luoghi umidi e rivi ne' pascoli alp. = Campo V. Maggia, nella salita al Motto Minaccio — S. Gottardo, sopra la V. Tremola.
   F. bianco-giallognolo — [Lug.—Ag.]
11. **C. arvense** Scop. carn. 2. p. 126.
   ♃ Luoghi colti e incolti = Somascona in V. Blenio — Arbedo — Bellinzona — Prato Carasso — Solduno — Tra Maggia e Gordevio — Mendrisio — Arzo.
   F. purpureo — [Lug.—Ag.]
   I contadini ne fanno un decotto, che danno alle vacche fresche di parto, come refrigerante.

Cynara.

1. **C. Scolymus** Lin. sp. 1159.
   Ital. *Carcioffo, Carcioffolo.* — Tic. *Articiocch.*
   ♃ Coltivato per la cucina. Si mangiano i calici (periclino).
2. **C. Cardunculus** Lin. sp. 1159.
   Ital. *Cardo, Cardone.* — Tic. *Cardon.*
   ♃ Coltivato per la cucina.
   Si mangiano le foglie. I fiori cagliano il latte.

Carduus.

1. **C. Personata** Jacq. a. 4 p. 25. t. 348.
   ♃ Prati alp. e subalp. e lungo torrenti = M. Generoso (Comolli) — V. di Peccia, ruscelli — Tra Peccia e Fusio (strada) (1).
   F. purpureo — [Lug.—Ag.]

(1) Tra Brugiasco e Airolo.

2. **C. defloratus** Lin. sp. 1152.
   ♃ Luoghi sassosi de' monti e delle alpi = M. Generoso — Vergeletto in V. Onsernone.
   F. purpureo — [Lug.—Ag.]
   var. ò. *rhaeticus* DC. (*C. carlinaefolius* Koch. Syn. Fl. germ. ed. 1. p. 403) = V. di Piora (Gremli) — Acquarossa, luoghi incolti — M. Generoso, freq^te^ (1).
3. **C. summanus** Pollin. veron. 2. p. 628. (*C. crassifolius* Willd. = *C. Argemone* Schl.).
   M. Generoso — Grigna (Schröter) (2).
4. **C. nutans** Lin. sp. 1150.
   ⊙ Pascoli secchi, strade, specialmente ne' luoghi mont. = Vergeletto in V. Onsernone — M. Generoso (Mari).
   F. purpureo — [Lug.—Ag.]

Onopordon.

1. **O. Acanthium** Lin. sp. 2. p. 1158.
   ⊙ Luoghi incolti, strade = Lugano — Mendrisio — Stabbio.
   F. porporini — [Lug.—Ag.]

Lappa. (3)

1. **L. major** Gärtn. fruct. 2. p. 379. t. 162 (*L. officinalis* All.).
   Ital. *Bardana maggiore*, *Bardana*, *Farfaraccio*.
   ⊙ Luoghi incolti, vie = Locarno — Bellinzona (4).
   F. purpureo — [Lug.—Ag.]
2. **L. tomentosa** Lam. dict. p. 377.
   ⊙ Luoghi incolti = Prato di V. Maggia — S. Antonio di V. Morobbia.
   F. purpureo — [Lug.—Sett.]

Carlina.

1. **C. acaulis** Lin. sp. 1160.
   Tic. *Cagn* (V. Colla).
   ⊙ Prati secchi dei colli e monti, freq^te^ = Losone, verso Arcegno — V. Onsernone, tra Cavigliano e Auressio — V. Verzasca (5).
   F. bianco — [Lug.—Sett.]
   Radice amara, aromatica. Il disco, spogliato delle squame, edule. Il fiore secco, per le sue proprietà igrometriche, usato dai contadini per predire il tempo.

(1) La v. *rhæticus* DC. (*C. transalpinus* Sut.) trovata da Lenticchia sulla Cima di Noresso (V. Colla) — Tamaro (Schröter).
(2) S. Salvatore (Christ, Favrat).
(3) Aggiungere: *L. minor* DC. — Campo alla Torba — M. Generoso.
L. nemorosa Körnik — Airolo, freq. 1889 (Rhiner).
(4) Sopra Airolo, sotto Olivone, Ghizrone (Rhiner).
(5) S. Salvatore, Bolia, M^di^ della V. Colla etc.

2. **C. vulgaris** Lin. sp. 1161.

☺ Prati secchi dei colli e dei monti della reg. subalp., abbondante = Locarno — Tra Cevio e Lunescio — Campo ecc.(1)

F. paglierino — [Lug.—Ag.]

Saussurea.

1. **S. discolor** DC. fl. fr. 5. p. 466.

♃ Fessure delle rupi alp. — A. di Robici in V. Bavona — S. Bernardino — Generoso — Sopra Forne in V. Sambuco (Favrat) — Tra Casaccia e Olivone (Rhiner) — Val Calanca (Br.)

F. violacco — [Lug.—Ag.]

Serratula.

1. **S. tinctoria** Lin. sp. 1144.

Ital. *Cerretta, Seretta.* — Tic. *Sardocina.*

♃ Selve, strade = Tra Ascona e Ponte di Ronco, strada — Mappo — Mondascie presso Locarno — Bignasco, M. del Cantone — M. S. Giorgio, prati — S. Salvatore — Morbegno — Colico (2).

F. vinacco-pallido — [Lug.—Ag.]

La radice serve a tingere in giallo.

Centaurea. (3)

1. **C. splendens** Koch. Gaud. (*C. alba* L.).

☺ Luoghi incolti = Locarno, alveo della Ramogna — Bellinzona — Roveredo, rupi — Misocco (Brüg.) — Sotto Ludiano (Rhiner) — Lugano — Mendrisio — Val d'Agno (Br.) — M. Ceneri (Salis) — Intra, argini del torrente S. Bernardino.

F. porporino-pallido — [Lug.—Ag.]

2. **C. Gaudini** Boiss. (*C. amara* L. V. Gremli Suppl. p. 79).

♃ Luoghi secchi e prati; reg. subalp. = Pontebrola — Losone — Sopra Orselina — M. S. Giorgio — Generoso — Lugano — Tamaro — Menaggio — Grigna.

F. smunto-purporini — [Lug.—Ag.]

3. **C. Jacea** Lin. sp. 1293.

Ital. *Steccioni, Stoppioni.*

♃ Prati secchi e luoghi incolti = Pontebrola — M. Generoso (Mari)(4).

F. rosco — [Lug.—Sett.]

---

(1) Gandria.

(2) La v. *Vulpii* Fischer-Ooster, Bolia (Favrat).

(3) Aggiungere: *C. nigra* L. — Mendrisio (Erb. Liceo Lug.) — M^ti sopra Cimadera (Lenticchia. Ann. C. A. T. 1886. p. 160). La v. *obscura* Jord. a Noresso in V. Colla e la v. *nemoralis* Jord. al Paolaccio presso Mendrisio.

C. rhætica Moritzi. — Rive del lago di Como (Gremli ed. fr. 1887, p. 308) e l'ibrido *rhætica* × *amara* Christ. — Ballabio super. (*C. Ducommun*).

C. alpestris Heget. — Airolo (Brügger in Rhiner).

(4) La v. *angustifolia* Schrank. al M. S. Giorgio sopra Meride. Al dire di Gremli la *C. Gaudini* sarebbe una forma estrema di questa var. (Fl. de la Suisse, ed. franc. 1886 p. 307).

4. **C. nigrescens** Koch (*C. transalpina* Schl.)(1).
   ♃ Prati e pascoli = Lucomagno, alpe di Campora — Locarno, saleggi — Bellinzona Val Calanca — Misocco — Val Maggia — Airolo — Dazio Grande — Faido — M. Ceneri — Generoso — Lugano — Monte Caprino — Mendrisio — Balerna — Grigna — Menaggio.
   F. roseo — [Lug.—Ott.]
5. **C. phrygia** Koch non L.(2) (*C. pseudophrygia* C. A Mey.).
   ♃ Pascoli e cespugli; reg. subalp. e alp. = Campo V. Maggia — Motto Minaccio — Camoghè — M. Ghiridone — Grigna.
   F. purpureo — [Lug.—Ag.]
6. **C. nervosa** Willd. in hort. berol. 2. p. 925 (*C. phrygia* Rchb.).
   ♃ Pascoli alp. = Lucomagno — Campo, sopra l' alpe di Quadrella — Alpi presso il lago Nero in V. Bavona — A. della Bolla in V. Peccia — Lucomagno — Airolo — Locarno — Generoso (Mari) — Camoghè (Heer) — Tamaro(3).
   F. roseo — [Lug.—Ag.]
7. **C. montana** Lin. sp. 1289.
   ♃ Selve mont. e subalp. = M^ti di Locarno — Campo V. Maggia(4).
   F. azzurro — [Lug.—Ag.]
8. **C. axillaris** Willd. sp. p. 2290.
   ♃ Declivi aprichi di coll. = Sotto Orselina — Brione sopra Minusio — Ronco d' Ascona — Brissago — Bellinzona, presso Prato Carasso — S. Salvatore presso Lugano — Gandria(5) — Generoso — Mendrisio (Salis) — Malgrate.
   F. azzurro — [Giug.—Sett.]
9. **C. Cyanus** Lin. sp. 1289.
   Ital. *Fioraliso.*
   ⊙ Messi, freq^te = Locarno — Ascona — Lugano ecc.
   F. azzurro — [Giug.—Lug.]
   La si ritiene come indicatrice della fertilità del terreno.
10. **C. Scabiosa** Lin. sp. 1291.
   ♃ Luoghi incolti, prati; reg. coll., mont. e subalp. = Locarno — Bellinzona — Lugano(6) ecc.
   F. violaceo — [Lug.—Ag.]

---

(1) Colle v.: a) *Candollii* Koch., V. Bedretto (Gremli ed. fr. 1887, p. 308); b) *Kochii* F. Schultz, comune nel Ticino.

(2) La vera *C. phrygia* L. (*austriaca* Willd. Koch), che si trova in Boemia, Prussia, differisce poco dalla *C. phrygia* Koch.

(3) Alpe Grande di Bosco V. M.

(4) Carabbia, pendici del S. Salvatore.

(5) In questa località, a stelo ordinariamente monocefalo.

(6) La v. *grinceensis* Rent. — Grigna (Reuter) e anche al S. Salvatore (Favrat).

11. **C. paniculata** Lin. sp. 1297.
⊙ Colli incolti, aprichi, strade = Locarno — Bellinzona — Lugano — Mendrisio — S. Salvatore.
F. violaceo-pallido — [Lug.—Ag.]

12. **C. Calcitrapa** Lin. sp. 1297.
Ital. *Cardo riccio, Cardo stellato, Cacatrappola.*
⊙ Luoghi incolti = Dintorni di Chiasso.
F. carnicini — [Ging.—Lug.]

Xeranthemum.

?1. **X. inapertum** Willd. sp. 3. 1902.
⊙ Luoghi incolti = Nel C. Ticino, secondo Hegetschweiler. Io non lo trovai finora.
F. roseo — [Mag.—Ging.]

Lapsana.

1. **L. communis** Lin. sp. 1141.
⊙ Luoghi selvatici, colti, strade, ruderati = Bellinzona — Locarno — Maggia — Cevio — Sottoceneri (Lentiechia).
F. giallo — [Lug.—Ag.]

Cichorium.

1. **C. Intybus** Lin. sp. 1142.
♃ Luoghi incolti, secchi; dapertutto = Locarno ecc.
F. turchino — [Lug.—Ag.]

2. **C. Endivia** Lin. sp. 1142.
⊙ Originaria dall' India, si coltiva = Locarno ecc.
F. giallo — [Lug.—Ag.]

Thrincia.

1. **T. hirta** Roth. cat. bot. 1. p. 97.
♃ Pascoli sabbiosi = Locarno — Generoso — S. Salvatore (Erb. Lic. Lugano) — Chiavenna (Salis).
F. giallo — [Lug.—Ag.]

2. **T. hispida** Roth idem.
♃ Luoghi incolti = Presso Chiasso — Generoso (Lavizzari) (1). Il Koch dice però che non cresce nella Svizzera (Taschenb. d. Deut. u. Schw. fl. 1865. p. 295).
F. giallo — [Ging.—Lug.]

Apargia.

1. **A. Taraxaci** Willd. (*Leontodon Taraxaci* Lois).
♃ Alpi più alte = Campo V. Maggia, Quadrella — V. Bavona.
F. giallo — [Lug.—Ag.]

(1) Probabilmente confusa colla *T. hirta* Roth.

Leontodon. (1)

1. **L. autumnalis** Lin. sp. 1123.
   ♃ Comunissimo ne' prati, ascende anche alle alpi = Locarno, saleggio — Bellinzona ecc.
   F. giallo — [Lug. —Ag.]
2. **L. hastilis** Lin. sp. 1123 (v. *hastilis* Lin. del *L. hispidus* L.).
   ♃ Luoghi incolti, prati; dal piano alle alpi più elevate = Locarno — Luganese, freq. (Lenticchia).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
3. **L. incanus** Schrank. baier. Fl. 2. p. 337.
   ♃ Fessure rupi, luoghi pietrosi; dalle alpi scende nelle valli lungo torrenti = V. Bavona — Grigna (Schröter) (2).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
4. **L. tenuiflorus** Rchb. (*Apargia tenuiflora* Gaud.).
   ♃ M. S. Salvatore, fra i sassi — Gandria — Denti della Vecchia, freq^{to} — Alpe Galbiga — Bellagio (Heer).
   F. giallo — [Apr.—Lug.]

Picris.

1. **P. hieracioides** Lin. sp. 1115.
   ⊙ Luoghi incolti, fra virgulti, margine selve = Locarno, verso la Mad. del Sasso — Golino — Gudo — Sottoceneri (Lenticchia).
   F. giallo — [Lug. — Ag.]

Tragopogon. (3)

1. **T. porrifolius** Lin. sp. 1110.
   Tic. *Scorzonera.*
   ⊙ Coltivato ad usi di cucina.
   F. violaceo — [Giug.—Lug.]
2. **T. pratensis** Lin. sp. 1109 (4).
   Ital. *Barba di Becco,· Salsefrica.* Tic. *Barbabicch, Barbabecch.*
   ⊙ Prati, declivi = Locarno, Losone, freq^{mo} — M. S. Giorgio, prati e pascoli (var. β).
   F. giallo — [Mag.—Lug.]
   Si ne mangiano i cauli teneri e le foglie condite a modo degli asparagi.

---

(1) D' aggiungere: *L. pyrenaicus* Gouan. = Dintorni di Lugano (Mari) — S. Gottardo (Lenticchia) — Val Piora — Camoghè — Misocco.

L. crispus Vill. (*L. saxatilis* Rchb.) = Nel Ticino (dove?); Gremli N. B. z. Fl. d. Schw. fasc. IV° 1887. p. 17).

(2) M. Generoso (Penzig, Gremli) — S. Salvatore, pendici presso Carona e tra Menaggio e Nobialo [Lenticchia]).

(3) Aggiungere: *T. major* Jacq. e *T. minor* Fr. (dubium Vill.). — Sottoceneri.

(4) Forse confuso collo *T. orientalis* L. (*T. pratensis* auc. non. Lin.) comune nel Ticino (Favrat).

Scorzonera.

1. **S. austriaca** Willd. sp. pl. 5. p. 1498.
   ♃ Luoghi selvatici — Pendici del S. Salvatore.
   F. giallo — [Apr.—Giug.]
2. **S. humilis** Lin. sp. 1112.
   ♃ Prati umidi di mont. = M. Ceneri, presso la Caserna — Medeglia — M. S. Giorgio — Bellinzona, sopra il Castello d' Unterwalden (Muret) — Corni di Canzo.
   F. giallo — [Apr.—Giug.]
3. **S. hispanica** Lin. sp. 1112.
   ⊙ Coltivata (1).
   F. giallo — [Giug.—Lug.]

Podospermum.

?1. **P. laciniatum** DC. fl. fr. 4. p. 62.
   ⊙ Campi e colli aprichi = C. Tic., secondo Hegetschweiler (2).
   F. giallo — [Mag.—Lug.]

Hypochæris.

1. **H. glabra** Lin. sp. 1140 (3).
   Tic. *Cicoria selvadega, Petascien.*
   ⊙ Campi arenosi = Locarno, saleggio.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
   Le foglie tenere si mangiano in insalata.
2. **H. radicata** Lin. sp. 1140 (4).
   ♃ Prati, strada = Locarno.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
3. **H. maculata** Lin. sp. 1140.
   ♃ Selve, virgulti, colli pietrosi = Locarno, a S. Biagio — Generoso (Mari) — S. Giorgio.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
4. **H. uniflora** Vill. fl. delph. p. 37 (*H. helvetica* Jacq.).
   ♃ Prati della reg. alp. e subalp. = Campo, sopra Cimalmotto — Lucomagno — Generoso — Camoghè (Mari).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]

Willemetia.

1. **W. apargioides** Cassin. dict. di sc. nat. 48. p. 427.
   ♃ Prati e selve delle alpi fino al loro piede = M. Nufenen (Prof. Heer).
   F. giallo. — [Lug.—Ag.]

---

(1) A Lugano si coltiva in molti orti. La lunga e grossa radice, nera esternamente e bianca all' interno, si mangia nell' inverno e si condisce a mo' dei broccoli. — Volgarmente si chiama *Scorzonera*.
(2) Nell' erbario Franzoni non vi sono che esemplari di Sion.
(3) Cattiva erba, comune nel mezzodì. Penzig l' indica al Generoso, ne' luoghi umidi.
(4) Esistente in agro ticinese, secondo Penzig (N. B. z. Fl. d. Schw. fasc. IV° 1887. p. 18).

Taraxacum.[1]

1. **T. officinale** Wigg. prim. fl. holst. p. 56. 1780.
   Ital. *Dente di leone, Piscialetto.* — Tic. *Dent de leon.*
   ♃ Dapertutto.
   F. giallo — [Mar.—Autunno.]
   v. *lividum*[2] = All' Uomo, tra l' A. di Piora ed il Lucomagno (2400 m. circa), fra sassi (Lug. 27. 1854).
   Le foglie tenere si mangiano in insalata; la radice lattiginosa e amara dà l' estratto di Tarasacco che ritiensi disostruente.

Chondrilla.

1. **C. juncea** Lin. sp. 1120.
   ⊙ Luoghi incolti = Locarno, sponde della Ramogna e della Maggia — Misocco (Br.).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]

Phænixopus.

1. **Ph. muralis** Koch. Syn. ed. 1. p. 430 (*Lactuca muralis* Fresenius, *Prenanthes muralis* L.).
   ⊙ Selve, luoghi incolti = Locarno — Bellinzona — Lugano e V. Intelvi (Lentiechia).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]

Prenanthes.

1. **P. purpurea** Lin. sp. 1121.
   ♃ Selve mont. e subalp. = Campo, boschi lungo la Rovana — Valletta del Dragonato, presso Bellinzona, vicino alla cascata — Bogno e Cevio (Lentiechia).
   F. violaceo — [Lug.—Ag.]
2. **P. tenuifolia** Lin. sp. 1120 (da considerarsi var. del *P. purpurea* L.).
   ♃ Selve di coll. e mont., luoghi sassosi = Locarno, al Tazzino, presso Piazzogna — Maggia (Lent.) — M. Generoso[3].
   F. violaceo — [Lug.—Ag.]

Lactuca.

1. **L. sativa** Lin. sp. 1118.
   Ital. *Lattuca.* — Tic. *Lattuga.*
   ⊙ Coltivato.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
   Mangiasi in insalata. Il succo lattiginoso delle radici serve in medicina.

---

(1) Aggiungere: *T. lævigatum* DC. (*T. erythrospermum* auct. non Andrz.) — Un solo esemplare trovato da me (Lentiechia) sopra una roccia, tra Castagnola e Gandria, presso la fornace (principio di Marzo 1888).

(2) *T. palustre* DC. = *paludosum* Schlecht.

(3) S. Giorgio, sopra Riva S. Vitale (Favrat). Più frequente della *P. purpurea* L. è la sua v. *tenuifolia* nel C. Ticino (Lentiechia).

2. **L. Scariola** Lin. sp. 1119.
   ⊙ Luoghi incolti di coll. = Tra Giubiasco e Cadenazzo, lungo la strada.
   F. giallo [Lug.—Ag.]
3. **L. perennis** Lin. sp. 1120.
   ♃ Luoghi pietrosi, fessure delle rupi — Lugano — Piede del S. Salvatore.
   F. ceruleo — [Mag.—Lug.]

Mulgedium.

1. **M. alpinum** Cassin. (*Sonchus alpinus* Lin. sp. 1117).
   ♃ Luoghi ombrosi, umidi delle alpi = Campo V. Maggia — S. Bernardino (da 1000 a 1500 m.).
   F. ceruleo — [Lug.—Ag.]

Sonchus.

1. **S. oleraceus** Lin. sp. pl. 1116.
   ⊙ Luoghi colti = In tutto il Cantone.
   F. giallo — [Giug.—Nov.]
   α. *integrifolius* Wallr. Nei giardini.
   β. *runcinatus* Koch. Luoghi sassosi, incolti = Campo V. M.
2. **S. asper** Vill. Delph. 3. p. 158.
   ⊙ Col precedente.
   F. giallo — [Giug.—Nov.]
3. **S. arvensis** Lin. sp. 1116.
   ♃ Campi = Mendrisio — Balerna ecc.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]

Barkhausia. (1)

1. **B. fœtida** DC. fl. fr. 4. p. 42 (*Crepis fœtida* Lin.).
   ⊙ Luoghi incolti, campi = Rancate, al Cantone — Lugano — Mendrisio (Salis).
   F. giallo [Lug.—Ag.]
2. **B. setosa** DC. fl. fr. 5. p. 44 (*Crepis setosa* Haller).
   ⊙ Campi, vigne, prati = Tra Claro e Osogna — Tra Mendrisio e Balerna — Lugano, vigne — Menaggio.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]

Crepis. (2)

1. **C. incarnata** Tausch. β. *lutea* Koch. (*C. Frœlichiana* DC.).
   ♃ S. Salvatore, freq. — Denti della Vecchia, alpi di Cadro (Muret).
   F. giallo, ma violaceo o bianco nelle Alpi più orientali. — [Apr.—Giug.]

---

(1) Probabilmente esistente nel Ticino la *B. taraxacifolia* DC. (Favrat).
(2) Aggiungere: *C. biennis* L. comune lungo i fossi, p. es. a Comano (Mari).

2. **C. aurea** Cass.
   ♃ Pascoli alp. e subalp. = Campo V. Maggia — Alpi di Bosco V. M. — Campo alla Torba — S. Gottardo — S. Bernardino — Lucomagno — Generoso (Mari).
   F. ranciato — [Lug.—Ag.]
3. **C. alpestris** Tausch. Bot. Ztg. p. 79.
   ♃ Prati della reg. subalp. e alp. = Gottardo — Lucomagno — Alpi di Piora — Sotto Altanca (Lent.) — S. Bernardino — Campo e Bosco V. Maggia — Campo alla Torba — Corni di Canzo.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
4. **C. tectorum** Lin. sp. p. 1135.
   ⊙ Luoghi colti = Lugano — Mendrisio — Locarno?
   F. giallo — [Mag.—Lug.]
5. **C. virens** Vill. Delph. sp. 142.
   ⊙ Campi, pascoli, strade = Locarno — Bellinzona — Gravesano (Lent.).
   F. giallo — [Giug.—Ott.]
6. **C. paludosa** Mönch. meth. p. 385.
   ♃ Prati, selve umide; 350—1000 m. = Artore presso Bellinzona — Bignasco — Brione Verzasca — Orselina — Valle Maggia.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
7. **C. blattarioides** Vill. Delph. 3. p. 136.
   ♃ Prati, tra Somascona e Camperio, sopra Olivone — Airolo — Generoso.
   F. giallo — [Giug.—Ag.]
8. **C. grandiflora** Tausch. Bot. Ztg. 11. 1. p. 79.
   ♃ Pascoli alp. e subalp.; discende anche a 270 m. = Campo V. M. e Cimalmotto — Tra Cavigliano e Aurigeno — M^ti di V. Verzasca — Lugano — M. Ceneri — Camoghè.
   F. giallo — [Giug.—Ag.]

Hieracium.(1)

1. **H. Pilosella** L. sp. 1125.
   ♃ Pascoli aridi, scopeti, strade, fino a 2600 m. = Bellinzona — Lugano — M. Tamaro (v. *grandiflorum* Koch).(2)
   F. sulfureo — [Mag.—Ott.]

---

(1) D' aggiungere: *H. furcatum* Hop. Versante orientale del S. Gottardo (Gremli ed. fr. 1886. p. 325)
H. australe Fr. Poschiavo (Brügg.). id. p. 357.
H. boreale L. Colle S. Gottardo presso Lugano (Mari).
H. glaucopsis Gr. Grigna (Christ) — S. Salvatore (Muret, Favrat). Conf. Christener Hiev. der Schw., Berna 1863.
H. pulmonarioides Vill. Faido (Brügger in Rhiner).
H. dentatum Hoppe. V. Tremola, in abbondanza (Hofstetter in Rhiner 1870. p. 203. 1872. p. 23 e 30).
H. boreale Fr. Laghetto di Muzzano (Lent.) — Sopra Golino (Rhiner). La v. *racemosum* Hausm. Collina di Montagnola (Erb. Lent.).
H. sabaudum Fr. Crespera, Castello in V. Solda (Erb. Lenticchia).
H. Trachselianum Cristener. S. Salvatore (Muret in Rhiner).

(2) La specie genuina a Castagnola, Gandria, Bogno; la v. *caulescens* a Castagnola; la v. *virescens* a Maggia.

2. **H. breviscapum** K. (*H. angustifolium* Sprengl., *H. glaciale* Reyn.).
   ♃ M. S. Gottardo, pascoli rupestri presso l'ospizio — Campo V. M., al Motto Minaccio — Lucomagno — Camoghè — Misocco.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
3. **H. Auricula** L. sp. 1126.
   ♃ Prati, declivi; fino a 2500 m. = Locarno — Cugnasco ecc.
   F. giallo — [Giug.—Ag.]
4. **H. piloselloides** Vill. (*H. florentinum* All. s. Fries., *H. florentinum piloselloides* Gaud.).
   ♃ Luoghi incolti, aprichi = Bellinzona — Locarno, ghiaie del fiume Maggia (β. *glareosum* = *H. Michelii* Tausch.) — Airolo — Dazio Grande — M. Ceneri — Magadino.
   F. giallo — [Giug.—Ag.]
5. **H. præaltum** Koch (*H. florentinum præaltum* Gaud.).
   ♃ Prati, luoghi incolti; coll. e mont. = Pedrinate.
   F. giallo — [Giug.—Lug.]
6. **H. aurantiacum** Lin. sp. 1126.
   ♃ Pascoli alpini = Lucomagno — S. Gottardo — Naret — Fusio — A. di Piora — M. Generoso (Mari).
   F. aranciato — [Lug.—Ag.]
7. **H. staticefolium** Vill. (*Chlorocrepis staticifolia* Grisch.).
   ♃ Luoghi incolti e prati di mont. = Camoghè e V. Morobbia (Comolli) — Airolo — Piora — Valle Maggia.
   F. giallo-verdognolo — [Giug.—Sett.]
8. **H. porrifolium** Lin. sp. 1328.
   ♃ Rupi = Griante sul lago di Como (1) e forse nelle rupi del S. Salvatore e del Generoso.
   F. paglierino carico — [Giug.—Sett.]
9. **H. glaucum** Allioni (2).
   ♃ Alpi di V. Bavona verso il lago Nero e della V. di Peccia, alpe della Bolla (Ball. bot. irland. 1863. Sett. 3).
   F. giallo — [Giug.—Sett.]

?10. **H. glabratum** Hopp. ap. Willd. sp. 1562 (3).
   ♃ Luoghi rupestri e ghiaie torrenti nella reg. alp. e subalp. = S. Gottardo — Lucomagno.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
11. **H. Schraderi** Schleich. (*H. Schraderi* Koch., *H. piliferum* Hoppe).
   ♃ V. Bavona, sopra il lago Nero verso V. di Peccia e alpe della Bolla (Ball. Sett. 2. 1863) — S. Gottardo (4).
   F. giallo — [Lug.—Sett.]

---

(1) Mandello, Lecco (Christ).
(2) Comprende due specie: *H. glaucum* e *H. bupleuroides*. Tutte e due nel Ticino? (Favrat.).
(3) Sarà forse *H. glabratum* Koch o *scorzonerifolium* Vill. Il *H. glabratum* Hopp. non si è visto finora che proveniente dal Tirolo (Grem. Fl. de la Suis. 1886. p. 336).
(4) Sotto Naret verso Fusio (Rhiner) e al Camoghè (Siegfried in Rhiner).

12. **H. villosum** Lin. sp. 1130.
♃ Alpi = Fra la V. Bavona e V. di Peccia (Ball.) — Fra Misocco e S. Bernardino — V. Calanca — Generoso.
F. giallo — [Lug.—Ag.]

13. **H. glanduliferum** Hopp. ap. Sturm. 4. 39.
♃ Luoghi più elevati delle alpi = S. Gottardo (1) — Piora — Misocco — Pizzo Uccello nella V. di Misocco.
F. giallo — [Lug.—Ag.]

14. **H. vulgatum** Fries. novit. fl. svec. ed. 2. p. 258.
♃ Selve, luoghi incolti = Locarno — Cevio — Bellinzona — Biasca — Faido.
F. giallo — [Giug.—Lug.]

15. **H. murorum** auct. non. Lin. colla v. *alpestre* Griseb.
♃ Selve, colli incolti = Locarno — Bellinzona — Bignasco ecc. (2)
F. giallo — [Giug.—Ag.]

16. **H. Jacquini** Vill. Delph. 3. p. 123. t. 28 (*H. humile* Jacq.).
♃ Rupi reg. alp. e subalp. = Forca di Monte Piottino — Dazio Grande — Isone.
F. giallo — [Giug.—Ag.]

17. **H. amplexicaule** Lin. sp. 1129.
♃ Rupi apriche della reg. subalp. = M. Generoso — Bignasco.
F. giallo — [Giug.—Lug.]

18. **H. alpinum** Lin. sp. 1124.
♃ Pascoli alp. e subalp. = Forca di Bosco — S. Gottardo — Lucomagno — P. Uccello nella V. di Misocco — Misocco.
F. giallo — [Giug.—Ag.]

19. **H. albidum** Vill. prosp. 36. Delph. 3. 133. t. 39 (*H intybaceum* Wulf.).
♃ Luoghi rupestri alp. = Campo, salita da Quadrella a Motto Minaccio — Bosco V. M. (Lent.) — S. Gottardo — S. Bernardino — M. Camoghè, alpe di Pesciarotto — M. Generoso (Marì).
[Lug.—Ag.]

20. **H. ochroleucum** Schleicher. (*H. cydoniæfolium* Vill., *H. picroides* Gaud.).
♃ Alpi più elevate = S. Bernardino (Ball.).
F. giallo — [Lug.—Ag.]

21. **H. umbellatum** Lin. sp. 1131.
♃ Prati, luoghi selvatici, scopeti = Tenero — Gudo — Bellinzona — Camoghè.
β. coronopifolium Bernh. = Gudo.
γ. angustifolium Koch. = V. di Campo, sotto Cerentino.
F. giallo — [Lug.—Ott.]

---

(1) Greina (Rhiner), Camoghè (Siegfried in Rhiner).
(2) Castagnola, Gandria ecc.

Fam. Ambrosiaceae.

Xanthium.

1. **X. strumarium** Lin. sp. 1400.

⊙ Cespugli e strade = Alle Fracee, tra Cantone e Cugnasco — Bellinzona — Tra il ponte della Moesa e la Torraccia sopra Bellinzona.

F. verde — [Lug.—Ag.]

Fam. Campanulaceae.

Jasione.

1. **J. montana** Lin. sp. pl.. 1317.

Ital. *Vedovelle celesti.*

♃ Luoghi incolti, aridi — Locarno — Cugnasco — Bellinzona — Cima Noresso in V. Colla (Lent.) — Faido — M. Ceneri — Val d'Agno.

F. ceruleo — [Giug.—Ag.]

Phyteuma.

1. **P. pauciflorum** Lin. sp. 241.

♃ Gioghi più elevati delle alpi = Forca di Bosco V. Maggia — P. Uccello in V. Misocco — Scaradra in V. Luzzone (V. Blenio).

F. ceruleo — [Lug.—Ag.]

2. **P. hemisphæricum** Lin. sp. 241.

♃ Alpi = Motto Minaccio — V. Sambuco — Naret — S. Gottardo — Alpe dell' Uomo (1).

F. ceruleo — [Lug.—Ag.]

3. **P. orbiculare** Lin. sp. 242.

♃ Luoghi selvatici, erbosi; coll. e mont. = Locarno, al Tazzino — Orselina — Ponte Brola — M. Generoso (Erb. Lic. Lug.) (2).

F. bleu — [Giug.—Ag.]

4. **P. Scheuchzeri** Allioni Ped. 1. p. 116. t. 39. f. 2.

♃ Fessure delle rupi; reg. alp. e subalp.; discende fino a 270 m. = S. Gottardo — V. Leventina — V. Maggia — Fusio — V. Sambuco — V. Onsernone — Golino — Tra Solduno e Ponte Brola — Locarno, al Sasso — M. Ceneri — M. Camoghè — M. Tamaro — M. Generoso — Val Soazza.

F. ceruleo — [Giug.—Ag.]

5. **P. Michelii** (3) All. Ped. 1. p. 115. t. 7. f. 3.

♃ Rupi al piè del S. Salvatore (Bertoloni fl. it.).

F. ceruleo — [Lug.—Ag.]

(1) M. Generoso (Mari) — M^ti sopra Cimadera, S. Lucio (Lenticchia. Ann. C. A. T. 1886. p. 160).
(2) Airolo, Campo La Torba.
(3) Ha una grande rassomiglianza col *P. scorzonerifolium* All.; anzi, secondo Gremli, questi due nomi sarebbero sinonimi (N. B. z. Fl. d. Schw. 1887 fasc. IV° p. 19—20).

6. **P. scorzonerifolium** Vill. Delph. 2. p. 519. t. 12. (var. β. del *P. Michelii*).
   ♃ Alpi e prealpi = M. S. Salvatore — Generoso (Gremli, Beitr. p. 82. 1870 (1) — Mendrisio.
   F. ceruleo — [Lug.—Ag.]
7. **P. betonicifolium** Vill. Delph. 2. p. 518. t. 12.
   ♃ Pascoli alpini = Campo V. Maggia — V. di Peccia — S. Salvatore (2).
   F. ceruleo — [Lug.—Ag.]
8. **P. nigrum** Schmidt. boh. 2. n. 189.
   ♃ Selve frondose = Orselina — Brione sopra Minusio — Generoso (Erb. Lic. Lug.) Arogno (Lent.).
   F. violaceo — [Mag.—Ging.]
9. **P. spicatum** Lin. sp. 242.
   ♃ Selve e prati di coll. e mont. = Orselina — V. Onsernone — S. Gottardo (Erb. Lic. Lug.).
   F. giallognolo — [Mag.—Ging.]
10. **P. Halleri** All. Ped. 1. p. 116.
   ♃ Pascoli alp. e subalp. e nelle valli = V. di Peccia, a Peccia e a S. Carlo — Fusio — M. Generoso (Amoretti) — Corni di Canzo.
   F. violaceo-scuro — [Ging.—Lug.]

Campanula.

1. **C. excisa** Schleich. Cat. pl. helv. 1815. p. 10.
   ♃ Luoghi sassosi, fessure rupi della reg. alp. = Motto Minaccio — Alpe di Arnau in V. Campo V. M. — Forca di Bosco — M. Generoso (Mari).
   F. azzurro — [Lug.—Ag.]
?2. **C. cespitosa** Scopol. fl. carn. 1. p. 143 (3).
   ♃ Rupi = M. S. Giorgio — M. Generoso (Comolli).
   F. ceruleo — [Lug.—Ag.]
3. **C. pusilla** Haenke in Jacq. collect. 2. p. 79.
   ♃ Luoghi incolti della reg. subalp. e alp., scende anche al piano lungo i fiumi = Campo V. M. — Niva — V. Sambuco — S. Gottardo — M. Generoso — M^ti sopra Cimadera e A. Grande di Bosco V. M., freq. (Lenticchia).
   F. ceruleo — [Ging.—Lug.]

---

(1) Castagnola, M. Brè (Erb. Lenticchia).

(2) Gandria, M^ti sopra Cimadera. Variabile nelle foglie e nell' infiorescenza.

(3) Nell' erbario Franzoni non vi sono che esemplari di Clusone. È così somigliante alla *C. pusilla* che facile è il confonderla con questa.

4. **C. rotundifolia** Lin. sp. 232.
   ♃ Prati, selve delle valli e dei monti = Bodio — Faido — V. Blenio — Generoso ecc. (1)
   F. ceruleo — [Giug. — Ag.]
5. **C. Scheuchzeri** Vill. prospect. de l'histoire des plantes du Dauphiné p. 22. 1799.
   ♃ Pascoli alp. — Campo V. M. — V. di Peccia — Fusio — V. Sambuco — Airolo (2).
   F. ceruleo — [Lug.—Ag.]
6. **C. rhomboidalis** Lin. sp. 233.
   ♃ Reg. subalp. = Campo V. M. — Peccia e V. di Peccia — Airolo — Camoghè (Erb. Lic. Lug.).
   F. ceruleo — [Giug.—Ag.]
7. **C. bononiensis** Lin. sp. 234.
   ♃ Prati aridi, colli aprichi, lembo delle selve = Porlezza — Menaggio — Gandria — Tra Obino e Monte nella V. di Muggio.
   F. violaceo — [Lug.—Ag.]
8. **C. rapunculoides** Lin. sp. 234.
   ♃ Selve, luoghi colti = Tra Olivone e Somascona ed oltre, lungo siepi — Airolo (Erb. Lic. Lug.) (3).
   F. azzurrognolo — [Lug. — Ag.]
9. **C. Trachelium** Lin. sp. 285.
   Ital. *Imbutini.*
   ♃ Selve, dumeti = Locarno — Arcegno — V. Maggia — Bellinzona.
   F. violaceo — [Lug.—Ag.]
?10. **C. Raineri** (4) Perpenti in Bibl. ital. 1. 5. p. 134.
   ♃ Luoghi rupestri = M. Generoso (Gremli).
   F. violaceo — [Lug.—Ag.]
11. **C. patula** Lin. sp. 232.
   ⊙ Prati = Locarno, valletta di Fregera — V. Maggia, fino sotto Brontallo, freq. — Misocco (5).
   F. ceruleo — [Mag.—Ag.]
12. **C. Rapunculus** Lin. sp. 582.
   Ital. *Raponzolo, Raperonzolo.* — Tic. *Rumpojor, Rampongior.*
   ⊙ Prati aridi = Locarno — Cevio — Bellinzona — V. di Blenio — Mendrisio — Misocco ecc.
   F. ceruleo-chiaro — [Mag.—Ag.]

---

(1) S. Giorgio sopra Meride.
(2) A. Grande di Bosco V. M., Mt di Cimadera, Cima del M. Brè.
(3) Castagnola, Gandria. Laino in V. d'Intelvi.
(4) Nell'erbario Franzoni non vi sono che esemplari del Resegone.
(5) Airolo (Amstad in Rhiner, 1882).

13. **C. persicifolia** Lin. sp. 232.
Ital. *Campanelle turchine.*
♃ Selve di coll. = Piede del S. Salvatore — Melano, piede del Generoso (1).
F. ceruleo — [Giug.—Lug.]

14. **C. thyrsoidea** Lin. sp. 236.
♃ Prati delle alpi = S. Gottardo (Hegetschweiler) (2).
F. giallo-pallido — [Lug.—Ag.]

15. **C. spicata** Lin. sp. 284.
⊙ Rupi = Locarno al Sasso — Ponte Brola — Cavigliano — Mendrisio — Bellinzona — Faido (3).
F. ceruleo — [Giug.—Lug.]

16. **C. glomerata** Lin. sp. 233.
♃ Luoghi erbosi = M. Bolia — Gandria — S. Giorgio (Lent.) — M. Generoso, a Scudellate (4).
F. violaceo — [Mag.—Giug.]

17. **C. barbata** Lin. sp. 236.
♃ Luoghi erbosi della reg. alp. e subalp.; freq. = V. di Campo V. M. — V. di Peccia — Tra Peccia e Fusio — V. Verzasca (Brione) — V. Leventina — V. di Blenio — M. Generoso.
F. ceruleo-chiaro — [Lug.—Ag.]
β. alba. Tra Niva e Campo, non freq.

Specularia. (5)

1. **S. Speculum** DC.
Ital. *Specchio di Venere, Fior cappuccio scempio.*
⊙ Fra le messi = Locarno — Arcegno — Vezia — Lugano ecc.
F. violaceo — [Giug.—Ag.]

Adenophora.

1. **A. liliifolia** Bess. Fisch. (*Campanula liliifolia* DC.).
♃ Cespugli, strada, prati = M. S. Giorgio, pascoli alle cascine di Meride e lungo la strada (6).
F. azzurro — [Lug.—Ag.]
Scopertavi e determinata da Leresche nel 1871 o 72. Questa pianta era già stata trovata da me ai 17 Luglio 1857 nella identica località e, misconosciuta, stette lunghi anni nel mio erbario sotto il nome *Campanula?* Muret la vide e mi disse il suo nome nel 1875.

(1) Madonna del Sasso, Castagnola, Tesserete, Bogno, Laino di V. Intelvi. Specie assai variabile, passa dalle forme nane (V. Intelvi) a quelle di alta statura (quasi 1 m.), dalle forme a foglie lanceolate a quelle a foglie lineari (Castagnola), dal corimbo racemoso al grappolo pauciflore.
(2) Nell'erbario Franzoni esemplari del Furka.
(3) Gandria, S. Salvatore (Lenticchia) — Generoso (Mari).
(4) Var. *sparsiflora* A. DC. Cima M. Brè, Bolia, S. Salvatore.
Var. *farinosa* Andr. (f. nana). Gandria.
(5) Aggiungere: *S. hybrida* A DC. — Trovata ad Arogno da me (Lenticchia) al principio di Maggio 1888 (Arch. d. sc. ph. et nat. 1888. Genève).
(6) Dicesi tuttavia che l'olezzante *A. suaveolens* cresca nei monti di Sessa.

Fam. Vaccinieae.

Vaccinium.

1. **V. Myrtillus** Lin. sp. 498.
   Ital. *Mirtillo, Baccole, Baggiole.* — Loc. *Lüdrion*, Lug. *Negriseu*, Mendr. *Canestrei, Maginstrei.*
   ♄ Freq^{mo} nelle selve, fino alle alpi a circa 1500 m. = V. Maggia — V. Leventina — Orselina — M. Ceneri — Corteglia presso Mendrisio — Luganese, comune (Lenticchia).
   F. carnicini — [Mag.—Lug.] — Bacche nere-azzurrognole, eduli.
2. **V. uliginosum** Lin. sp. 500.
   ♄ Boschi, fino alle alpi a circa 1500 m. = Orselina, valle del Rebissale — Campo V. M., a Quadrella — S. Bernardino (1500 m.).
   F. carnicini — [Mag.—Lug.] — Bacche nere.
   Bacche mangiereccie; foglie atte alla concia delle pelli.
3. **V. Vitis idæa** Lin. sp. p. 500.
   Ital. *Vigna d' orso, Vite di monte, Vite idea* — Valt. *Gajada.*
   ♄ Selve di monti = Campo V. M. — V. di Peccia — S. Bernardino — Lucomagno — Camoghè (Erb. Lic. Lug.).
   F. bianco o carnicino — [Mag.—Lug.]
   Bacche nere, refrigeranti, atte a far conserve; le foglie tenute in conto per la cura dei calcoli della vescica.

Fam. Ericineae.

Arbutus.

1. **A. Unedo** Lin.
   Ital. *Corbezzolo.*
   ♄ Coltivato freq^{te}.
   F. bianchi, alla punta verdi — [Apr.—Mag.]
   Bacche mangiereccie.

Arctostaphylos.

1. **A. alpina** Sprengel. syst. veg. 2. p. 287.
   ♄ Luoghi aspri delle alpi = Campo V. M. — Forca di Bosco — S. Gottardo presso l' Ospizio — Altanca (Lent.) — S. Bernardino — Generoso (Mari).
   F. bianchi — [Mag.—Lug.] — Bacche nere, eduli.
2. **A. officinalis** Winm. et Grab. fl. silesiaca. 1. 391 (*A. uva Ursi* Sprgl.).
   Ital. *Uva d' orso, Uva-Ursi.*
   ♄ Reg. mont. = Camoghè — Generoso (Mari).
   F. carnicini — [Giug.—Lug.] — Bacca rossa.

Calluna.

1. **C. vulgaris** Salisb. in trans. Linn. soc. 6. p. 317 (*Erica vulgaris* Lin.).
   Ital. *Brentoli, Cecchia, Sorcelli.* — Tic. *Brüg.*
   ℞ Abbonda nelle selve e luoghi incolti, sterili, i quali, quando l' erica si allarga in vasti spazi, prendono da essa il nome di *brughiera* = Locarno — Ascona — Bellinzona ecc.
   F. carnicini — [Ag.—Sett.]
   Tenera, è cibo gradito alle capre. Serve a *fare il bosco* ai bachi da seta, ad ardere, imbottire sacconi ed anche alla concia delle pelli.

Erica.

1. **E. carnea** Lin. sp. pl. 1. p. 504.
   Ital. *Scopa carnicina, Scopina.* — Tic. *Brüg.*
   ℞ Luoghi arenosi, rupi = Golino, valletta dei mulini — Tenero, alle Brerre lungo la Verzasca (1).
   F. carnicini, talvolta bianchi — [Primavera]

Azalea.

1. **A. procumbens** Lin. sp. 215 (*Loiseleuria procumbens* Desv.).
   ℞ Rupi delle alpi elevate = Alpi di Campo V. M., Arnavo, Gravairolo — Forca di Bosco — Naret — S. Gottardo — Lucomagno — S. Bernardino — Camoghè.
   F. rosei — [Lug.—Ag.]

Rhododendron.

1. **R. ferrugineum** Lin. sp. 562.
   Ital. *Rosa delle alpi, Leandro selvatico.* — V. Mag. *Jüpp, Droos.*
   ℞ Reg. mont. e subalp.; terreno siliceo; scende a circa 350 m., nè varca i 1600 m. = M^ti della V. Maggia, Leventina, Blenio — Valletta del Rebissale tra Orselina e Burbaglio — Camoghè — Tamaro (2).
   F. rosei o porporini — [Mag.—Ag.]
   Le foglie sono nocive alle pecore ed alle capre, che ne mangiano.
2. **R. hirsutum** Lin. sp. 1. p. 562.
   Ital. *Rosa delle alpi.* — Tic. *Droos, Jüpp.*
   ℞ Monti e alpi calcaree = M. Generoso (3).
   F. rosei — [Giug.—Ag.]

---

(1) Piede, pendici e cima del S. Salvatore, Gandria, M. Caprino, abbondante.

(2) Nella valletta del Tazzino vicino a Lugano vi sono cespugli spontanei di *Rhododendron ferrugineum*, che ordinariamente fioriscono due volte all' anno.

(3) M^ti di Sonvico e di Cimadera, terreno calcare (Lenticchia. Ann. C. A. T. 1886. p. 160).

Fam. Pyrolaceae.

Pyrola.

1. **P. rotundifolia** Lin. sp. 1. p. 567.
   ♃ Selve e boschi della reg. mont. e subalp. — Alpe delle Costanelle in V. Bavona — M. di Parna sul Tamaro — V. Morobbia, boschi di faggio, ai piedi della salita all'alpe di Giggio (Gigg).
   F. bianchi, danno olezzo di *Cyclamen europ.* — [Giug.—Lug.]
2. **P. secunda** Lin. sp. 1. p. 567.
   ♃ Selve di monti = M^di della V. Colla(1) (Comolli, fl. com. III. p. 81).
   F. bianco-giallastri — [Giug.—Ag.]

Fam. Monotropeae.

Monotropa.

1. **M. Hypopitys** Lin. sp. pl. 1. p. 555.
   ♃ Selve ombrose, ai piè de' faggi = V. Lavizzara, sui M^di di *Rima* sopra Broglio (Dr. Ang. Pometta) — V. Intelvi (Comolli).
   F. giallognoli, odorosi — [Giug.—Lug.]

Subclassis Corolliflorae.

Fam. Ebenaceae.

Diospyros.

1. **D. Lotus** L. sp. 1510.
   Tic. *Zenzuin*, da non confondersi col Zenzuino o Giuggiolo che è il frutto del *Zizyphus vulgaris* Lam.
   ♄ Valli, fra dirupi e ne' colli; non varca i 350 m. = Locarno, valletta della Fregera e rupi lungo strada nuova (forse inselvatichita) — Lugano (2).
   F. rosso-sporchi — [Giug.] — Bacca ferruginea.
   Frutto astringente, si può mangiare. — Legno buono per lavori da tornio.

---

(1) Nell'erbario Franzoni non vi sono che esemplari della Valtellina.

(2) A Comano. Nel cortile del filatoio Torricelli, presso Cassarate se ne vede una pianta, forse coltivata. Le bacche, che rassomigliano agli acini d'uva appassiti, si vendono nell'inverno in grande quantità sul mercato di Lugano.

Fam. Acquifoliaceae.

Ilex.

1. **I. Aquifolium** Lin. sp. 181.

Ital. *Aquifolio*, *Agrifolio*, *Alloro spinoso*. — Tic. *Lori selvadeg*, *Pongiaratt.*

♄ Freq. nelle selve di coll. e mont. = Orselina, valletta del Rebissale — Tra Cevio e Someo, fra dumi lungo la Maggia — Centovalli — M. Ceneri — Sottoceneri (Lentiechia)(1).

F. bianco — [Mag.—Giug.] — Bacche rosse.

Legno atto per lavori da tornio; libro della corteccia a dare vischio.

Fam. Oleaceae.

Olea.

1. **O. europæa** Lin. sp. 11.

Ital. *Olivo*. — Tic. *Uliv.*

♄ Coltivato ed anche subspontaneo ne' declivi, lungo le rive de' laghi = Gandria — Tra Lugano e Melide — Trà Bissone e Campione — Locarno — Ascona. Quivi dà nessun prodotto; mentre a detta di Taddeo Duni, una volta la coltivazione di questa pianta era di maggior rilievo(2).

F. bianchiccio — [Giug.]

Le drupe verdognole danno il noto olio d'oliva da mangiare e da ardere. Legno eccellente da ardere e ottimo per fare mobiglia e lavori da tornio.

Ligustrum.

1. **L. vulgare** Lin. sp. 10.

Ital. *Ligustro*, *Olivello*. — Tic. *Olivell*, *Olivette* (loc.).

♄ Comune; siepi, cespugli, lungo le rive; ascende fino a 1400 m. = Locarno — Tenero — Bellinzona — Lugano — Gandria — Riva S. Vitale — Mendrisio — M. S. Giorgio ecc.

F. bianco — [Giug.—Lug.] — Drupe nere.

Le foglie sono grate al bestiame; le bacche danno inchiostro violaceo d'odore ingrato; il legno assai duro serve a lavori da tornitore.

Syringa.

1. **S. vulgaris** Lin. sp. p. 11.

Ital. *Siringa*, *Lilà*, *Lilac*. — Tic. *Serenella*, *Lilà*.

♄ Coltivata di frequente e cresce quasi spontanea = Locarno, al Sasso — Campo V. M. (1100 m.) — Gandria — S. Salvatore ecc.

F. violaceo-lilà — [Mag.]

---

(1) Si ammirano dei magnifici esemplari sul culmine della collina di Sorengo, dove un tempo esisteva un roccolo.

(2) A Castagnola e a Gandria l'olio d'oliva, che si ricava, è sufficiente pel consumo dei due paesi.

Fraxinus.

1. **F. excelsior** Lin. sp. 1509.
   Ital. *Frassino.* — Tic. *Frassan.*
   ♄ Abbonda nelle valli e nei monti = Locarno — Tenero — Arcegno — V. Morobbia ecc.
   [Mag.– Giug.]
   Legno eccellente per lavori da carrozzaio; le foglie sono pascolo al bestiame.
2. **F. Ornus** Lin.
   ♄ M. Brè, lungo il torrente verso Pregassona, e sopra Gandria — M. S. Salvatore versante sopra Melide, freq. — M. Generoso.
   [Aprile.]

Fam. Jasmineae.

Jasminum.

1. **J. officinale** Lin. sp. 9.
   Ital. *Gelsomino.* — Tic. *Gesumin.*
   ♄ Siepi, muri = Locarno, al Sasso, alle Fracce — Lugano[1]. Coltivasi anche di freq^{te}.
   F. bianchi, odoratissimi — [Mag.—Lug.]
   Fiori usati dai profumieri; i rami bolliti danno una tinta gialla durevole.

Fam. Asclepiadeae.

Cynanchum.

1. **C. vincetoxicum** R. Br. in Wern. soc. 1. p. 12 (*Vincetoxicum officinale* Mönch.).
   Ital. *Vincetossico.*
   ♄ Luoghi incolti; coll. e mont. = Locarno — Cavigliano — Ascona — Gandria ecc.
   F. bianchiccio — [Giug.—Ag.]
   I fusti macerati danno filo simile al lino; la radice è diuretica; i pappi de' semi potrebbero giovare a imbottire cuscini.

Fam. Apocineae.

Vinca.

1. **V. major** Lin. sp. 304.
   ♃ Siepi e muri = Ronchi sopra Locarno e muri presso la Ramogna nel tratto che dal ponte di sopra mette a Muralto — Minusio — Piede del Salvatore, alla punta di S. Martino, tra la chiesa rovinata e il lago, fra dumi[2].
   F. ceruleo — [Apr.—Mag.]

---

(1) Nelle siepi tra Castagnola e Aldesago, a Davesco.
(2) Siepi al Paradiso presso Lugano.

2. **V. minor** Lin. sp. 1. p. 304.
Ital. *Pervinca*, *Vinca Pervinca*. — Loc. *Oeucc da bò*.
♃ Siepi, muri, boschi, dumi; frequent^{ma}.
F. ceruleo, talvolta violaceo o roseo — [Febb.—Apr.]

Fam. Genzianeae.

Menyanthes.

1. **M. trifoliata** Lin. sp. 208.
Ital. *Trifoglio fibrino*, *Trifogliolone d'acqua*, *Trifoglio palustre*. — Tic. *Trifeui fibrin*, *Trifeui d'aqua*.
♃ Luoghi paludosi, prati umidi; coll. e mont.; ascende fino alle alpi = Vezia — S. Bernardino, presso il villaggio, lungo la strada e il laghetto.
F. bianco — [Giug.—Lug.]
Amara, corroborante. La decozione o l'estratto raccomandato nelle debolezze di stomaco, nelle febbri intermittenti.

Chlora.

1. **C. perfoliata** Lin. syst. nat. 2. p. 267.
⊙ Prati, pascoli aprichi = Tra Castagnola e Gandria — Lecco (Salis).
F. giallo — [Giug.—Lug.]

Gentiana. (1)

1. **G. lutea** Lin. sp. 329.
♃ Pascoli alp. e subalp. = Osasco, pascoli rimpetto a Bedretto — M. Generoso (Amoretti).
F. giallo — [Lug.—Ag.]
2. **G. purpurea** Lin. sp. 329.
Ital. *Genziana rossa*.
♃ Pascoli, dirupi dei monti, alpi: da 1000—1700 m. = Cimalmotto — A. Grande di Bosco V. M. (Lent.) — M^{ti} di Gambarogno — S. Gottardo — S. Bernardino — Alpi di Neggio e al Poncione di Neggio sul M. Tamaro — Camoghè — Generoso.
F. purpureo — [Lug.—Ag.]
Radice tonica, amarissima; si pone in infusione nell'acquavite; si usa in polvere e in decozione nelle febbri verminose.
3. **G. punctata** Lin. sp. 329.
♃ Luoghi erbosi della reg. alp. e subalp. = Sopra Cimalmotto — Passo della Novena (2).
F. giallo pallidi, segnati da punti purporino-scuri — [Lug.—Ag.]

---

(1) D'aggiungere: *G. brachyphylla* Fröl. Passo Nufenen. (Erb. Lic. Lug. cat. p. 59). — Pizzo Vigera (Brügger in Rhiner) — Faido — Val Calanca (Br.).

(2) Camoghè (Siegfried in Rhiner).

4. **G. cruciata** Lin. sp. 334.
   Ital. *Genziana crociata.*
   ♃ Selve e prati mont.; non sorpassa la reg. del faggio — M. Generoso (Comolli. fl. Com. II. p. 15) — V. di Muggio, tra Obino e Monte.
   F. violaceo — [Lug.—Ag.]
5. **G. asclepiadea** Lin. sp. 329.
   ♃ Selve ombrose del piano e dei monti — Locarno, vallette della Guta, Ramogna, Rebissale — Tenero, lungo le acque, sotto la cartiera — Arcegno, lungo rigagnoli — Generoso (Erb. Lic. Lug.) (1).
   F. ceruleo — [Lug.—Ag.]
6. **G. Pneumonanthe** Lin. sp. 330.
   Ital. *Genzianella a foglie strette.*
   ♃ Prati umidi, torbosi di coll. = Arcegno — Losone, prati — Maggia (Lent.).
   F. ceruleo — [Ag.—Sett.]
7. **G. acaulis** auc. (*G. Clusii* Porr. Spong.).
   Ital. *Genzianella con fiore azzurro grande.* — Tic. *Pirori* (Verzasca).
   ♃ Monti, alpi; scende fino a circa 350 m. (Intragna) — V. Maggia, a Campo, Fusio ecc. — V. Onsernone — V. Leventina — V. di Blenio — Sottoceneri, come al S. Salvatore, Generoso, S. Giorgio (Lenticchia).
8. **G. excisa** Presl. Bot. Ztg. II. 1. p. 268.
   ♃ Pascoli mont. = M. Tamaro, alla Forcarella (2).
   F. azzurro — [Mag.—Giug.]
9. **G. alpina** Vill. (var. *β. minor* della precedente).
   ♃ Pascoli alp. = Sommità del Camoghè (Gremli Beitr. p. 83) — A. di Bosco V. M. — Lucomagno (3).
   F. azzurro — [Mag.—Giug.]
10. **G. bavarica** Lin. sp. 331.
   ♃ Pascoli umidi, alp. = S. Gottardo — Lucomagno — S. Bernardino — Naret — Forca di Bosco V. M. — Generoso (Mari).
   F. azzurro — [Lug.—Ag.]
11. **G. verna** Lin. sp. 331.
   ♃ Pascoli alp., tavolta discende anche al piano = V. Morobbia — V. Colla.
   F. azzurro — [Mag.—Ag.] (secondo l'elevazione).

(1) Maggia (fiori distanti), M. S. Giorgio (fiori serrati).
(2) Prosa, Bolia. Miglieglia, M. Generoso (Lenticchia) — Sopra Vacallo (Favrat).
(3) Sul Pizzo di Claro (Calloni. Ann. C. A. T. 1886. p. 140).

12. **G. utriculosa** Lin. sp. 332.
Ital. *Genzianella cerulea.*
♃ Pascoli umidi delle alpi e nelle colline = S. Bernardino — Campo alla Torba — Camoghè — M. Ceneri — S. Salvatore — Generoso e M^ti della V. Colla (Lenticchia).
F. ceruleo — [Giug.—Lug.]

13. **G. nivalis** Lin. sp. 332.
⊙ Pascoli alp. = S. Bernardino — V. Sambuco, greto della Lavizzara — Airolo — Generoso.
F. superbamente cerulei — [Giug.—Ag.]

14. **G. campestris** Lin. sp. 334.
⊙ Luoghi aprichi della reg. subalp. e alp. = Airolo — Campo V. M. — Generoso (Mari).
F. violaceo — [Lug.—Ag.]

15. **G. germanica** Willd. sp. 1. 1346.
⊙ Prati e luoghi umidi, selvatici dei monti = M^ti della V. Colla — Camoghè — Canne d'Organo (Erb. Lic. Lug.)(1).
F. violaceo — [Ag.—Sett.]

16. **G. amarella** Lin. sp. 334.
Ital. *Genzianella.*
⊙ Pascoli umidi = S. Bernardino — V. Colla.
F. violaceo — [Ag.—Sett.]

17. **G. ciliata** Lin. sp. 334.
Ital. *Genziana ciliata.*
⊙ Luoghi aspri, umidi, prati dei monti = M. Generoso(2).
F. ceruleo — [Ag.— Sett.]

Erythræa.

1. **E. Centaurium** Pers. syn. 1. 283.
Ital. *Centaurea.* — Loc. *Centaura.*
⊙ Pascoli, luoghi sterili, rupi = Vettagne presso Locarno — Navegna — V. Verzasca — Pontebrola — V. Onsernone — Maggia, al Sasso Pieggio — M. Ceneri(3).
F. roseo — [Lug.—Ag.]
var. β. *capitata* Koeb. M. Ceneri (Barmberger).

2. **E. pulchella** Fries nov. ed. 2. p. 74.
⊙ Pascoli e luoghi sterili, umidi = Piano di Magadino — Gudo, lungo il Ticino.
F. roseo — [Lug.—Ag.]

---

(1) Cima M. Brè, M. Bolia, Noresso (f. *parviflora*), A. Grande di Bosco V. M.
(2) M. S. Salvatore, M. Bolia.
(3) Gandria, Cima M. Brè, Bolia, Tesserete, V. di Muggio.

Fam. Convolvulaceae.

Convolvulus.

1. **C. sepium** Lin. sp. 218.
   Ital. *Vilucchio.* — Tic. *Campanelle, Campanin.*
   ♃ Siepi = Locarno — Bellinzona — Mendrisio ecc.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
2. **C. arvensis** Lin. sp. 218.
   Ital. *Vilucchio de' campi.* — Loc. *Rareggia.* Mendr. *Corengiente.*
   ♃ Strade, campi che infesta; comune = Locarno, muri — Airolo ecc.
   var. β. *hirtus* Koch. — Tra Locarno e Rivapiana ecc.
   F. bianco-roseo, odoroso — [Giug.—Ag.]
   Si dà ai maiali, che lo mangiano con avidità.

Cuscuta.

1. **C. europaea** β. Lin. sp. pl. 1. p. 180.
   Ital. *Epitimo.* — Tic. *Grin* (Mendr.).
   ☞ Parassita sul trifoglio, che distrugge, sull' ortica, sul luppolo, sulla canape = Niva in V. di Campo — V. di Peccia ecc.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
2. **C. Epithymum** Lin. syst. veget. edit. Murr. p. 140.
   ⊙ Luoghi selvatici, fra le scope, le ginestre, il serpollino = Losone — Ascona — Campo V. M. — Val Calanca.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
3. **C. Epilinum** Weihe. arch. d. apothekervereines 8. p. 51.
   ⊙ Parassita sul lino, che spesso distrugge = Prato — Broglio.
   F. bianco — [Lug.—Ag.] (1)

Fam. Boragineae. (2)

Heliotropium.

?1. **H. europaeum** Lin. sp. 187.
   ⊙ Luoghi incolti = Bellinzona (3) (Hegetschweiler).
   F. bianco — [Giug.—Lug.]
2. **H. peruvianum** Lin.
   Coltivasi frequentemente nei vasi a cagione dell' olezzo de' suoi fiori soavissimo di vaniglia e dicesi volgarmente *Vaniglia.*

---

(1) D'aggiungere: *C. racemosa* Mart., presso Bellinzona (Gremli ed fr. 1886).

(2) Aggiungere: *Cerinthe alpina* Kit. (*C. glabra* Gaud. non Mill.), fra Casaccia e Olivone (1851 Linden ex. in Rhiner 1868 p. 17, 1870 p. 203 e 1872 p. 23 e 30).

(3) Nell'erbario Franzoni non vi sono che esemplari di Dolcedo e Sestri Ponente. Rhiner però dice che fu trovato nei dintorni di Lugano da Siegfried.

Echinospermum.

1. **E. Lappula** Lehm. Asperif. p. 121.
   ⊙ Greto dei fiumi, strade = Arbedo — Biasca — Bodio — Bellinzona (1).
   F. azzurro — [Lug.—Ag.]

Cynoglossum.

1. **C. officinale** Lin. sp. 192.
   ⊙ Luoghi incolti, siepi, strade; non varca i 400 m. (2)
   F. rosso-violaceo — [Mag.—Ag.]
   Tutta la pianta manda un ingrato odore di sorcio.
2. **C. pictum** Aiton. Kew. 1. p. 179 (3).
   ⊙ Colline arenose, soleggiate presso Castello S. Pietro (Mari).
   F. azzurrognoli — [Giug.—Ag.]

Borago.

1. **B. officinalis** Lin. sp. 191.
   Ital. *Borragine.* — Tic. *Boresena.*
   ⊙ Giardini, campi = Locarno — Bellinzona — Lugano.
   F. cilestro — [Mag.—Lug.]
   L' erba, d' odore di cocomero, si usa nella cucina; talvolta si coltiva per quest' uso.

Anchusa.

1. **A. officinalis** Lin. sp. 191.
   Ital. *Buglossa*
   ⊙ o ♃ Luoghi incolti, sassosi, strada = Biasca — Bodio — Chiavenna.
   F. violaceo od azzurro, talvolta bianco — [Mag.—Sett.]
2. **A. angustifolia** Lehmann. Asperif. 1. 244 (*A. leptophylla* R. et S.).
   ⊙ Luoghi incolti = Bellinzona, appiè della rocca di S. Michele.
   F. violaceo — [Lug.—Ag.]

?3. **A. italica** Retzius obs. bot. fasc. 1. p. 12.
   ⊙ Strade, immondezzai, luoghi incolti; non rara (dove?) (Hegetschweiler) (4).
   F. ceruleo — [Lug.—Ag.]

Lycopsis.

1. **L. arvensis** Lin. sp. 199 (*Anchusa arvensis* Bieb.).
   ⊙ Campi, vie, luoghi incolti = Bellinzona, argini del Dragonato, lungo la strada di Ravecchia — Grono — Olivone, strada e campi presso Sommascona.
   F. ceruleo — [Apr.—Mag.]

---

(1) Olivone (Rhiner).
(2) Sopra Airolo — Faido — Fra Piotta e Airolo — Presso Mairengo — (Brügger in Rhiner, 1872 p. 23 e 30).
(3) Avventizia.
(4) Nell' erbario Franzoni soltanto esemplari della Toscana e di Zurigo.

Symphytum.

1. **S. officinale** L. sp. 195.
   ♃ Prati, rive ruscelli, fossati — Lago di Muzzano — Mendrisio.
   F. bianco o roseo-violaceo — [Mag.—Giug.]
2. **S. bulbosum** Schimper. bot. Zeit. S. 1. 17.
   ♃ Prati, margini de' campi = Locarno — Rivapiana — Generoso (Thomas) — Lugano (Kölliker).
   F. giallo — [Mar.—Mag.]
3. **S. tuberosum** L. sp. 195.
   ♃ Selve, strade = Lugano — M. S. Giorgio — Melano al M. Generoso — Capolago, Mendrisio (Muret)(1).
   F. giallognolo — [Apr.—Mag.]

Echium.

1. **E. vulgare** L. sp. 200.
   ⊙ Greti, strade = Locarno, saleggio — Cevio, prati ecc.
   F. ceruleo, talvolta roseo o violaceo — [Mag.—Sett.]

Pulmonaria.

1. **P. officinalis** L. sp. 194 (2).
   ♃ Selve frondose del piano e dei monti = Locarno, al Belvedere, a S. Biagio — Mendrisio, valletta del Nebbiano — Camorino (3).
   F. dapprima roseo, indi violaceo — [Mar.—Apr.]
?2. **P. mollis** Wolf. (*P. montana* Lej.)
   ♃ Selve e luoghi pietrosi, ombreggiati = M^ti di Leggio in Mesolcina.
   F. dapprima rossi, indi violacei — [Apr.—Mag.]
3. **P. azurea** Besser. prim. fl. gallic. t. 150 (*P. angustifolia* L.).
   ♃ M. S. Salvatore — M. Bolia — M. S. Giorgio — M. Generoso, alpe di Melano — Cragno sopra Mendrisio, prati — M. Tamar, verso Sigirino.
   F. azzurro — [Apr.—Mag.]

Lithospermum.

1. **L. officinale** Lin. sp. 189.
   Ital. *Miglio del Sole.* — Loc. *Thè.*
   ♃ Luoghi aspri, dumi = Ruè, presso Someo — Pedemonte — Tra Contone e Quartino — Osogna, strada di campagna — Castagnola (Mari).
   F. bianco-verdognoli — [Mag.—Lug.]
   Si usa da taluni per farne una bibita ad uso di thè.

---

(1) Pendici del S. Salvatore.
(2) Questa specie ha foglie maculate. La pianta a foglie immaculate é la *P. obscura* Dumort.
(3) Presso Vacallo ecc. (Favrat). Castagnola, Viganello, Carabbia ecc. (Lenticchia).

2. **L. purpureo-cæruleum** Lin. sp. 189.
   ♃ Riva S. Vitale, selve al vallone — Meride, dumi lungo la strada alla Cascina e la strada a Tremona — Luganese.
   F. violaceo o ceruleo-porporino — [Mag.—Giug.]
3. **L. arvense** Lin. sp. 190.
   ⊙ Campi = Mendrisiotto — Arona.
   F. bianco, di rado ceruleo — [Apr.— Giug.]

Myosotis.

1. **M. palustris** Withering. arrang. of. brit. pl. 2. 225.
   Ital. *Non ti scordar di me, Centocchio selvatico.* — Tic. *Occe de la Madonna.*
   ♃ Prati, scopeti, rive paludi = Arcegno — Bellinzona ecc.
   F. cerulei, di rado carnei o bianchi — [Mag.—Lug.]
2. **M. cæspitosa** Schultz. fl. Starg. suppl. p. 11 (*M. lingulata* Lehm.).
   ♃ Fossi e paludi = Cadenazzo — Tra Maggia e Gordevio — Muralto, riva lago (1) — M. Ceneri (Heer).
   F. cerulei — [Mag.—Lug.]
3. **M. sylvatica** Hoffm. D. fl. ed. 2. p. 85.
   ♃ Selve mont. = M^ti di Gordola, di Someo, della V. Bavona, della V. di Peccia (2).
   F. cerulei — [Mag.—Lug.]
   v. *alpestris* Koch. syn. ed. 1. p. 505 (*M. alpestris* Schmidt).
   Reg. subalp. e alp. = Alpi di Campo V. M. e di Bosco — V. di Peccia — Piora — Generoso (Mari) — M^i della V. Colla (Lenticchia).
   F. cerulei — [Mag.—Ag.]
4. **M. intermedia** Link. En. H. B. 1. p. 164.
   ♃ Campi = Solduno — Ascona — Sottoceneri, freq. a Gentilino, Pazzallo ecc. (Lenticchia).
   F. cerulei — [Mag.—Ag.]
5. **M. hispida** Schlechtend. Magaz. naturforsch. z. Berl. 8. 229.
   ⊙ Declivi = Locarno — Lugano — Maroggia — Castagnola, terreni incolti (Lenticchia).
   F. cerulei — [Mag.—Giug.]
6. **M. versicolor** Persoon syn. 1. p. 156.
   ⊙ Luoghi coltivati, greti de' fiumi = Locarno — Arbedo.
   F. prima solfurei, poi cerulei, quindi violacei — [Mag.—Giug.]
7. **M. stricta** Link. En. H. B. 1. p. 164. 1819.
   ⊙ Greti e campi = Locarno — Lugano (3).
   F. cerulei — [Apr.—Mag.]

---

(1) Sulle rive dei laghi la v. *cæspiticia* DC. (Favrat). La specie si trova anche a Bogno, Bosco V. M., tra Bosco e Cerentino (Lenticchia).

(2) Rive del Cassarate presso Lugano (Erb. Lenticchia).

(3) M. Generoso, nei campi (Penzig. Enum. d. M. Generoso, 1879).

Eritrichium.

1. **E. nanum** Schrad. d. Asperif. Gött. 1820.
   ♃ Alpi elevate = Forca di Bosco V. M. — A. Piora (W. Bernoulli) — Soazza.
   F. ceruleo — [Lug.—Ag.]

Fam. Solaneae.[1]

Solanum.

1. **S. miniatum**[2] Bernh. ap. Willd. En. II. Berol. 236.
   Loc. *Morella.*
   ⊙ Dumi = Locarno.
   F. bianco — [Giug.—Ott.] — Bacca rossa. — Pianta d'odore di muschio.
2. **S. humile** Bernh. id. (*S. nigrum* L. v. *humile* Mill.).
   Loc. *Morella.*
   ⊙ Campi, giardini, vie = Locarno, alla Ramogna — Rivapiana, sotto S. Quirico.
   F. bianco — [Giug.—Ott.] — Bacche giallognole.
3. **S. nigrum** Lin. sp. 266.
   Loc. *Morella.*
   ⊙ Luoghi coltivi, strade; comune.
   F. bianco — [Lug.—Ott.] — Bacche nere.
4. **S. Dulcamara** Lin. sp. 266.
   Ital. *Dulcamara.*
   ♃ Rudereti, muri vecchi, luoghi umidi; comune = Locarno, strada del Tazzino, Tenero — Cadenazzo ecc.
   F. violaceo — [Lug.—Sett.] — Bacche rosse.
   Si usa in decozione come depurativo del sangue.
5. **S. tuberosum** Lin. sp. 265.
   Pomi di terra, Patata.
   ♃ Oriundo del Perù. — Coltivato[3] dappertutto fino a 1500 m.

Capsicum.

1. **C. annuum** Lin.
   Ital. *Peperone.* — Tic. *Peveron.*
   ⊙ Coltivato ad uso di cucina.
   F. bianco — [Lug.—Ag.] — Bacca rossa.

---

[1] Aggiungere: *Nicandra physaloides* Gärtn. Trovata da Mari sotto il Ponte di Cassarate presso Lugano; scomparve dopo la demolizione di quel vecchio ponte in pietra; ma si rinviene in altri luoghi, da quello non molto lontani, come al Cassone.

[2] È v. del *S. villosum* Lam. pianta pelosa-tomentosa, a rami ad angoli ottusi, a bacche rosse, verdastre o nere.

[3] Coltivansi 3 varietà, il pomo di terra bianco, il rosso e il violaceo-scuro; quest' ultimo, più saporito degli altri, è introdotto da poco tempo.

Physalis.

1. **P. Alkekengi** Lin. sp. 262.
   Ital. *Alkekengi, Cigliegia turca.* — Tic. *Berettin de giudee.*
   ♃ Luoghi incolti = Tenero, presso la chiesa — Vira Gambarogno, strada — Cugnasco, sul sagrato — Camorino, strada — Bellinzona, grotto Chicceherio — Osogna, strada del villaggio — M. S. Giorgio, ai Pozzi (1).
   F. bianco — [Giug.—Lug.] — Bacca coccinea, coperta dal calice gonfiato del colore di minio.
2. **P. pubescens** L.
   Coltivato di frequente ne' giardini e se ne mangiano i frutti.
   F. giallognoli, violacei alle fauci — [Giug.—Sett.] — Bacca giallognola, ravvolta nel calice rigonfio e paglierino.

Atropa.

1. **A. Belladonna** Lin. sp. 260.
   Ital. *Belladonna.*
   ♃ Selve e boschi cedui = Mendrisiotto (2).
   F. violaceo-scuro — [Giug.—Lug.] — Bacca nera, velenosa.

Mandragora.

?1. **M. officinalis** Mill. dict. n. 1. tab. 173.
   Fu indicata come crescente sul M. Generoso; ma non vi si trova più. (Un esemplare del Generoso nell'erb. Schleicher, mns. di Losanna).

Hyoscyamus.

1. **H. niger** Lin. sp. 457.
   Ital. *Giusquiamo.*
   ⊙☺ Campi, luoghi incolti = Locarno, al ponte della Maggia — Bellinzona — Tra Gromo e Legge, strada.
   Corolla solfurea, venata di nero e nelle fauci di porporino scuro — [Giug.—Ag.]
   Usasi in medicina.

Nicotiana.

1. **N. Tabacum** Lin. sp. 258.
   Tabacco.
   ⊙ Coltivasi in grande quantità massime sul Luganese e presso Chiasso.
   F. rosei — [Lug.—Ag.]

---

(1) Gandria — M. Caprino, sopra le Cantine ecc.
(2) M. S. Giorgio, sopra Brusino, in copia.

2. **N. latissima** Mill. dict. n. 1.
Tabacco.
⊙ Coltivasi come la precedente.
F. roseo — [Lug.—Ag.]
3. **N. rustica** Lin. sp. 258.
⊙ Coltivasi, ma in minor copia — M. Carasso.
F. giallo-verdognolo — [Lug.—Ag.]

Datura.

1. **D. Stramonium** Lin. sp. 255.
⊙ Luoghi incolti, strade = Locarno, non frequente — Bellinzona, tra il ponte del Ticino e Urico, frequentissimo.
F. bianco — [Lug.—Ag.]
Velenosa.

Fam. Verbasceae.[1]

Verbascum.

1. **V. Thapsus** Lin. sp. 252.
Ital. *Verbasco, Tasso barbasso.* — Tic. *Tass barbas.*
⊙ Strade, rive, colli; comunissima.
F. giallo — [Lug.—Ag.]
Sudorifero ed emolliente; se ne usa la decozione ne' raffreddori.
2. **V. phlomoides** L. sp. 253.
⊙ Col precedente.
F. giallo — [Lug.—Ag.]
3. **V. montanum** Schrad. monogr. verbasc. p. 33.
Sotto Ghirone (Rhiner, lettera 6 Marzo 1866).
[Lug.—Ag.]
4. **V. floccosum** auct. (*V. pulverulentum* Vill.).
⊙ Strade — Luganese — Mendrisiotto — Val d' Agno — Locarno.
F. giallo — [Lug.—Ag.]
5. **V. Lychnitis** L. sp. 235.
⊙ Declivi, strade = Locarno — Bellinzona[2].
F. giallo — [Lug.—Ag.]
v. *album* Mönch. Locarno.
F. bianco.

---

(1) Il *V. thapsiforme* cresce probabilmente nel Ticino, sicuro in Lombardia, secondo Arcangeli (Favrat). Rhiner l' ha trovato dalla V. di Blenio fino sotto Giornico. 1872 p. 23 e 30 (Lenticchia).
(2) Sorengo, Cassarate, lungo il fiume di Cassarate, sopra Castello in Valsolda.

6. **V. nigrum** L. sp. 253.
   ⊙ Luoghi incolti, mont. = Locarno — Cavigliano — Tra Gordevio e Maggia — Tra Lottigna e Torre — Generoso (Erb. Lic. Lug.) (1).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]
7. **V. Blattaria** L. sp. 254.
   ⊙ Strade, luoghi ghiaiosi = Burbaglio presso Locarno — Lugano, piede del S. Salvatore.
   F. giallo — [Giug.—Lug.]

Scrophularia.

1. **S. nodosa** L. sp. 863.
   ♃ Selve umide, prati, fossi = Locarno, al Salciolo — Luganese — Mendrisiotto (Lent.).
   F. olivaceo. — [Giug.—Lug.]
2. **S. aquatica** Lin. sp. 864. (*S. Ehrharti* Stew.)
   ♃ Lungo rigagnoli, fossi ed anche nell'acqua = Locarno — Losone.
   F. porporino fosco nel dorso — [Giug.—Ag.]
3. **S. canina** Lin. sp. 865.
   ♃ Strade, luoghi ghiaiosi = Locarno, alla Ramogna — Bellinzona, strada — Arbedo, saleggio — Giubiasco, letto torrente — Lugano, piè del S. Salvatore — Generoso (2).
   F. rosso-violaceo — [Giug.—Sett.]

Fam. Antirrineae.

Gratiola.

1. **G. officinalis** Lin. sp. 24.
   Ital. *Graziola.*
   ♃ Prati umidi, rive fossi = Locarno, riva del lago — Rivapiana — Tenero — V. Morobbia, tra S. Antonio e Carena, strada — Camoghè (Erb. Lic. Lug.) — M. Tamar — Misocco (3).
   F. roseo — [Giug.—Ag.]
   Febbrifuga.

Digitalis.

1. **D. purpurea** Lin sp. 866.
   Ital. *Digitale.*
   ⊙ Coltivasi = Vuolsi trovata spontanea nel territorio di Losone; ma io ve la cercai indarno.
   F. porporini — [Giug.—Ag.]
2. **D. grandiflora** Lam. fl. fr. 2. p. 33 (*D. ambigua* Murr.).
   ♃ Luoghi rupestri, sassosi della reg. coll. e mont. = Locarno, strada alla Mad. del Sasso — Fra Gordevio e Maggia, strada — Generoso (Erb. Lic. Lug.) (4).
   F. giallognolo — [Giug.—Lug.]

(1) Sorengo, Cassarate. L'ibrido *Lychnitis* × *nigrum* a Mairengo (Lent.); *nigrum* × *thapsiforme*, Misocco (Brügger).
(2) Faido, Giornico, sotto Biasca, Malvaglia (Brügger in Rhiner, 1872 p. 23 e 30).
(3) Casòro, ne' prati uliginosi (Lentìcchia) — Sotto Golino (Rhiner).
(4) Alpe Bolla sul Bolia.

3. **D. lutea** Lin. sp. 867.

⊙ Colli e luoghi aspri = Locarno, alla Mad. del Sasso — Torre di V. di Blenio — M^d e coll. nei dintorni di Lugano (Lenticchia)[1].

F. giallo — [Ging.—Ag.]

Antirrhinum.

1. **A. maius** β Lin. sp. 859.

Ital. *Bocca di leone.* — Tic. *Bocca de leon.*

♃ Muri vecchi a Locarno[2]. Coltivato freq^me ne' giardini in molte varietà.

F. porporino o bianco — [Ging. Ag.]

2. **A. Orontium** Lin. sp. 860.

⊙ Luoghi colti e dumi = Arona. Nel Ticino finora non l'ho veduto.

F. porporino, di rado bianco — [Ging.—Ag.]

Linaria.

1. **L. Cymbalaria** Mill. dict. n. 17.

♃ Muri vecchi e rupi = Locarno — Lugano — Mendrisio ecc.[3].

F. violaceo-chiaro — [Ging.—Sett.]

2. **L. Elatine** Mill. dict. n. 16.

Ital. *Elatina, Soldina.*

⊙ Campi = Tra Coldrerio e S. Antonio di Balerna, freq^te, ed in altri luoghi del Mendrisiotto.

F. bianco, labbro superiore internamente violaceo, esternamente solfureo — [Lug.—Ott.]

3. **L. minor** Desfont. atl. 2. p. 46.

⊙ Campi, strade = Lugano, strada appiè del S. Salvatore presso S. Martino — Da Melano a Rovio, strada, freq^te — Da Maroggia a Melano e a Bissone.

F. violaceo sbiadito — [Ging.—Ott.]

4. **L. alpina** Mill. dict. n. 5.

⊙ Luoghi sassosi, greti dei torrenti delle alpi; scende spesso nella pianura lungo i fiumi = Alpi di Campo V. M. — Naret — Lucomagno[4] — S. Gottardo — Cevio, lungo la Maggia — Locarno, alveo della Maggia.

Corolla cerulea colle protuberanze del palato crocee.

5. **L. vulgaris** Mill. dict. n. 1.

♃ Campi, dumi, strade = Locarno — Bellinzona — Tra Bodio e Giornico — Lugano, come a S. Martino, tra Capolago e Riva (Lenticchia).

F. solfureo — [Lug.—Sett.]

---

(1) Al M. Brè e al Garzirolo una forma, ch' io credo *D. lutea* × *grandiflora*, che ha le foglie uguali a quelle della *grandiflora* e i fiori e l' infiorescenza a quelli della *lutea*.

(2) Naturalizzato.

(3) La v. *Lariensis* Rent. a Ballabio superiore (C. Beraoulli). La v. *albiflora* Schröter, a Pregassona presso Lugano (Lenticchia).

(4) Casaccia, V. Camadra (Brügger in Rhiner).

var. *italica* (*L. italica* Treviz.).

Lugano (Brügg.) — Ponte d'Ascona — Tra Cavigliano e Intragna, strada (Luglio 18)(1).

F. più piccoli e pallidi della precedente — [Giug.—Ag.]

Veronica. (2)

1. V. **Anagallis** Lin. sp. 16.

♃ Acque stagnanti e rigagnoli = Locarno, roggia Orelli.

F. bianco-roseo — [Mag.—Ag.]

2. V. **Beccabunga** Lin. sp. 16.

Beccabunga.

♃ Acque stagnanti, fontane, rigagnoli = Locarno, roggia Orelli — Gordevio — Bellinzona — Lugano (Lenticchia).

F. ceruleo con vene più cariche — [Mag.—Ag.]

Refrigerante, risolvente e antiscorbutica; viene nella Svizzera freq^me usata di primavera, e mangiasi talvolta in insalata col *Crescione* (Nasturzio).

3. V. **urticifolia** Lin. fil. suppl. 83.

♃ Boschi di coll. e mont., rupi = Locarno, rupi del Sasso — Bellinzona, rupi del Castello S. Michele — Bignasco, M^te del Cantone — M. Caslano — Generoso (3).

F. violaceo sbiadito o roseo — [Mag.—Ag.]

4. V. **Chamædrys** Lin. sp. 17.

♃ Prati aridi, siepi, strade nella reg. alpina fino a 1700 m. = Locarno — Bignasco — Generoso (Erb. Lic. Lug.) (4).

F. ceruleo-pallido, solcato da vene più cariche — [Apr.—Mag.]

5. V. **montana** Lin. sp. 17.

♃ Boschi frondosi; sale fino a 1700 m. circa = M. Generoso — M^ti sopra Cimadera in V. Colla (Lenticchia).

Corolla bianchiccia, vergata da righe purpureo-cerulee — [Mag.—Giug.]

Pianta amara e alquanto astringente, si usa per farne sughi, per infonderla nei vini ed anche come thè pettorale.

6. V. **officinalis** Lin. sp. 14.

♃ Luoghi scoperti de' boschi, pascoli; fino a 1700 m. = Locarno — Arcegno — Minusio — Bellinzona, verso il Castello d'Unterwalden — Campo V. M. — Fusio (5).

Corolla ceruleo-pallida con vene più cariche — [Mag.—Lug.]

7. V. **aphylla** Lin. sp. p. 14.

♃ Alpi, da 1400—2600 m., dalle quali scende talvolta, ma raramente, lungo i fiumi = S. Bernardino — Lucomagno, alla Farinata — Campo alla Torba — Naret — Forca di Bosco — Camoghè — Tamar — Generoso.

[Lug.—Ag.]

---

(1) Laino di V. d'Intelvi (Lenticchia) — M. Caprino (Brügger in Rhiner).

(2) D'aggiungere: *V. scutellata* L. Dintorni di Lugano, luoghi umidi (Mari); *V. acinifolia* L. e *V. praecox* L. che esisterebbero nel Ticino secondo Gremli, in quali località non si sa (Gremli Fl. de la Suisse ed. fr. 1886. p. 397).

(3) M. Bolia, a 1500 circa, dalla parte di Davesco — Arogno.

(4) Presso la stazione ferroviaria di Lugano — Massagno — Castagnola — Sorengo — Cevio ecc.

(5) Cima Noresso — Garzirolo — Arogno — Valletta del Tazzino presso Lugano.

8. **V. latifolia** auct. non L. (*V. Teucrium* L.).
♃ Luoghi erbosi, secchi, massime di mont. = Locarno — Mendrisio.
F. ceruleo con vene più cariche — [Mag.—Lug.]

9. **V. spicata** Lin. sp. 14.
♃ Prati aprichi e secchi; piano e monti fino a 1300 m. = Locarno — Bellinzona — Airolo — Piora (Lent.) — Faido — Giornico — Campolungo.
F. ceruleo — [Giug.—Ag.]

10. **V. bellidioides** Lin. sp. 15.
♃ Luoghi erbosi delle alp. da 1500—2400 m. = Alpe di Quadrelle e di Bosco V. M. — Naret — V. Bavona (a S. Carlo var. a fiori bianchi) — Tra Mogno e Fusio — S. Gottardo — Lucomagno — M. Tamar — M. Generoso.
F. ceruleo-sporco — [Lug.—Ag.]

11. **V. fruticulosa** Lin. sp. p. 15.
♃ Luoghi rupestri, erbosi della reg. supalp. e alp. = M. Tamar — Motto Minaccio sopra Campo V. M. (1)
Corolla carnea, vene rosee — [Lug.—Ag.]

12. **V. saxatilis** Jacq. obs. 1. 200.
♃ Luoghi rupestri alp. e subalp. da 1300—2000 m., talvolta a 2700 m. (2) = S. Bernardino — Camoghè — Tamar — Airolo — Val Piora.
Corolla ceruleа, anello porporino alla fauce — [Lug.—Ag.]

13. **V. alpina** Lin. sp. 1. p. 15.
♃ Luoghi erbosi delle alpi e subalpi = S. Bernardino — S. Gottardo — M. Tamar.
F. piccolo, ceruleo — [Lug.—Ag.]

14. **V. serpyllifolia** Lin. sp. 1. p. 15.
♃ Pascoli e luoghi umidi = Locarno, al Salciolo — Golino, valle de' Mulini — M. Tamar, a Cortenovo (3).
F. bianchicci, vene ceruleе — [Mag.—Ott.]

15. **V. arvensis** Lin. sp. 1. p. 18.
⊙ Luoghi colti = Locarno — Luganese, freq° (Lenticchia).
F. azzurro — [Marz.—Ott.]

16. **V. verna** Lin. sp. 1. p. 19.
⊙ Luoghi aprichi sterili = Locarno, al Tazzino — Faido (4).
F. ceruleo, vene più cupe — [Mar.—Apr.]

17. **V. triphylla** Lin. sp. pl. 1. p. 19.
⊙ Luoghi colti = Locarno — Ascona ecc.
F. ceruleo scuro — [Mar.—Mag.]

---

(1) Bogno — Altanea.
(2) Per es. al Pizzo di Claro (Calloni. Ann. C. A. T. 1886. p. 140).
(3) Freq. nei giardini e negli orti di Lugano, p. es. in quelli presso al Cimitero.
(4) Predalp (Brügger in Rhiner). Freq. nei giardini di Lugano (Lenticchia).

18. **V. agrestis** Lin. sp. pl. 1. p. 18.
⊙ Luoghi colti = Locarno, alla Vignaccia — Luganese, (Lenticchia).
F. bianco, striscie azzurre — [Mar.—Ott.]

19. **V. didyma** Bertoloni Fl. It. 1. p. 101 (*V. polita* Fries.).
⊙ Campi, orti, giardini = Locarno.
F. ceruleo — [Mar.—Ott.]

20. **V. Buxbaumii** Tenore (*V. persica* Poir., *V. filiformis* DC.).
⊙ Luoghi colti = C. Ticino (Muret) — Dintorni di Lugano, comune sui muri (Lenticchia) — Misocco (Br.).
F. ceruleo — [Apr.—Mag.]

21. **V. hederifolia** Lin. sp. pl. 1. p. 19.
⊙ Campi o orti, giardini; sale fino a 1700 m. = Locarno — Campo V. M. — S. Bernardino — Dintorni di Lugano, comune (Lenticchia).
F. ceruleo — [Mar.—Mag.]

Lindernia.

1. **L. pyxidaria** Lin. mant. 252.
⊙ Locarno, riva di Mappo in luoghi melmosi (27 Ag. 1877) — Arona, torbiera di Dromelete.
F. biancastro, orlo rossastro — [Lug.—Ag.]

Limosella.

1. **L. aquatica** Lin. sp. pl. 881.
⊙ Riva de' laghi = Locarno — Muralto.
Corolla bianca, labbro incarnato — [Lug.—Ag.]

Fam. Rhinanthaceae.

Tozzia.

1. **T. alpina** Lin. sp. pl. 1. p. 844.
♃ Fusio — V. Sambuco, presso le cascine (Giugno 1861. P. Agostino.)
F. giallo — [Giug.—Lug.]

Melampyrum.

1. **M. cristatum** Lin. sp. pl. 1. p. 842.
⊙ Selve, prati = M. S. Salvatore — M. S. Giorgio.
Corolla ordinariamente porporina, tubo ricurvo, bianco con brattee di un verde giallastro — [Mag.—Lug.]

2. **M. arvense** Lin. sp. pl. p. 842.
⊙ Campi = Mendrisiotto — Arona.
Corolla e brattee purpuree, la prima segnata nel mezzo da un anello bianco e d'una macchia gialla alla base del labbro maggiore — [Giug.—Lug.]

3. **M. pratense** L. sp. 843.

⊙ Selve, scopeti, prati torbosi — Locarno — Losone — M. S. Giorgio — M. Generoso, a Cragno — Valle Maggia (1).

Corolla bianca, superiormente gialla o tutta gialla — [Giug.—Lug.]

4. **M. sylvaticum** L. sp. 843.

⊙ Selve e prati della reg. alp. — Campo V. M. — S. Bernardino.

F. aureo — [Lug.—Ag.]

Pedicularis.

1. **P. rostrata** L. sp. 845.

♃ Luoghi umidi delle alpi più elevate — Motto Minaccio sopra Campo V. M. — S. Bernardino — Camoghè — M. Generoso (Mari) — Faido (2).

F. rosso — [Lug.—Ag.]

P. fasciculata auc. non Bell. (*P. gyroflexa* Gaud.).

♃ Alpi e prealpi — M. Generoso — M. Bolia — Denti della Vecchia — Corni di Canzo.

F. rosso — [Lug.—Ag.]

2. **P. tuberosa** L. sp. 847.

♃ Luoghi umidi della reg. subalp. e alp., da 1000—1700 m. — V. di Peccia, presso la Cascata della Froda — M. Tamaro, alpe di Neggio — Generoso (Mari) (3).

F. solfureo — [Giug.—Ag.]

3. **P. foliosa** Lin. mant. p. 86.

♃ Luoghi ghiaiosi della reg. subalp. — M. Generoso (Comolli).

F. solfureo — [Lug.—Ag.] (4)

4. **P. recutita** L. sp. 648.

♃ Prati umidi della reg. alp.; da 1400—2000 m. — S. Bernardino — Lucomagno.

F. ferrugineo-porporino — [Lug.—Ag.]

5. **P. verticillata** L. sp. 846.

♃ Reg. alp., da 1200—1700 m.; luoghi umidi — Campi V. M., a Cortenovo — S. Bernardino — Camoghè.

F. porporino — [Lug.—Ag.]

Rhinanthus. (5)

1. **R. minor** Ehrh. Beit. 6. 144 (*R. Crista galli α* L. — *Alectorolophus minor* Wimm. Grab.).

⊙ Prati — Locarno.

F. giallo — [Mag.—Giug.]

---

(1) Comune nei dintorni di Lugano, come alla valletta del Tazzino, al Piano Soldino, a S. Gottardo sul Bolia.

(2) S. Gottardo, Pizzo Campello, Forca di Bosco V. M.

(3) Al Generoso l'ibrido *fasciculata* × *tuberosa*.

(4) La var. *glabriuscula* Steininger, Generoso (Muret in Steininger Beschr. der eur. Arten des Genus *Pedicularis*, Cassel 1887).

(5) Aggiungere: *Rhinanthus aristatus* Gremli, a Cortinei sotto Mogno e sopra Fusio, in abbondanza (1864, Rhiner).

2. **R. maior** Ehrh. Beit. 6. 144 (*R. Crista galli* β L. = *Alectorolophus maior* Wimm. Grab.).
⊙ Prati = Locarno — Generoso (Erb. Lic. Lug.) (1).
Corolla gialla, dente del labbro violaceo — [Mag.—Giug.]
3. **R. Alectorolophus** Poll. palat. 2. 177 (*R. Crista galli* γ L. = *Alectorolophus hirsutus* All.).
⊙ Campi, fra le messi = Locarno — Ascona (2).
F. solfureo — [Mag.—Giug.]
4. **R. alpinus** Baumgart. (*Alect. alpinus* Garck).
⊙ M. Camoghè, alpe di Sertena.
[Lug.—Ag.]

Bartsia.

1. **B. alpina** Lin. sp. p. 839.
♃ Luoghi umidi della reg. alp. e subalp. = Alpi di Bosco V. M. — S. Gottardo — Lucomagno — S. Bernardino — Camoghè.
F. rosso-violaceo — [Lug.—Ag.]

Euphrasia.

(Species sec. Gremli disposuit Favrat.)

1. **E. Odontites** L. sp. 841.
⊙ Campi, fra le messi = Tra Contone e Quartino (3).
F. porporino-sbiadito — [Giug.—Sett.]
2. **E. serotina** Lam. Fl. fr. ed. 2. 3. p. 350.
⊙ Campi della reg. mont. e subalp. = Campo V. M.
F. porporino-sbiadito — [Lug.—Ag.]
3. **E. lutea** L. sp. 842.
⊙ Luoghi aspri, sassosi, strade = Tra Ascona e Moscia, strada — Tra Cavigliano e il ponte sopra l'Onsernone sotto Intragna — Bellinzona, rupi tra Nocca e il castello d'Unterwalden — Arona, tra la Rocca e S. Carlo.
F. giallo — [Lug.—Ag.]
4. **E. hirtella** Jord.
Passo di Sassello, sopra Corte in V. Sambuceo (Favrat, 26 Ag. 1887).
F. come nell'*officinalis*, ma più piccoli — [Lug.—Ag.]
5. **E. montana** Jord.
⊙ Prati, pascoli umidi = Brione (10 Mag. Muret).

---

(1) Bosco V. M.
(2) Comune nei dintorni di Lugano.
(3) Gandria, lungo il sentiero per Castagnola.

6. **E. alpina** Lam. (*E. officinalis* Gaud. v. *purpureo-cærulea*).
   ⊙ Reg. subalp. e alp. = Passo di Sassello sopra Corte in V. Sambucco (Favrat) e probabilmente al Lucomagno, S. Bernardino, S. Gottardo ecc.
   v. *Christii Favrat* (*E. officinalis* v. *δ. flava* Gaud. ex Hall. Helv.) — V. Sambucco, 1600—2000 m. (Christ, Culmann, Favrat). — Conf. Greuli Beitr. IV. p. 27. (*Var. mihi adhuc ignota*. Gaud. IV. p. 110).
7. **E. salisburgensis** Funk in Hoppe Taschenb. p. 190.
   ⊙ Reg. subalp. e alp. = Campo V. M. — Lucomagno ecc. (1)
   F. piccoli, colore variabile — [Lug.—Ag.]
8. **E. minima** Jacq.
   ⊙ Reg. alp. = Campo V. M., verso Quadrelle.
   Conf. Greuli ed. fr. 1886, p. 403, 404.
9. **E. cricetorum** Jord. (*E. pectinata* Ten.?).
   ⊙ Piede S. Salvatore (Favrat).
   v. *maialis* (*E. maialis* Jord.) — Ponte Brola (Mari).

Fam. Orobancheae.

Orobanche. (2)

1. **O. cruenta** Bertolon. amoen. ital. p. 89.
   Ital. *Branchia d' Orso.*
   ♃ Luoghi erbosi, aprichi; sulle radici del *Lotus corniculatus*, dell' *Hippocrepis comosa* = Colli d' Ascona — Mendrisio, Gandria (Erb. Lic. Lug.) (3).
   F. fosco-porporino — [Ging.—Lug.]
2. **O. rapum** Thuill. Fl. paris. ed. 2. 317.
   ♃ Luoghi sterili, selve; sulle radici del *Sarothamnus scoparius* = Locarno, al Tazzino — Orselina — Brione, freq^te — Maccagno ecc. (4)
   Corolla bruna — [Mag.—Ging.]
3. **O. Galii** Duby. bot. gall. 1. 349 (*O. caryophyllacea* Sm.).
   ♃ Colli e declivi sterili; sulle radici del *Galium verum* e *Mollugo* = Locarno Muralto — Ascona — Misocco.
   F. bruno — [Ging.—Lug.]

---

(1) S. Salvatore. La v. *permixta* Grml. (*E. satisburgensis* Jord.) sul M. Brè.

(2) D' aggiungere: *O. Epithymum* DC. Somascona (Rhiner) — Airolo (Brügg.) — Comune nel Sottoceneri, a Lugano, Mendrisio ecc. (Lenticchia).
O. Scabiosae — Sotto Ghirone, V. Camadra.
O. Teucrii — Sotto Ghirone (1867), Melide (Hürlimann in Rhiner).
O. loricata — Somasaona, sopra Olivone (1878 Rhiner).
O. Salviae — Faido (Heer, 1861).

(3) Magadino (Zollikofer in Rhiner).

(4) M. Ceneri (Brüg. in Rhiner) — Camoghè — S. Salvatore.

4. **O. ramosa** Lin. sp. pl. 882 (*Phelipœa ramosa* C. A. Mey.).
   ♃ Sulle radici di *Cannabis sativa* = Locarno, campagna — Lugano, sulle radici di tabacco che si coltiva presso al Cimitero (Lentiechia).
   F. ceruleo-chiari — [Ag.]
5. **O. Hederae** Vanch. Orob. p. 56.
   ♃ Ronco d'Ascona, strada che conduce al lago, sopra i muricci coperti d'ellera, freq^{te}.
   F. giallo rossastro — [Lug.—Ag.]

Lathræa.

1. **L. Squamaria** Lin. sp. 848.
   ♃ Selve frondose, a piè degli alberi = Orselina, piedi di un noce — Mappo, siepi lungo la strada del Roncaccio tra il torrente e la villa di Mappo — Contra — Pontegana sotto Balerna — Cassarate e a S. Pietro Pambio, lungo un ruscello (Lent.).
   L'intiera pianta bianca o rossastra — [Mar.—Apr.]

Fam. Labiateae.

Ocymum.

1. **O. Basilicum** Lin. sp. pl. p. 833.
   Ital. *Basilico* — Loc. *Basilich.*
   ⊙ Oriundo dalla Persia. Coltivasi ne' giardini pel grato odore e ad usi culinari.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]

Lavandula.

1. **L. vera** DC. Fl. fr. 5. 398 (*L. officinalis* Chaix.).
   ♄ Coltivata frequentemente ne' giardini delle valli e del piano pel suo grato odore.
   F. azzurrognolo — [Lug.—Ag.]

Mentha.

1. **M. rotundifolia** Lin. sp. 805.
   ♃ Dumeti, fossi, selve = Locarno — Ascona ecc.(¹)
   F. roseo — [Lug.—Ag.]
2. **M. sylvestris** Lin. sp. 804. (*M. candicans* Crantz).
   ♃ Rive fossi, dumeti. = Locarno ecc.
   F. biancastro — [Lug.—Ag.]
   β. pubescens Koch. Campeglia, salita al M. Lucomagno, luoghi umidi e rivi.
3. **M. piperita** Lin. sp. 805.
   ♃ Coltivata ne' giardini e cresce qua e là quasi spontanea, p. es. al Salciolo presso Locarno.
   F. roseo — [Lug.—Ag.]

(¹) A Viganello la v. *serratifolia.*

4. **M. aquatica** Lin. sp. p. 805.
♃ Fossi, prati torbosi; comune — Locarno — Arcegno — M. Ceneri ecc.
F. rosei — [Lug.—Ag.]
var. *hirsuta* auct. Locarno, sopra la Mad. del Sasso, luoghi umidi[1].

5. **M. sativa**[2] auct. (*M. verticillata* L.).
♃ Freq. lungo le acque = Losone. Coltivata la v. *parviflora* Koch.
F. roseo — [Lug.—Ag.]

6. **M. viridis** Lin. sp. 804 (*M. sylvestris* L. v. *glabra* Koch Syn. Fl. ger. p. 550, ed. 1).
♃ Mappò, pozzanghere alla riva del lago (Sett. 1877) — Lugano, comune (Mari).
F. roseo o smunto violaceo — [Lug.—Ag.]

7. **M. arvensis** Lin. sp. pl. p. 806.
♃ Fossi, luoghi colti, umidi = Tra Contone e Quartino ecc.[3]
[Lug.—Ag.]

8. **M. Pulegium** Lin. sp. 807 (*Pulegium vulgare* Mill.).
♃ Rive, luoghi paludosi = Locarno, Muralto, Minusio, tra le case in riva al lago — Mappo, al Salciolo — Magadino[4].
F. purpureo o lilà — [Lug.—Ag.]

Lycopus.

1. **L. europæus** Lin. sp. pl. p. 30.
♃ Luoghi umidi = Tenero, prati del Salciolo — Brione sopra Minusio, strada che mette a Contra, presso il ponte della Navegna[5].
F. bianchi, punteggiati di porpora — [Lug.—Ag.]

Rosmarinus.

1. **R. officinalis** Lin. sp. pl. p. 33 (*Salvia Rosmarinus* Spen.).
Ital. *Rosmarino*. — Loc. *Rosmarin*.
Coltivato ne' giardini per uso di cucina[6].
F. ceruleo — [Mag.]

Salvia.

1. **S. officinalis** Lin. sp. pl. 1. p. 34.
Ital. *Salvia*. — Tic. *Erba savia*.
♄ Coltivasi ne' giardini per uso di cucina. Finora non mi fu fatto di vederla crescere spontaneamente.
F. ceruleo — [Giug.—Lug.]

---

(1) Lungo un ruscello presso Gentilino.
(2) Forse *M. aquatica* × *arvensis* (Gremli ed. fr. 1886, p. 411). Riva laghetto di Muzzano.
(3) Maggia. Differisce dalla *M. verticillata* pel calice corto, campanulato, a denti triangolari.
(4) Lago d'Agno, tra Caslano e Magliaso (Favrat).
(5) Riva laghetto di Muzzano, sotto Muzzano.
(6) Anche subspontaneo, come in V. d'Intelvi sotto Laino.

2. **S. glutinosa** L. sp. 37.
   Ital. *Salvia.* — Tic. *Salvia selvadega.*
   ♃ Selve, rupi, dumi; dal piano fino a 1000 m. = Locarno — Tra Gordevio e Maggia — Cugnasco — V. Morobbia — Lugano (Lenticchia).
   F. solfurei — [Lug.—Ag.]
3. **S. Sclarea** L. sp. 38.
   Ital. *Salvia.* — Tic. *Erba savia.*
   ⊙ Coltivata ne' giardini; quasi spontanea a Riva S. Vitale, Scudellate sul M. Generoso, Ronco d' Ascona; qua e là emigratavi dai giardini.
4. **S. pratensis** L. sp. 35.
   ♃ Prati, luoghi erbosi; freq^{ma} in tutte le valli del Cantone — Locarno — Losone — Bellinzona — Lugano — Mendrisio — Capolago (v. *parviflora* Gremli) (1).
   F. ceruleo, talvolta roseo o carneo (Gordola) — [Mag.—Lug.]

?5. **S. verticillata** L. sp. p. 37.
   ♃ Prati e vie = Morcote (Dr. Ferrini).
   F. violacei — [Lug.—Ag.]

Origanum.

1. **O. vulgare** L. sp. 824.
   Ital. *Maggiorana selvatica.* — Tic. *Maggiorana selvadega.*
   ♃ Luoghi aprichi, muri = Locarno, all' Annunziata — Bellinzona (v. *megastachyum* Koch = *prismaticum* Gaud.) — V. Morobbia, tra Pianezzo e S. Antonio (2).
   F. porporini, di rado bianchi — [Lug.—Ag.]
2. **O. Majorana** Lin. sp. pl. 2. p. 825.
   Ital. *Maggiorana.* — Tic. *Maggiurana.*
   ⊙ e ♃ Oriunda dall' Africa mediterranea; viene coltivata per uso di cucina.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]

Thymus.

1. **T. vulgaris** Lin. sp. pl. 2. p. 825.
   Ital. *Timo.* — Tic. *Tim.*
   ♄ Coltivato freq^{te} ne' giardini pel grato suo odore e per uso di cucina.
   F. porporini — [Mag.—Giug.]
2. **T. Serpyllum** Lin. sp. pl. 2. p. 825 (*T. angustifolius* auct. non Pers.).
   Ital. *Serpollino, Sermolina.*
   ♄ Prati, campi, muri, rocce ecc.; freq^{mo} = Locarno — Broglio — Ponte Brola ecc. [Lug.—Ag.]
3. **T. Chamædrys** Fries.
   ♄ Freq. al piano e ai monti fino a 1000 m. Carena in V. Morobbia a 700 m. — Cima del S. Salvatore ecc.

---

(1) Questa var. anche al piede meridionale del M. Brè.

(2) Comune anche nel Luganese, come al S. Salvatore, Gandria, Cademario ecc.

4. **T. pannonicus** All. ped. 1. p. 20 (*T. serpyllum* L. δ. *pannonicus* Koch).
Ital. *Serpollino.*
♄ Luoghi aridi, aprichi = Rupi del Sasso a Locarno, di Ponte Brola (1).
F. porporino — [Lug.—Ag.]

Satureia.

1. **S. hortensis** Lin. sp. pl. 2. p. 795.
Ital. *Santureggia.* — Tic. *Segriggieula, Segriggieura* (Loc.).
⊙ Frequentemente coltivata nei giardini per uso di cucina ed anche subspontanea = Locarno.
F. lilacini — [Giug.—Ott.]

Micromeria.

?1. **M. graeca** Benth.
Rupi presso Gandria (Muret). Non vi si trova più.
F. porporino — [Giug.—Lug.]

Calamintha.

1. **C. Acinos** Clairville in Gaud. Fl. helv. 4. p. 84.
⊙ Rupi = Locarno, sopra l'Annunciata — Aquila in V. Blenio — M. Generoso (Mari) (2).
F. porporino — [Giug.—Ag.]
2. **C. alpina** Lam. Fl. fr. 2. 394.
♃ Dalla reg. coll. all'alp. = Orselina — Cevio, greto della Maggia — Broglio — V. di Peccia — Naret — Campo V. M. — Gottardo — Lucomagno — Camoghè — M. Generoso (3).
F. chiaro violetti — [Giug.—Ag.]
3. **C. grandiflora** Mœnch. meth. p. 408.
♃ Luoghi selvatici, rupestri = Locarno, valletta del Rebissale — M^ti tra Cugnasco e Gudo — M^ti della V. Calanca, quasi rimpetto a Buseno — M^ti di Mergoscia, tra Frasco e il ponte de' Mulini e lungo la strada da Contra a Mergoscia — M. Ceneri — M. Cusano sopra Germignaga.
F. rosei — [Giug.—Ag.]
4. **C. officinalis** Mœnch. meth. p. 409 (*C. sylvatica* Bromf.).
♃ Selve della pian. e mont., muri = Locarno — Orselina — Ronco d'Ascona (4).
F. porporini — [Giug.—Ag.]

---

(1) Anche nel Luganese, p. es. a Gandria.

(2) M. Bolia (Lent.) — La v. *patevina* Host. (*Acinos* × *alpina?*) sotto Rovio (Brügger in Rhiner).

(3) Abbondante ed Airolo. Colsi al S. Salvatore una forma, che sembra adattata all'ambiente, essendo i verticilli fiorali più vicini tra loro, le foglie più consistenti, lanceolate e la pianta meno cespitosa (Erb. Lentecchia).

(4) Dintorni di Lugano — Da Albogasio superiore verso Castello in Valsolda.

5. **C. nepetoides** Jord.(1) (*C. Nepeta* auct. = *C. Einseleana* F. Schultz).
♃ Declivi, muri = Locarno — A. di Melano (Favrat) — Gandria (Lentiechia).
F. porporino-violaceo — [Lug.—Ag.]

Clinopodium.

1. **C. vulgare** Lin. sp. 2. 821 (*Calamintha Clinopodium* Spen.).
⊙ Luoghi selvatici, rupi, strade = Locarno, al Sasso — Minusio — Pendici del S. Salvatore (Lent.).
F. porporino — [Lug.—Ag.]

Melissa.

1. **M. officinalis** Lin. sp. 2. p. 827.
♃ Siepi, luoghi incolti = Locarno, strada del Sasso — Tenero, sul sagrato (2).
F. bianco — [Giug.—Ag.]

Horminum.

1. **H. pyrenaicum** Lin. sp. 831.
♃ Luoghi erbosi e rupi dei monti = M. Camoghè (Comolli) — Alpi di Cadro, Denti della Vecchia, S. Lucio (Muret) (3).
F. violetto — [Lug.—Ag.]

Hyssopus.

1. **H. officinalis** Lin. sp. pl. 2. p. 796.
♄ Coltivato ne' giardini. Spontaneo non si trova.
F. violaceo — [Lug.—Ag.]

Nepeta.

1. **N. cataria** Lin. sp. 796.
♃ Ruderi, strade = Locarno — Someo ecc.
F. bianchicci, tendenti al rosco — [Giug.—Ag.]

Glechoma.

1. **G. hederacea** Lin. sp. 807.
Ital. *Edera terrestre.*
♃ Boschi, siepi; dappertutto.
F. violaceo — [Apr.—Mag.]

Melittis.

1. **M. Melissophyllum** Lin. sp. 832.
♃ Luoghi selvatici, aspri = Locarno, al Sasso — Colli d'Ascona — Mti di Ronco d'Ascona — Maroggia, salita verso Rovio — M. Generoso — Castagnola, Gandria (Lentiechia).
F. porporino, talvolta bianco porporino o bianco — [Giug.—Ag.]

---

(1) Non si distingue dalla vera *C. Nepeta* che per le foglie crenate (non dentate), i fiori più lungamente peduncolati e la radice serpeggiante. Differisce dalla *C. officinalis* pei denti del calice quasi uguali, pei glomeruli più ramificati e ricchi di fiori, per le foglie più piccole.
(2) Sopra Rovio, strada al Generoso (Favrat).
(3) Mti sopra Cimadera, abbondante, M. Bolia.

Lamium.

1. **L. amplexicaule** Lin. sp. 809.
   ⊙ Freq^{ma} ne' giardini, campi = Locarno — Ascona ecc.
   F. porporini — Quasi tutto l' anno.
2. **L. purpureum** Lin. sp. 809.
   ⊙ Luoghi coltivati, freq^{ma}.
   F. porporini — Quasi tutto l' anno.
3. **L. maculatum** Lin. sp. 809.
   Ital. *Ortica che non punge.* — Loc. *Ortiga di mort.*
   ♃ Strade, dumeti; comunissima.
   F. porporini, labbro inferiore lilà, macchiato di porpora — [Apr.—Ott.]
4. **L. album** Lin. sp. 809.
   Ital. *Ortica che non punge.* — Loc. *Ortiga di mort.*
   ♃ Siepi, muri; comunissima.
   F. bianchi — [Apr.—Mag.]

Galeobdolon.

1. **G. luteum** Huds. Fl. angl. 258.
   ♃ Selve, strade umide e ombrose = Golino — Tenero — Brione sopra Minusio — Luganese, come a Gandria (Lenticchia).
   F. gialli — [Mag.—Lug.]

Galeopsis.

1. **G. Ladanum** Lin. sp. 810.
   ⊙ Messi, campi; colla var. δ *angustifolia* Koch (*G. angustifolia* Ehrh.)(1); comune.
   F. porporini — [Lug.—Ag.]
2. **G. intermedia** Vill. (var. β *latifolia parviflora* Koch della prec.).
   Lungo la strada cantonale sotto Menzonio(2).
   F. rossi — [Lug.—Ag.]
3. **G. Tetrahit** Lin. sp. 810.
   ⊙ Campi, strade; comune in pian. e mont. = Bogno, Bolia (Lenticchia).
   F. porporino-chiari — [Lug.—Sett.]
4. **G. pubescens** Bess. prim. Fl. Galic. 2. p. 27 (considerato da Bertolini var. del *G. Tetrahit*).
   ⊙ Moscia — V. Morobbia — Da Bellinzona a Cugnasco, freq^{te} lungo la strada(3).
   Corolla purpurea scura, tubo bianco, superiormente giallognolo — [Lug.—Ag.]

---

(1) Questa var. si trova nei dintorni di Lugano. La var. *canescens* Schultz. a S. Martino presso Lugano.

(2) Questa forma ha foglie più larghe e più fortemente dentate del *G. angustifolia* Ehrh. Trovasi al M. Brè, Laino di V. d' Intelvi (Lenticchia), V. Leventina (Brüg. in Rhiner).

(3) Strada tra Lugano e Bioggio (Mari, Favrat). Olivone, Malvaglia, M. Ceneri (Brüg. in Rhiner), Maggia, Castagnola, Gandria, riva laghetto di Muzzano (Lenticchia).

Stachys. (1)

1. **S. germanica** Lin. sp. 812.
   ⊙ Luoghi incolti = Lugano — Mendrisiotto.
   F. porporino — [Lug.—Ag.]
2. **S. sylvatica** Lin. sp. 811.
   ♃ Selve, rive ombrose = Arcegno — Gordola.
   F. porporino scuro — [Giug.—Ag.]
3. **S. ambigua** (2) Smith. in angl. bot. t. 2089.
   ♃ Selve, rive boscose, umide = Locarno, al Saleggio — Generoso (Erb. Lic. Lug.).
   F. porporino scuro — [Lug.—Ag.]
4. **S. palustris** Lin. sp. 811.
   ♃ Prati umidi = Tra Magadino e Contone presso Riazzino — Tra Castagnola e Gandria, strada.
   F. porporino —[Lug.—Ag.]
5. **S. arvensis** Lin. sp. 814.
   ⊙ Luoghi colti, margine de' campi = Locarno — Brione.
   F. giallognolo — [Lug.—Ott.]
6. **S. annua** Lin. sp. 813.
   ⊙ Messi = Lugano — Mendrisiotto, tra Coldrerio e S. Antonio.
   F. giallognolo — [Giug.—Ott.]
7. **S. recta** Lin. mant. 82.
   ♃ Luoghi mont., aspri = Locarno, verso Orselina — Ronco d' Ascona (3).

Betonica.

1. **B. officinalis** Lin. sp. 810.
   ♃ Prati, selve, scopeti = M. Generoso (Mari) (4).
   F. porporino — [Giug.—Sett.]
2. **B. stricta** Ait. Kew. 299 (var. *γ stricta* Koch. della prec.).
   M. S. Giorgio.
   F. purpureo — [Giug.—Ag.]
3. **B. hirsuta** Lin. mantiss. p. 248.
   ♃ Pascoli alp. = M. Camoghè.
   F. porporino — [Lug.—Ag.]
4. **B. Alopecuros** auct. non Lin. (5) (*B. Jacquini* Gr. Godr.).
   ♃ Pascoli alp. = Alpi di Cadro, Denti della Vecchia, freq^te (Muret) — S. Bernardino (Comolli).
   F. giallo — [Lug.—Ag.]

---

(1) Aggiungere: *S. alpina* L. in V. Campra (Rhiner 1878).
(2) Ibrido, *palustris* × *sylvatica*.
(3) Castagnola, Arogno, M. Bolia.
(4) Comune nei dintorni di Lugano, tanto in coll. che in montagna.
(5) La vera *B. Alopecurus* L. dei Pirenei e del Delfinato sembra differente.

Sideritis.

1. **S. montana** Lin. sp. pl. 1. p. 202.
   ⊙ Reg. mont. = M. S. Salvatore — Generoso (Mari).
   Corolla violacea scura superiormente, tubo giallo — [Mag.—Ging.]

Marrubium.

1. **M. vulgare** Lin. sp. 816.
   ♃ Lungo una strada campestre tra Tegna e la Melezza.
   F. bianco — [Lug.—Sett.]

Ballota.

1. **B. nigra** Lin. sp. 814.
   ♃ Strade = Locarno.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]

Chaiturus.

?1. **C. Marrubiastrum** Ehrh.
   Tra Lesa e Belgirate?
   F. rosso — [Lug.—Ag.]

Scutellaria.

1. **S. galericulata** Lin. sp. 834.
   ♃ Boschi umidi, lungo fossi; da 850—1100 m. = Tenero, alle Brerre — Magadino — Bellinzona, boscaglie presso il Ticino — M. Ceneri, verso Bironico — Campo V. M. (1)
   F. violaceo — [Lug.—Ag.]

Brunella.

1. **B. vulgaris** Lin. sp. 837.
   ♃ Prati, pascoli, selve; comune.
   F. violaceo, talvolta bianco — [Lug.—Ag.]
   β. *parviflora* Koch. alla Navegna (2).
2. **C. grandiflora** Jacq. Fl. austr. 4. p. 40.
   ♃ Luoghi montuosi = Luganese — Camoghè — Denti della Vecchia e M. Bolia (Lenticchia) — Generoso (Mari).
   F. violaceo — [Lug.—Ag.]
3. **B. alba** Pallas. ap. M. Bieb. Fl. taur. cauc. 2. p. 67.
   ♃ Luoghi mont., prati secchi = M^ti di Golino — Tra Arcegno e Ronco d' Ascona, molino de' Sorazzi — Navegna — Osogna — Bellinzona — Lugano (3).
   F. bianco — [Ging.—Ag.]

(1) Sui muri in riva al lago di Lugano presso il Paradiso.
(2) La v. *pinnatifida* Pers. sulla Cima di Noresso in V. Colla (Erb. Lenticchia).
(3) Da Meride alla Cascina sul S. Giorgio (Lent.) — Sotto Suello (Rhiner).

Ajuga.

1. **A. reptans** Lin. sp. 785.
   ♃ Prati; dalla pian. alla reg. mont., ascende anche alle alpi = Orselina — Bellinzona — Campo V. M. — Airolo (β. *alpina* Koch.) — Luganese (Lenticchia).
   F. ceruleo, raramente carnicino o bianco — [Mag.—Giug.]
2. **A. genevensis** Lin. sp. 785.
   ♃ Campi, prati, strade; comunissima = Airolo — Losone — Golino — Verscio — Cevio, alla Bignaschina — Riva S. Vitale — Meride — Lugano.
   F. ceruleo o carnicino — [Mag.—Giug.]
3. **A. pyramidalis** Lin. sp. 785.
   ♃ Luoghi selvatici, pascoli mont. e alp. = Centovalli, tra Camedo e Borgnone, strada — Airolo — Faido — Casaccia.
   F. cerulei o carnicini — [Mag.—Lug.]

Teucrium.

1. **T. Scorodonia** Lin. sp. 789.
   ♃ Luoghi aprichi, incolti, muri; dal piano alla reg. mont. = Locarno — Tra Cevio e Lunescio — Biasca — V. di Muggio — Tra Salorino e Cragno ecc. (1)
   F. giallognolo — [Lug.—Ag.]
2. **T. Botrys** Lin. sp. 786.
   Ital. *Camedrio secondo.*
   ⊙ Campi argillosi e calcari = Tra Coldrerio e S. Antonio di Balerna, freq^te — Capolago, ghiaie della riva del lago, freq^te.
   F. porporini — [Lug.—Sett.]
3. **T. Scordium** Lin. sp. pl. 1. p. 790.
   Ital. *Scordio.*
   ♃ Vicinanze d' Agno, fossi, prati umidi.
   F. porporini — [Lug.—Ag.]
4. **T. Chamædrys** Lin. sp. pl. 790.
   ♃ Rupi di coll. e mont. = Tra Solduno e Ponte Brolla — Tra Obino e Monte in V. di Muggio — Arona (2).
   F. porporino — [Giug.—Ag.]
5. **T. montanum** Lin. sp. 791.
   Ital. *Ramerino montano.*
   ♃ Rupi e luoghi ghiaiosi, dal piano ai monti = Gandria — Tra Obino e Monte in V. Muggio — Campo alla Torba — Tra Somascona e Campigli, lungo la salita al Lucomagno — Locarno.
   F. bianchiccio — [Giug.—Ag.]
   È uno degli ingredienti del *thè* d' erbe svizzere.

---

(1) Dintorni di Tesserete.
(2) Gandria, M. Bolia, Denti della Vecchia, Cima Noresso, tra Osteno e Laino (Lent.) — Chigiogna, Somascona (Rhiner).

Fam. Verbenaceae.

Verbena.

1. **V. officinalis** Lin. sp. 29.
   Ital. *Erba di S. Giovanni, Erba de S. Giovann* (Loc.), *Erba Trona* (Mendris.).
   ⊙ Luoghi incolti; dal piano ai monti; comunissima — Locarno, Lugano ecc.
   F. porporini sbiaditi — [Mag.—Ott.]

Fam. Lentibularieae.

Pinguicula.

1. **P. vulgaris** Lin. sp. 25.
   ♃ Prati torbosi = Pian d' Albigo — Tra Cavigliano e Loco — M. Generoso (Mari) — Camoghè (Schr.) — Piora (Lent.).
   F. violaceo — [Mag.—Ging.]
2. **P. grandiflora** Lam. dict. 3. 23 (γ. *grandiflora* della preced.).
   ♃ Pascoli uliginosi delle alpi = S. Gottardo — S. Bernardino — Naret — Camoghè, alpe di Fontanella — M. Generoso — Ponte Brolla (Jäggi e Schr.).
3. **P. alpina** L.
   Naret — S. Bernardino — Generoso (Mari).
   [Ging.]

Utricularia.

1. **U. vulgaris** Lin. sp. 1. p. 26.
   ♃ Acque stagnanti = Al varco, tra Losone e Ronco d' Ascona, fossi presso il molino de' Serazzi.
   F. giallo — [Lug.—Ag.]

Fam. Primulaceae.

Lysimachia.

1. **L. vulgaris** Lin. sp. 210.
   ♃ Luoghi paludosi, prati, dumi = Locarno — Tenero — Magadino (¹).
   F. giallo-dorato — [Ging.—Lug.]
2. **L. nummularia** Lin. sp. 1. p. 210.
   ♃ Prati umidi, margine fossi = Mondascie presso Locarno — Tra Casòro e Cernese — Tra Salorino e Cragno — V. di Muggio — Valletta del Tazzino presso Lugano (Lentiechia).
   F. giallo-citrino — [Ging.—Lug.]
3. **L. nemorum** Lin. sp. 1. p. 211.
   ♃ Boschi umidi = Mondascie presso Locarno — Tra Ascona e Moscia.

(¹) Maggia — Lugano, nei prati di Soldino.

Anagallis.

1. **A. arvensis** Lin. sp. 211.
   ⊙ Campi[1] = Locarno — Ascona — Bellinzona ecc.
   F. rosco-coccineo — [Giug.—Ott.]

Centunculus.

1. **C. minimus** Lin. sp. 169.
   ⊙ Piano di Magadino, luoghi erbosi soggetti ad essere inondati, poco discosti dalla chiatta del Ticino.
   F. bianco o rosco — [Giug.—Lug.]

Androsace.

1. **A. helvetica** Gaud. Fl. helv. 2. p. 106.
   ♃ Fessure delle rupi delle alpi più elevate = S. Gottardo — S. Bernardino — Naret.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
2. **A. alpina** Lam. dict. 1. 162. ill. t. 98. f. 3 (*A. glacialis* Hoppe).
   ♃ Fessure rupi alpi più elevate = S. Gottardo — Lucomagno, sopra l' alpe dell' Uomo — S. Bernardino — Pizzo Combio — Val Calanca[2].
   F. rosco o bianco — [Lug.—Ag.]
3. **A. Chamæjasme** Host. syn. p. 85. non Wulf.
   ♃ Rupi, prati della reg. alp. e subalp. = S. Bernardino — Maloja (Lent.).
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
4. **A. obtusifolia** All. ped. 1. p. 90. t. 46. fr. 1.
   ♃ Alpi da 1700—2000 m. = S. Bernardino — Lucomagno, farinate — Val Calanca.
   F. bianco o rosso — [Giug.—Lug.]
5. **A. carnea** Lin. sp. 1. p. 204.
   ♃ Rupi e pascoli subalp. e alp. da 1300—1700 m. = M. Lucomagno[3].
   F. carnicini — [Lug.—Ag.]
6. **A. imbricata** Lam. dict. 1. 162. illust. t. 98. f. 4.
   M. Ghiridone — Passo Angio fra Val Calanca e Val Misocco (Brgg.) — Valle Maggia (Mariani).
   [Lug.]
7. **A. Charpentieri** Heer (*Aretia brevis* Heg.).
   M. Camoghè, alla vetta[4] (trovata da Heer per la prima volta nel 1833).
   F. rosco — [Giug.—Lug.]

---

(1) Si trova tanta al piano come in montagna, p. es. a Riva S. Vitale, Cima M. Brè, M. Generoso sopra Rovio.

(2) Pizzo di Claro (Calloni. Ann. C. A. T. 1886. p. 140).

(3) Pizzo Vigera, Casaccia (Brügger in Rhiner).

(4) Sulla cima del M. Garzirolo (Muret) e del M. Legnone (Heer).

Primula. (1)

1. **P. farinosa** Lin. sp. 205.
   ♃ Prati torbosi, uliginosi; dal piano alle alpi = Tra Gordevio e Avegno — Alpi di Bosco — Tra Acquarossa e Ponte Valentino — Alpi di Piora — S. Gottardo — S. Bernardino.
   F. roseo — [Mag.—Ag.]
2. **P. longiflora** All. ped. 1. p. 92. t. 39. fig. 3.
   ♃ Pascoli alp. = S. Bernardino, non lungi dalla fonte dell' acqua minerale (Comolli) — Campolungo (Muret) (2) — Val Calanca (Brgg.) — Legnone.
   F. roseo — [Mag.—Ag.]
3. **P. officinalis** Jacq. misc. 1. 159.
   Ital. *Primavera.* — Volg. *Primavèr*, *Vieul giald.*
   ♃ Prati e selve = Bellinzona — Giubiasco — Generoso (Erb. Lic. Lug.) (3).
   F. giallo-citrino — [Apr.—Mag.]
4. **P. elatior** Jacq. misc. 1. 158.
   ♃ Selve e prati = Saleggio di Locarno ecc.
   F. giallo-solfureo — [Mar.—Apr.]
5. **P. acaulis** Jacq. misc. 1. 158 (*P. vulgaris* Huds. = *P. grandiflora* Lam.).
   Ital. *Primavera.*
   ♃ Selve subalp. e pianure delle valli; frequent^{ma} = Da Locarno a Bellinzona ed a Biasca — Cevio ecc.
   β. caulescens Koch. Qua e là frammista alla specie.
   Se ne coltiva ne' giardini una varietà a fiori rosei, rossi o rossi marginati di bianco.
6. **P. Auricula** Lin. sp. 1. p. 205.
   ♃ Rupi alp.; da 1300—1700 m. = M. Generoso sopra Rovio — M. Bolia (Lenticchia).
   F. solfureo — [Apr.—Mag.]
7. **P. villosa** Koch. non Jacq. (*P. viscosa* Vill. non All. = *P. hirsuta* All.).
   Tic. *Sassireu* (V. Maggia).
   ♃ Rupi delle alpi elevate da cui scende talvolta fino al fondo delle valli lungo i torrenti = S. Gottardo — Alpi della Leventina e della V. Maggia — Campo — Forca di Bosco — Campo alla Torba — Naret — Golino, presso i Mulini — Ponte Brolla, presso al ponte (4).
   F. rosei, assai belli — [Apr. (in basso) — Lug. e Ag. (alpi)].
   La pianta tutta è glutinosa e manda un odore di resina, che si avvicina a quello delle foglie del *Rhododendron ferrugineum* ammaccate.

---

(1) Aggiungere: *P. integrifolia* × *viscosa* Vill., Val Calanca (Heer).
(2) Naret (Rhiner).
(3) Sopra Arogno.
(4) Abbondante anche sui M^{ti} di Tesserete e della V. Colla, al piede del Camoghè (1100 m.) e sopra Arosio.

8. **P. integrifolia** Lin. sp. pl. 205.
   ♃ Fessure delle rupi alp. = S. Bernardino — S. Gottardo — Naret.
   F. roseo — [Lug.—Ag.]
9. **P. minima** Lin. sp. 205.
   ♃ Fessure delle rupi delle alpi elevate = S. Gottardo — S. Bernardino. Conf. Gremli ed. fr. 1886, append. p. 575.
   F. roseo — [Lug.—Ag.]

Hottonia.

1. **H. palustris** Lin. sp. 1. p. 208.
   ♃ Paludi, fossi = Agno — Pontetresa (Comolli) — Riva S. Vitale (1).
   F. rosei o bianchicci — [Mag.—Giug.]

Soldanella.

1. **S. montana** Willd. en. hort. berol. 1. p. 192.
   ♃ Prati, luoghi erbosi di mont. e subalp. = M. Tamaro, alle Forcorelle. — Conf. Gremli ed. fr. 1886, append. p. 577.
   F. violaceo — [Mag.—Giug.]
2. **S. alpina** Lin. sp. 1. 206.
   ♃ Alpi; discende anche nella reg. subalp. = S. Gottardo — S. Bernardino — Naret — Piora (Lenticchia) (2).
   F. violaceo — [Mag.—Lug.]
3. **S. pusilla** Baumgartner Fl. trans. 1. p. 153.
   ♃ Alpi; colla precedente = S. Gottardo (3).
   F. violaceo-ceruleo — [Mag.—Lug.]

Cyclamen.

1. **C. europeum** Lin. sp. 1. p. 207.
   Ital. *Ciclamino*, *Panporcino*. — Volg. *Panporcin*, *Erba de S. Bernard* (Loc.).
   ♃ Selve di coll. e mont. = Arcegno — Tra Losone e Golino — Tra Arbedo e S. Giulio di Roveredo, sponda sinistra della Moesa — Mendrisio — Melano — Rovio — V. di Muggio (4).
   F. rosei, odoratissimi — [Giug.—Sett.] — È anche coltivato.

?2. **C. hederæfolium** auct. non Ait. (*C. neapolitanum* Ten.).
   ♃ Fra i cespugli di *Ruscus* presso Gandria e Mendrisio (Hegetschweiler 1840, ma dubbiosa!).
   F. rosei — [Apr.—Lug.]

---

(1) Un solo esemplare di Como nell' erbario Franz.
(2) M. Bolia. Freq. gli steli biflori ed anche uniflori.
(3) Passo di Sassello (Favrat).
(4) Abbondante al S. Salvatore, M. Brè, M. Bolia, Caprino, nella Valsolda (Lenticchia).

Fam. Globularieae.

Globularia. (1)

1. **G. vulgaris** auct. non Lin. (*G. Willkommii* Nym.).
   ♃ Prati aridi, colli rocciosi = Mendrisio — Castello S. Pietro — V. di Muggio, tra Obino e Monte ecc. — Bellagio (2).
   F. ceruleo — [Mag.—Giug.]
2. **G. cordifolia** Lin. sp. 1. p. 139.
   ♃ Rupi e ghiaie delle alpi e valli = S. Bernardino — Lucomagno — V. di Peccia, presso il Piano — S. Salvatore, piede — Gandria — Generoso — V. di Muggio.
   F. ceruleo — [Mag.—Giug.]

Fam. Plumbagineae.

Statice.

1. **S. alpina** Hoppe pl. alp. exsicc. (*Armeria alpina* Willd.).
   Pascoli alp. e fra i dirupi = Naret — S. Gottardo — A. di Piora — Lucomagno — Val Calanca — Leventina — Passo Scaradra (Schröter) — M. Generoso.
   F. roseo — [Lug.—Ag.]

Fam. Plantagineae.

Littorella.

1. **L. lacustris** Lin. sp. 160 e 295.
   ♃ Luoghi innondati, arenosi, in riva ed entro i laghi = Locarno — Da Muralto alla foce della Verzasca, frequentatissima nel lago e lungo le rive.
   F. bianchiccio — [Giug.—Lug.]

Plantago.

1. **P. maior** Lin. sp. 163.
   Ital. *Piantaggine.* — *Piantaj* (Comologno).
   ♃ Luoghi coltivati; dal piano alla reg. subalp. = Locarno — Campo V. M. ecc.
   F. bianchiccio — [Giug.—Ott.]
   I contadini se ne servono in decotto contro il mal di ventre.
2. **P. media** Lin. sp. 163.
   ♃ Prati; freq^{ma} = Locarno — Bellinzona — Campo V. M. ecc.
   F. bianchiccio — [Apr.—Giug.]

---

(1) Aggiungere: *Globularia nudicaulis* L. — M. Camoghè (Erbario Lenticchia).
(2) La v. *elongata* Heget. sul piede orientale del S. Salvatore (erb. Lenticchia).

3. **P. lanceolata** Lin. sp. 164.
   ♃ Prati e pascoli, freq^{ma} = Locarno (*β. altissima* Koch.)(1), strade — Bellinzona (*γ. pumila* Koch.)(2) presso il tiro alla carabina. — [Giug.—Lug.]
4. **P. alpina** Lin. sp. 165.
   ♃ Pascoli alp. = M. Generoso — S. Gottardo (Lenticchia) — M. Ceneri.
   F. bianchiccio — [Lug.—Ag.]
5. **P. serpentina** Vill. (*P. maritima* Koch = *P. carinata* Schrad. = *P. integralis* Gaud.).
   ♃ Prati di coll., mont. e reg. subalp. = M^{ti} di Golino — Tra Cavigliano e Auressio — M^{ti} di Corgello sopra Corippo — M. Ceneri — M. Ghiridone — Val Calanca — Isone — Camoghè — È pure freq. ne' monti della V. Cannobina sopra Guro (*β. dentata* Koch o *bidentata* Murith.) e in V. Vigezzo.
   F. bianco giallognolo — [Giug.—Sett.]

Subclassis Monochlamydeae.

Fam. Amarantaceae.

Amarantus.(3)

1. **A. Blitum** Lin. sp. 1405 (*Albersia Blitum* Kunth. = *Euxolus viridis* Moq.).
   ⊙ Luoghi colti, strade = Locarno ecc.(4)
   F. verdognoli — [Lug.—Ag.]
2. **A. sylvestris** Desf. cat. h. par. 44 (*A. Blitum* Moq.).
   ⊙ Margini campi, strade = Mendrisio — Capolago.
   F. verdognoli — [Lug.—Ag.]
3. **A. retroflexus** Lin. sp. 1407.
   ⊙ Luoghi coltivati, immondezzai, strade = Locarno, alla Ramogna — Bondo. [Lug.—Ag.]
4. **A. prostratus** Balb. (*Albersia deflexa* Gren.)(5).
   Capolago (Caldesi 1879 nov.) — Locarno, alla stazione (Lüscher). [Giug.—Sett.]

Fam. Phytolaccaceae.

Phytolacca.

1. **Ph. decandra** Lin. sp. 631.
   Ital. *Fitolacca.* — Loc. *Uga di biss.*
   ♃ Luoghi incolti = Biasca — Locarno — Lugano — Mendrisio.
   F. verdognolo — [Giug.—Ott.] — Le bacche sanguigno-scure dall' Ag. all' Ott.
   Originaria dalla Virginia, ora naturalizzata perfettamente nel Cantone. Le bacche usate per dare colore al vino e ad alcune specie di conserve. Radice velenosa.

---

(1) Castagnola, strada.
(2) È la v. *sphærostachya* DC. o v. *capitata* Ten. che si trova anche al M. Ceneri (Brügger in Rhiner).
(3) Aggiungere: *A. patulus* Bert. = *A. chlorostachys* Willd. Locarno (Ascherson in Rhiner) — *A. spinosus* L. Locarno (Ascherson). Confer. Berichte d. deutschen botan. Gesellschaft Vol. III. pag. 316.
(4) Molvaglia, Lorina (Rhiner). (5) Cattiva erba randagia.

Fam. Chenopodiaceae.

Polycnemum.

?1. **P. arvense** Lin. sp. 50.
⊙ Campi, strade = Mendrisiotto (?)(1).
[Lug.—Ag.]

Chenopodium.

1. **C. hybridum** Lin. sp. 318.
⊙ Luoghi coltivati, attorno ai letamai = Locarno, presso il fondo Bolletti.
[Lug.—Ag.]
2. **C. murale** Lin. sp. 318.
⊙ Ruderi, strade; sparso qua e là = Locarno — V. Mesolcina, presso Grono.
[Lug.—Sett.]
3. **C. album** Lin. sp. 319.
⊙ Col precedente.
[Lug.—Sett.]
4. **C. ficifolium** Smith. brit. 1. 276.
⊙ Strade = Bellinzona — Pianezzo (freq^te).
5. **C. polyspermum** Lin. sp. 1. p. 321.
⊙ Luoghi coltivati, strade, ghiaie fiumi = Locarno.
[Ag.—Sett.]
6. **C. Vulvaria** Lin. sp. 321.
⊙ Strade, presso letamai = Lugano — Mendrisio.
[Lug.—Ag.]
7. **C. Botrys** Lin. sp. 320.
⊙ Strade, ghiaie fiumi = Tra Sornico e Peccia (2).
[Lug.—Ag.]
La pianta manda un odore grato e viene perciò talvolta coltivata ne' giardini.

Blitum.

1. **B. capitatum** Lin. sp. 6.
Ital. *Spinaccio mora.* — Volg. *Magiostar d' Egitt.*
⊙ Luoghi ghiaiosi, rudereti = Osogna — Poleggio — Lugano.
[Giug.—Ag.]
I frutti maturi, dolci, mangerecci, ponno servire a tingere in rosso. — Le foglie si mangiano come gli spinacci.

(1) Colli di Como (Comolli. Fl. comense ed. 1818. p. 19).
(2) Presso Porlezza (Comolli. Loc. cit. p. 26).

2. **B. virgatum** Lin. sp. pl. 1. 7.
Ital. *Spinaccio fragola.*
⊙ Luoghi coltivati, strade = Valsolda, riva del lago.
[Giug.—Ag.]

3. **B. Bonus Henricus** C. A. Meyer. in Fl. altaic. 1. p. 11 (*Chenopodium Bonus Henricus* L.).
Ital. *Buono Enrico.* — Tic. *Vanagla* (in V. Morobbia e Verzasca), *Spinazz selvadegh* (Lomb.).
♃ Strade, presso letamai; sale fino alle alpi = Campo — Airolo — Comoghè, alpe di Lavena — Scudelatte.
[Mag.—Ag.]
Le foglie si mangiano come quelle degli spinacci.

?4. **B. rubrum** Reichb. (*Chenopodium rubrum* L.).
⊙ C. Ticino, secondo Hegetschweiler.
[Lug.—Sett.]

Beta.

1. **B. vulgaris** Lin. sp. 322.
Ital. *Barba bietola.* — Volg. *Biedrava* (Loc.), *Gniff* (Cevio).
⊙ Coltivata (1).
[Lug.—Ag.]
β. *Cicla* (*Beta Cicla* Lin. syst. veget. 2. p. 195).
⊙ Coltivata.
[Giug.—Lug.]
Si mangia la radice della specie, da cui si ricava anche zucchero. Le costole delle foglie della var. si mangiano cotte col burro. Tanto la sp. che la var. sono emollienti.

Spinacia.

1. **S. inermis** Mœnch. meth. 318 (*S. glabra* Mill.).
Ital. *Spinaccio.* — Tic. *Spinazz.*
⊙ e ⊙ Coltivata.
[Mag.—Giug.]

2. **S. spinosa** Mœnch. (*S. oleracea* L.).
Coltivata colla preced.

Atriplex. (2)

1. **A. hortensis** Lin. sp. 1493.
⊙ Coltivato.
Se ne mangiano le foglie come gli spinacci.

---

(1) Colle var. a radice rossa e a radice gialla.

(2) D'aggiungere: *A. hastatum* L. (*A. latifolium* Wahl.) al Generoso, in campi di segale, a 1200 m.; raro. Trovato da Penzig (Enum. del M. Generoso, 1879).

Fam. Poligoneae.

Rumex.[1]

1. **R. conglomeratus** Murr. prod. fl. gœtt. p. 52.
   Ital. *Lapazio.* — Volg. *Slavazz.*
   ♃ Lungo rive, fossi, prati = Locarno — Magadino — Bellinzona, Lugano ecc.
   [Lug.—Ag.]
2. **R. sanguineus** Lin. sp. 476 (*R. nemorosus* Schrad.?).
   α. viridis Koch. Boschi umidi = Locarno — Tenero.
   β. genuinus Koch. Muralto, presso la stazione ferroviaria — Tra Vira e Quartino, boschi, raro.
   [Mag.—Giug.]
3. **R. pulcher** Lin. sp. 477.
   ⊙ Strade, orti = Locarno, freq.[2]
   [Mag.—Lug.]
4. **R. obtusifolius** Lin. sp. 478.
   ♃ Tenero — Gordola — Generoso ecc.
   [Lug.—Ag.]
5. **R. crispus** Lin. sp. 476.
   ♃ Prati, campi, strade = Locarno — Losone ecc.
   [Lug.—Ag.]

?6. **R. Hydrolapathum** Huds. Fl. angl. p. 154.
   ♃ Paludi, acque di lento corso = Locarno, acque della fontana Orelli — Piano di Magadino.
   [Lug.—Ag.]

?7. **R. maximus** Schreb. in Schweigg. et Kört. Fl. erlang. 1. 152.
   ♃ Fossi, acque di lento corso = Cadenazzo — Contone.
   [Lug.—Ag.]

8. **R. alpinus** Lin. sp. 480.
   Tic. *Selavazz.*
   ♃ Alpi, attorno alle cascine dei pastori, ne' luoghi grassi, freq^{mo}; scende anche nelle convalli = Campo V. M. — Campo alla Torba — Alpi di Piora — S. Gottardo — S. Bernardino — M. Camoghè.
   [Lug.—Ag.]
9. **R. scutatus** Lin. sp. 480.
   ♃ Luoghi rupestris, dalle alpi al fondo delle valli = Locarno — Campo V. M. — V. di Peccia — V. Morobbia, vallone di Melirolo[3].
   [Mag.—Lug.]

---

[1]) Aggiungere: *R. nivalis* Heget., alla Greina (Rhiner).
[2]) Lugano ecc. (Favrat).
[3]) La v. *glaucus* Jacq. al Ceneri ecc. (Favrat).

10. **R. arifolius** All. ped. 2. p. 202.
    ♃ Prati alp. e subalp. = Campo, a Cortenovo.
    [Lug.—Ag.]
11. **R. Acetosa** Lin. sp. 1. 481.
    Ital. *Acetosa.* — Tic. *Pan cucch, Panicüca.*
    ♃ Prati e selve; comunissima.
    [Mag.—Ging.] — Rifiorisce dopo il raccolto dei primi fieni.
12. **R. Acetosella** Lin. sp. 1. 481.
    Ital. *Acetosella.* — Tic. *Pan cucch, Panicüca.*
    ♃ Prati, pascoli; freq. = Locarno — Brione — Maggia ecc.
    [Mag.—Lug.]

Oxyria.

1. **O. digyna** Campdera. monog. 155. t. 3. fig. 3 (*Rheum digynum* Walh. — *Rumex digynus* Lin. sp. 480).
    ♃ Rupi, fra le more, macerie delle alpi, lungo torrenti = Alpe di Cravairola — Campo alla Torba — Alpi di Piora — S. Gottardo — S. Bernardino.
    [Lug.—Ag.]

Polygonum. (1)

1. **P. Bistorta** Lin. sp. 516.
    Ital. *Sanguinaria bistorta.*
    ♃ Prati delle valli; da 350 a 1200 m. = Cevio — Tra Bignasco e Broglio — Generoso (2).
    F. rosso — [Ging.—Lug.]
2. **P. viviparum** Lin. sp. 2. 516.
    Ital. *Sanguinaria vivipara.*
    ♃ Pascoli alp. = Alpi di Bosco V. M., di Porcareccio, di Naret — S. Gottardo — S. Bernardino.
    F. bianco — [Lug.—Ag.]
3. **P. amphibium** Lin. sp. 517 *β. cœnosum* Koch.
    ♃ Paludi, fossi = Piano di Magadino.
    F. roseo — [Lug.—Ag.]
4. **P. lapathifolium** Lin. sp. 517.
    ⊙ Luoghi umidi = Locarno, roggia Orelli e sotto al giardino publico — Lugano, piede del S. Salvatore (3).
    F. roseo — [Ging.—Ott.]

---

(1) Aggiungere: *P. mite* Schrank, lungo fossi e sentieri umidi presso la Madonna della Salute a Massagno, al laghetto di Muzzano, a Casòro (Erb. Lentiechia).

(2) Prati umidi al piede del Camoghè.

(3) La v. *punctatum* Gremli, scoperta dal Mari, al Paradiso presso Lugano.

5. **P. Persicaria** Lin. sp. 518 *a*.
   ⊙ Col precedente; freq^{ma} = Locarno — Piano di Magadino — Bellinzona — Lugano ecc.
   F. roseo — [Lug.—Ott.]
6. **P. Hydropiper** Lin. sp. 517.
   ⊙ Luoghi umidi, fossi, strade = Locarno — Muralto.
   F. verde, marginato di roseo o di bianco — [Lug.—Ott.]
7. **P. minus** Hudson. Fl. angl. 1. 148.
   ⊙ Fossi, luoghi umidi = S. Nazzaro, riva lago Maggiore(1).
   F. roseo o bianco [Lug.—Nov.]
8. **P. aviculare** Lin. sp. 519.
   ⊙ Strade, luoghi colti, freq^{ma} = Locarno, a Muralto, riva del lago (var.?) — Pazzallo e Pregassona (Lent.) ecc.
   F. verde, marginato di roseo o di bianco — [Lug.—Nov.]
9. **P. Convolvulus** Lin. sp. 522.
   ⊙ Luoghi colti; freq^{ma} = Locarno — Lugano ecc.
   F. verde, internamente e al margine bianco — [Giug.—Nov.]
10. **P. dumetorum** Lin. sp. 629.
   ⊙ Siepi e dumi = Locarno — Tenero(2).
   [Giug.—Ag.]
11. **P. alpinum** All. ped. 1. p. 206. t. 68. f. 1.
   ♃ Prati alp. e delle valli = Cimalmotto — Alpi di Bosco V. M. — Campo alla Torba — Corte — Airolo ecc.
   F. bianco giallognoli — [Giug.—Ag.]
12. **P. Fagopyrum** Lin. sp. 522 (*Fagopyrum esculentum* Mönch.)(3).
   Ital. *Grano Saraceno, Fraina.*
   ⊙ Coltivato, dopo il taglio della segale, come secondo prodotto, nella Leventina — V. di Blenio — Riviera (freq. a Claro) — V. Maggia — Locarnese — Mendrisiotto, Agnuzzo, Agno, Albogasio in Valsolda (Lent.) ecc. — Trovasi di frequente fuggiasco lungo le strade e allora fiorisce assai prima.
   F. rosei o bianchi — [Lug.—Sett.]
   La farina dei semi dà una polenta nerastra, leggermente viscida, assai sana e gustosa.

Fam. Timeleae.

Daphne.

1. **D. Mezereum** Lin. sp. 509.
   ♄ Boschi della reg. mont. e subalp. = M. Tamaro — M. Generoso — Campo V. M (4)

(1) Chiggiogna (Rhiner).
(2) Piede del M. Generoso, luoghi colti (Penzig in Rhiner) — Piotta, prati (Lentiechia).
(3) Aggiungere: *P. tataricum* L. — Tra Cadro e Sonvico (Marl). Subspontaneo, probabilmente introdotto col *P. Fagopyrum*.
(4) M. Caprino, M. S. Giorgio, Denti della Vecchia; freq.

F. rosei, odorosi — [Febb.—Mag.] — Bacche rosse.
Velenosa. La corteccia è un potente escoriante (1).

2. **D. Laureola** Lin. sp. 510.
Ital. *Laureola*, *Olivetta*.
♄ Selve di coll. e mont. = Gerra — Gambarogno, boschi delle vallette che si aprono subito al dissopra del villaggio — Mondascie, sopra Tenero, in un vallon-cello che mette nella valle Tendra (trovata in fiore prima del Natale del 1863) (2).
F. verde-giallognoli, odorosi — [Mar.—Apr.]
Dalla distillazione delle bacche nere, acidule si può ottenere un liquido spiritoso e assai aggradevole.

3. **D. alpina** Lin. sp. 510.
♄ Pascoli rocciosi delle alpi = S. Bernardino, all' ospizio verso il laghetto — Lucomagno — M. Camoghè, pascoli elevati dell' alpe di Sertena — M. S. Giorgio.
F. bianco di soave olezzo — [Lug.—Ag.] — Bacca rossa.

4. **D. striata** (3) Trattinick. arch. 1. p. 120. t. 173.
Loc. *Giardellin*.
♄ Pascoli rocciosi di mont. = M^ti di Cardada di Brione sopra Minusio, dove cresce in consorzio colla *Nigritella angustifolia*.
F. rossi, odorosi — [Giug.—Lug.] — Bacca rossa.

5. **D. Cneorum** Lin. sp. 1. 50.
Volg. *Fiur del munt* (Lugano).
♄ Luoghi rocciosi del M. S. Salvatore e del Generoso (4).
F. rossi, odorosi — [Giug.—Lug.]

Fam. Laurineae.

Laurus.

1. **L. nobilis** Lin. sp. 1. 529.
Ital. *Alloro*, *Alloro poetico*. — Volg. *Lori*, *Loir* (Loc.), *Loiro* (Lug.).
♄ Luoghi rupestri della riva dei laghi = Locarno, al Tazzino, al Sasso, a Solduno — Tra Brissago e Ascona — Gandria — Caprino — Mendrisio.
F. bianchicci — [Mar.—Apr.] — Bacca nera.
Foglie e bacche odorose, assai aromatiche, servono di condimento. Legno buono per lavori da tornio.

---

(1) Le bacche sono velenose, acri, eccitano il vomito anche sanguigno. La corteccia di questa pianta, applicata sulla pelle, fa l' effetto d' un vescicante.

(2) M. Generoso sopra Capolago, M. S. Giorgio, Gandria. Si coltiva anche nei giardini.

(3) La *D. striata* Trat., si trova anche in V. Camadra, al Camoghè di V. Piora, all' alpe di Sertena, sui M^ti della V. Colla, come l' Arabione, il Pizzo Noresso. Differisce dalla *D. cneorum* del S. Salvatore soltanto pel perigonio glabro, striato e potrebbesi considerare come semplice var. di questa.

(4) Vicino alla Cassina, ma in copia molto minore che al S. Salvatore.

Fam. Santalaceae.

Thesium.

1. **T. montanum** Ehrhart. herb. exsicc. n. 2.
   ♃ Presso il ponte de' mulini, lungo la strada da Contra a Mergoscia — Generoso (Erb. Lic. Lug.) [1].
   F. verde, internamente bianco — [Giug.—Lug.]
2. **T. intermedium** Schrader. spicileg. fl. germ. p. 27.
   ♃ Virgulti e prati mont. = Losone — M. Generoso — M. S. Giorgio.
   F. come la precedente — [Giug.—Lug.]
3. **T. alpinum** Lin. sp. 301.
   ♃ Dai colli alle alpi — Losone — Brione sopra Minusio — Campo V. M. — Lucomagno, pascoli alla Casaccia — Camoghè (Erb. Lic. Lug.).
   [Giug.—Lug.]

Fam. Eleagneae.

Hippophae.

1. **H. rhamnoides** Lin. sp. 1452.
   Ital. *Olivello spinoso.* — Tic. *Brinscioi* (Cevio).
   ♄ Greti de' fiumi = Da Bodio a Cugnasco, lungo il Ticino — Tenero, lungo la Verzasca — Da Cevio a Locarno, lungo la Maggia.
   [Mar.—Apr.] — Bacca di color giallognolo.

Fam. Aristolochieae.

Aristolochia.

1. **A. rotunda** Lin. sp. 1364.
   ♃ Prati secchi, campi = Lugano, come ai ronchi sotto Rovello verso il Molino Nuovo, Massagno, Castagnola (Lentiechia) — Melano.
   Tubo della corolla giallo, vergato da linee fosco-porporine, labbro fosco porporino. F. odoroso — [Apr.—Mag.]

?2. **A. pallida** Waldst. et Kit. pl. rar. hungr. 3. p. 267. t. 240.
   ♃ Virgulti, prati di mont. = Lugano? — Belgirate [2].
   [Mar.—Apr.]
3. **A. Clematitis** Lin. sp. 1363.
   Tic. *Bacciocch de frau* (Locarno).
   ♃ Vigne, siepi, margine de' campi = Locarno, al Tazzino, Solduno, sotto la Motta — Losone — Ascona — Ronco — Brione — Mappo — Magadino a Vira (Rhiner) — Luganese, come a Carabbia, tra Cassagnola a Gandria (Lentiechia).
   F. bianco-giallognoli — [Mag.—Lug.]

---

(1) Pendici orientali del M. Brè, Gandria, Caprino (Muret, Favrat).
(2) Soltanto esemplari di Belgirate nell'erb. Franzoni.

Asarum.

1. **A. europæum** Lin. sp. 633.
   Volg. *Starnudina.*
   ♃ Selve, siepi, cespugli del fondo delle valli e de' monti = Locarno, seghe del Roncaccio — Losone, presso la Maggia, ne' cespugli — Broglio (Pometta).
   F. sanguigno-scuro — [Mar.—Apr.]

Fam. Empetreae.

Empetrum.

1. **E. nigrum** Lin. sp. 1450.
   ♄ (non supera i 30 centim.). Alpi, nelle macchie = S. Bernardino — S. Gottardo — Alpe di Mattignello nella V. di Campo V. M. — Alpi di Bosco V. M.
   F. rosco — [Mag.—Giug.] — Bacche mangereccie.

Fam. Euforbiaceae.

Buxus.

1. **B. sempervirens** Lin. sp. 1394.
   Ital. *Bosso, Mortella.* — Loc. *Martell, Martellina.*
   ♄ Sebben sia stato indicato da Ebel ed altri come crescente spontaneo nel Ticino, non mi venne fatto di vederlo altrimenti che coltivato (1).
   [Mar.—Apr.]
   Serve a ricingere le ajuole dei giardini, per ornamento e per far siepi. Il legno è eccellente per lavori da tornio.

Euphorbia. (2)

1. **E. Helioscopia** Lin. sp. 658.
   Ital. *Euforbio guardasole?*
   ⊙ Luoghi coltivati, freq. = Locarno — Melano — Capolago (3).
   [Lug.—Sett.]
2. **E. dulcis** Lin. sp. 656.
   ♃ Boschi; dal piano alle alpi = Locarno, al Salciolo sotto Tenero, freq. (4).
   [Mar.—Apr.]

---

(1) Subspontaneo l'ho trovato in una valletta presso Lugano tra la stazione ferroviaria e Massagno, e a Gandria.

(2) D'aggiungere: *E. Esula* L. Trovata da Penzig (Enumeraz. Generoso. 1879) sul Generoso, in alto. Confer. da Rhiner, che dice sicura, ben determinata. — *E. palustris* L. Balerna, luoghi umidi (Erb. Mari).

(3) Luoghi colti sopra la stazione ferroviaria di Lugano.

(4) M. Brè, M. S. Giorgio. — Un carattere, che si riscontra quasi costantemente in questa specie e che non trovo menzionato in nessun autore, è la presenza nel centro dell'ombrella di un fiore sessile, staminifero, colle glandole nettarifere rosse. Il Dr. Christ mi scrive che tale carattere si osserva anche negli esemplari del Jura (Lenticchia).

23. **E. carniolica** Jacq. austr. append. p. 34.
♃ Rive boscate al Salciolo sotto Tenero (1).
[Mag.—Giug.]

4. **E. verrucosa** Lam. dict. 2. 434.
♃ Luoghi incolti, virgulti — Mesolcina — Mendrisio — M. S. Giorgio (Coaz) — Corni di Canzo.
[Mag.—Giug.]

5. **E. amygdaloides** Lin. sp. 663.
♃ Selve ombrose della reg. mont. — Tra Obino e Casima in V. di Muggio, freq. — M. S. Giorgio (2).
[Apr.—Mag.]

6. **E. Cyparissias** Lin. sp. 661.
♃ Campi arenosi, strade — Locarno ecc., comunissima.
[Apr.—Mag.]

7. **E. Peplus** Lin. sp. 653.
⊙ Luoghi colti, strade — Bellinzona — Locarno — Melano — Lugano.
[Lug.—Dic.]

8. **E. exigua** Lin. sp. 654.
⊙ Luoghi colti.
[Lug.—Ott.]

9. **E. Lathyris** Lin. sp. 655.
⊙ Luoghi aspri — Ascona — Tra Moscia e il ponte di Ronco d'Ascona — Tra Solduno e le Vettagne — Mendrisio (Erb. Lic. Lug.).
Coltivasi anche negli orti — [Giug.—Lug.]
Velenosa; potentissimo drastico.

10. **E. variabilis** Cesati.
♃ Prati del M. S. Giorgio, dalla Cascina di Meride alla vetta (1880 Luglio) (3).
[Giug.—Lug.]

Mercurialis.

1. **M. perennis** Lin. sp. 1465.
♃ Selve di mont.
[Apr.—Mag.]

2. **M. annua** Lin. sp. 1465.
⊙ Giardini, orti, campi; comune.
[Giug.—Nov.] (4)

---

(1) A Valmeria sopra Mandello raccolta da Casati (Comolli Fl. com. 1818 p. 14).
(2) M. Bolia.
(3) Grigne e Corni di Canzo (Christ).
(4) Già al principio di Marzo colsi la *M. annua* sopra vecchi muri tra Castagnola e Gandria e a Ponte Cassarina presso Lugano (Prof. A. Lentecchia. I primi fiori nel C. Ticino. Dalla Riv. it. d. sc. nat. fasc. 10° e seg. 1889).

Fam. Urticeae.

Urtica.

1. **U. urens** Lin. sp. 1396.
   Ital. *Ortica* — Tic. *Ortiga*.
   ⊙ Luoghi colti, immondezzai, strade = Bellinzona, dappertutto — Airolo ecc.
   [Lug.—Ott.]

2. **U. dioica** Lin. sp. 1396.
   Ital. *Ortica*. — Tic. *Ortiga*, *Ortigh*.
   ♃ Siepi, luoghi umidi, ombrosi, lungo i muri, maccrie, dappertutto.
   [Lug.—Sett.]
   Lo strato corticale è di fibre, che possono ridursi in filo di qualche pregio.

Parietaria.

1. **P. erecta** M. e K. Deutschl. Fl. 1. p. 825 (*P. officinalis* L.).
   Ital. *Parietaria*, *Vitriola*. — Volg. *Vedrieula*, *Vedrieura* (Loc.); *Vedraja* (Mendr.).
   ♃ Muri, maccrie; freq^{te} = Locarno — Bellinzona ecc.
   [Lug.—Ott.]
   Serve per polire i vetri, e di qui il suo nome volgare *vedrieula*.

2. **P. diffusa** M. e K. Deutschl. Fl. 1. p. 827 (*P. ramiflora* Mönch.).
   Volg. *Vedrieula*.
   ♃ Muri, strade soleggiate = Locarno — Lugano — Gandria — Mendrisio.
   [Lug.—Ott.]

Cannabis.

1. **C. sativa** Lin. sp. 1457.
   Ital. *Canape*. — *Canov* (Loc.).
   ⊙ Originaria dall' India, si coltiva per tutto il Cantone.
   [Lug.—Ag.]

Humulus.

1. **H. Lupulus** Lin. sp. 1457.
   Ital. *Lupolo*. — Volg. *Lavertis*, *Lovertis* (Loc.).
   ♃ Dumeti, siepi; freq^{mo} = Locarno — Cadenazzo — Bellinzona — Maroggia — Lugano.
   Si mangiamo le cime dei getti primaticci a mò degli asparagi, o nella minestra. — Questa pianta, coltivata in copia in Germania e Svizzera a cagione della lupulina, che serve alla fabbricazione della birra, ha un odore aliaceo assai nauseoso.

Ficus.

1. **F. Carica** Lin. sp. 1513.

   ♄ Cresce selvatico nelle rupi tra Solduno e Ponte Brolla — Sotto la Mad. Sasso — Gandria (1) — Coltivasi abbondantemente nella Val del Ticino da Bodio a Locarno, nella bassa V. Maggia, sul Luganese e Mendrisiotto. Se ne coltivano varie qualità dette *Genovese*, di *Smirne* etc. La Genovese dà frutti (detti *fioroni*) in Giugno e poi in Settembre.

Morus.

1. **M. alba** Lin. sp. 1398.

   Ital. *Moro*, *Gelso*. — Tic. *Moron*.

   ♄ Coltivasi, a cagione della foglia, alimento dei bachi da seta, ad albero, ceppaia, capitozza ed a siepi alla riva dei laghi e nelle valli, ove ascende fino a 800 m (Bogno in V. Colla).

   Fior. Maggio.

   Oriundo dall' Oriente, di là trasportato in Morea verso il 400 dell' Era volgare, donde il suo nome italiano di Moro, e di colà passato poi in Italia. I frutti bianchicci maturano verso la fine di Giugno, sono zuccherini e mangereccі — Legno giallognolo, ottimo per mobili.

2. **M. nigra** Lin. sp. 1398.

   Ital. *Moro*. — Tic. *Moron negar*.

   ♄ Coltivato un tempo; trovasi ora qua e là nelle Valli — Bignasco, al M^to del Cantone — Sopra Faido.

   Fior. Maggio — Frutto nero mangereccio.

Celtis.

1. **C. australis** Lin. sp. pl. 2. p. 1478.

   Ital. *Perlaro*, *Bagolaro*. — Volg. *Fregicè*.

   ♄ Luoghi rocciosi = Tra Someo e Ruè — Gandria — Riva S. Vitale (Heer) (2).

   Perig. bianco — [Mag.] — Bacca nera, edule.

   Legno eccellente per fare fruste.

Ulmus.

1. **U. campestris** Lin. sp. 327.

   Ital. *Olmo*. — Tic. *Olm*.

   ♄ Selve montane = Crana e Comologno in V. di Vergelletto — Locarno, qua e là qualche pianta nelle siepi — Valletta di Contra (*U. nuda* Koch = *U. montana* Sm. = *U. nuda* Ehrh.).

   [Mar.—Apr.]

---

(1) Al M. Caprino, al S. Salvatore ecc. I frutti del fico selvatico sono più piccoli di quelli del fico coltivato, ma assai zuccherini.

(2) Collina tra Sorengo e Moncucco.

2. **U. effusa** Willd. prodr. fl. berol. n. 296.
Ital. *Olmo.* — Tic. *Olm.*
♄ Selve montane = Mendrisiotto — Luganese.
[Mar.—Apr.]
Legno ottimo per lavori da tornio; se ne fanno bocce, scodelle, tafferie ecc. (1)

Fam. Juglandeae.

Juglans.

1. **J. regia** Lin. sp. 1415.
Ital. *Noce.* — Tic. *Nus.*
♄ Coltivato. — [Mag.]

Fam. Cupuliferae.

Fagus.

1. **F. sylvatica** Lin. sp. 1416.
Ital. *Faggio.* — Tic. *Fò, Faise* (V. Mag.). — *Faied* e *Faed* le selve di faggio.
♄ Dal piano alla reg. subalp. fino a circa 1400 m. Rivestiva i fianchi di buona parte dei monti delle nostre valli cis- e transcinerine; ora va distruggendosi sempre più (2).
Fior. Maggio.
Legno eccellente da fuoco; dai semi, detti *faggiuole*, ghiotto pascolo ai maiali, danno, spremuti, un olio da ardere. Le foglie servono di strame ed a riempire i sacconi de' giacigli de' montanari e degli alpigiani e diconsi sane, sebbene mandino odore poco grato.

Castanea.

1. **C. sativa** Mill. (*C. vulgaris* Lam. dict. 1. p. 708).
♄ Abbondante; forma selve estese in collina e mont.
Fior. Giugno.
Legno, resistente all' umido e al tarlo, si adopera per fare travi, porte, tini, botti ecc. La corteccia atta alla concia delle pelli.

Quercus.(3)

1. **Q. sessiliflora** Sm. brit. 3. 1026 (4).
Ital. *Quercia, Rovere.* — Tic. *Rogor.*

---

(1) D' aggiungere: *Platanus occidentalis* L., originario dall' America del Nord, e *P. orientalis* L. dall' Oriente, della famiglia delle *Plataneae*, alberi coltivati ne' pubblici passeggi e ne' giardini.

(2) Per cura del Governo Cantonale e Federale ora si vanno ripopolando i monti di novelle piantagioni.

(3) Aggiungere: *Q. pubescens* Willd. M. Ceneri (Brügger in Rhiner) — S. Salvatore — Gandria.
Q. suber L. Coltivata nel giardino Grecchi-Luvini a Lugano. La corteccia non s' ingrossa però molto.
Q. Ilex L. Sopra Bene e Grona in V. Menaggio (Comolli. Fl. com. 1857. v. VII. p. 139).

(4) La v. *subfastigiata* Deb. al Lago d' Orta (Christ).

♄ Forma selve ombrose (*rogoline* volg.), non ascende nelle alpi oltre i 1000 m. — Centovalli — Onsernone — V. Maggia — V. d' Arbedo — Mesolcina — Meride.
[Apr.—Mag.]
Legno per costruzioni; corteccia atta alla concia delle pelli, massime quella de' rami giovani, conosciuta in commercio col nome di *Rusca*. — Frutto ottimo per nutrire i maiali.

2. **Q. pedunculata** Ehrhart. arbor. n. 77.
Ital. *Rovere*, *Quercia*. — Tic. *Rogor*.
♄ Pianura, ne' luoghi più caldi e bassi = Mendrisiotto — Luganese — Cadenazzo — Bellinzona — Locarnese.
Fior. in Maggio.
Qualità della precedente.

3. **Q. Cerris** Lin. sp. 141.
Ital. *Cerro*. — Tic. *Scerr*.
♄ Luoghi montuosi = Melano, salita di Rovio, nelle selve[1].
Fior. Maggio.
Qualità delle precedenti.

Corylus.

1. **C. Avellana** Lin. sp. 1417.
Ital. *Nocciuolo*. — Tic. *Nisceur*, *Nisceul*.
♄ Selve e dumi; freq^{mo}; anche coltivato.
[Feb.—Mar.]
Frutto edule, dà un buon olio; il legno fornisce eccellente carbone.

Carpinus.

1. **C. Betulus** Lin. sp. 1416.
Ital. *Carpino*. — Tic. *Carpèn*.
♄ Selve di coll. e mont. = Luganese — Mendrisiotto, freq.
[Apr.—Mag.]
Se ne fanno siepi; dà eccellente carbone.

Ostrya.

1. **O. carpinifolia** Scop. carn. 2. p. 243 (*Carpinus Ostrya* L.).
♄ Rive dei fiumi e torrenti, selve di mont. = Mendrisio, alla Cassina — M. S. Salvatore[2].
[Apr.—Mag.]

---

(1) Sopra Astano (Coaz). Gremli N. B. z. Fl. d. Schw. 1887, fasc. IV° p. 30 — Sotto Brè (Favrat).
(2) Sopra Grono, Mesocco (Coaz). Gremli N. B. z. Fl. d. Schw. 1887, fasc. IV° p. 30 — Sotto Isone (Schröter) — Tra Castagnola e Gandria (Lent.).

Fam. Salicineae.

Salix. (1)

1. **S. pentandra** Lin. sp. 1442.
   Ital. *Salcio laurino.*
   ♄ (1,20 m. circa). Convalli subalp., in riva ai torrenti, lungo i quali scende anche al piano = Ascona, riva della Maggia — Bellinzona, lungo il Ticino — Ambri ecc.
   [Mag. – Giug.]
2. **S. fragilis** Lin. sp. 1443.
   Ital. *Salcio fragile.* — Tic. *Sares selvadigh.*
   ♄ Rive, luoghi paludosi = Piano di Magadino — Cadenazzo.
   [Apr.—Mag.]
3. **S. alba** Lin. sp. 1449.
   Ital. *Salcio bianco.* — Tic. *Sares selvadigh.*
   ♄ Col precedente. — [Apr.—Mag.] — Anche coltivato.
4. **S. amygdalina** Koch. non Lin. (*S. triandra* L.).
   Ital. *Salcio.* — Tic. *Sares selvadigh.*
   ♄ Rive, luoghi paludosi = Locarno (2).
   [Apr.—Mag.]
5. **S. purpurea** Lin. sp. 1444.
   Ital. *Salcio porporino.* — Tic. *Sares ross.*
   ♄ Rive e luoghi umidi, fino a 2000 m. = Locarno ecc.
   [Mar.—Apr.]
6. **S. rubra** Huds. Fl. angl. p. 423.
   ♄ Rive e luoghi umidi = Piano di Magadino.
   [Mar.—Apr.]
7. **S. viminalis** Lin. sp. 1448.
   Ital. *Vimini.* — Tic. *Saresen.*
   ♄ Rive, fra dumi, ne' luoghi umidi — Piano di Magadino — Osogna (Erb. Lic. Lug.).
   [Mar.—Apr.]
8. **S. cinerea** Lin. sp. 1449.
   ♄ Pascoli, dumi, luoghi umidi = V. di Blenio, presso Malvaglia.
   [Mar.—Apr.]

---

(1) D' aggiungere: *S. Myrsinites* L. Generoso e Forca di Bosco V. M. (Comolli Fl. com. p. 183) — Casaccia (Rhiner).
S. nigricans Sm. Collinetta di Montarina sopra Lugano (Lent.) — M. S. Salvatore, v. *glabra* (Erb. Mari).
S. babylonica L. (Salice piangente) — Coltivato.

(2) La v. *discolor* Koch. nelle colline presso Lugano (Erb. Lent.).

9. **S. Capræa** Lin. sp. 1448.
Ital. *Salcio caprino.*
♄ Selve e boschi, fino alle A. = Locarno — Tra Maggia e Gordevio — V. Verzasca — Sorengo (Lent.).
[Mar.—Apr.]

10. **S. aurita** Lin. sp. 1446.
♄ Prati, selve umide = Mendrisiotto, verso Cragno.
[Apr.—Mag.]

11. **S. hastata** Lin. sp. 1443.
♄ Pascoli umidi delle alpi più elevate — S. Gottardo.
[Giugno]

12. **S. ambigua** Ehrh. (1) Beitr. 6. p. 103.
♄ Prati e pascoli umidi, spongiosi.
[Apr.—Mag.]

13. **S. repens** Lin. sp. 1447?
♄ Prati umidi, paludi = Forca di Bosco V. M.
[Apr.]

14. **S. Lapponum** (2) Lin. sp. 1447, secund. Laestad. et Frieg.
♄ Luoghi umidi alp. — S. Bernardino.
[Mag.—Giug.]

15. **S. Arbuscula** Lin. sp. p. 1445.
♄ Luoghi umidi delle alpi = Camoghè, Cima di Noresso e Piancabella in V. Colla — M. Generoso (Comolli, Fl. com. 7. p. 185) (3).
[Giug.—Lug.]

16. **S. glauca** Lin. sp. 1446.
♄ Alpi elevate = S. Gottardo (Moritzi, Rhiner).
[Giug.—Lug.]

17. **S. reticulata** Lin. sp. 1446.
Ital. *Salcio reticulato.*
♄ (da 10—12 cm.). Pascoli alp. rocciosi, umidi — S. Gottardo — Campo — Motto Minaccio — Camoghè e cime della V. Morobbia.

18. **S. retusa** Lin. sp. 1445.
Ital. *Salcio spuntato.*

---

(1) Ibrido, *S. aurita* × *repens.*

(2) Sarà il *S. hetretica* Vill. Il vero *S. Lapponum* L. ha foglie e capsule meno fortemente pelose, i gattini più spessi, quasi sessili, stigma quasi sempre indivisi; è una specie del Nord d' Europa (Gremli ed. fr. 1886, p. 463).

(3) Casaccia (Rhiner).

♄ (da 6—8 cm.). Luoghi rocciosi dei monti e delle alpi, fino a 2000 m. = Motto Minaccio sopra Campo V. M. — Naret — S. Gottardo — S. Salvatore, alla cima (Comolli).
[Lug.—Ag.]

19. **S. herbacea** Lin. sp. 1445.
Ital. *Salcio pigmeo.*
♄ (3—8 cm.). Alpi da 1700–2200 m., luoghi aspri, rocciosi, fra le nevi perenni (1).
[Lug.—Ag.]

Populus.

1. **P. alba** Lin. sp. 1463.
♄ Prati, selve = Meride, lungo la strada presso Tremona, freq^te.
[Mar.—Apr.]

2. **P. canescens** Smith. (2) brit. 1080 (*P. hybrida* Bieb.).
♄ Col precedente, ma più raro.
[Mar.—Apr.]

3. **P. tremula** Lin. sp. 1464.
Tic. *Alberella.*
♄ Boschi della reg. coll., mont. e subalp. = Mondascie presso Locarno — V. Bavona, alpe della Costa — V. Maggia — V. di Campo V. M., tra Niva e il Piano — M. Generoso, tra Casima e la Baldovana.
[Mar.—Apr.]
Legno da costruzione.

4. **P. pyramidalis** Rozier. conf. Lam. dict. 5. p. 235 (*P. dilatata* Ait., nome equivoco).
Ital. *Pioppo.*
♄ Originario dall' Oriente. Coltivato qua e là lungo le strade e ne' prati.
[Mar.—Apr.]
Legno da fuoco e da costruzione, ma di cattiva qualità.

5. **P. nigra** Lin. sp. 2. p. 1464.
Ital. *Pioppo.* — Tic. *Pobbia* (Loc.).
♄ Luoghi umidi, rive = Locarno, saleggi — Piano di Magadino — Pian d' Agno.
[Mar.–Apr.]

Fam. Betulaceae.

Betula.

1. **B. alba** Lin. sp. 1393 (*B. verrucosa* Ehrh.).
Ital. *Betulla.* — *Bedola* (Loc. Lug.), *Badeja*, *Badeglia* (Bignasco, Covergno).

---

(1) S. Gottardo (Comolli. Fl. com. V. VII. p. 187).
(2) Probabilmente *P. alba* × *tremula.*

♃ Selve sterili, arenose; dal piano alla reg. subalp. = Locarno, sopra al Tazzino, al Sasso, Pian Albigo — V. di Campo V. M. ecc.

[Apr.—Mag.]

Legno eccellente da fuoco. Colla corteccia si forma una specie di fiaccole, che i contadini dicono *lete*, colle quali rompono le tenebre nelle loro gite notturne nelle alpi e nelle loro capanne.

2. **B. pubescens** Ehrh. Beitr. 6. p. 98. arb. n. 67.

♃ o ♄ Prati umidi, spongiosi; ascende alla reg. subalp. = M. Ceneri — M. Tamar, alpe di Cortenovo.

[Apr.—Mag.]

Legno come il precedente.

3. **B. nana** Lin. Fl. Lapp. n. 342. sp. pl. 2. p. 1394.

♄ (50 cm. circa). Rara. Luoghi umidi delle alpi e prealpi = Forca di Bosco V. M. col *Rheum digynum* (Comolli. Fl. com. 7. p. 147).

[Maggio]

Alnus.

1. **A. viridis** DC. Fl. fr. 3. p. 304.

Ital. *Betula orata?* — Tic. *Dros.*

♄ Declivi delle alpi e subalpi; frequentissimo nelle alpi granitiche, dove supplisce al *Pinus Pumilio* = S. Gottardo — Campo alla Torba — M. Tamar — Camoghè Generoso — Val Calanca.

[Mag.—Giug.]

var. *Brembana* Bota. Prosp. fl. prov. Berg. 70 (v. *minor* Parlat.).

♄ M. Tamar, alpe di Fontanella (Muret) — M. Camoghè — V. Maggia (Gremli) — Val Calanca (Brügger).

2. **A. incana** DC. fl. fr. 3. 304.

♃ Ital. *Ontano bianco.* — Tic. *Alniscia, Niscia.*

Convalli alp. e subalp., lungo i fiumi = Tra Cevio e Someo — Tra Biasca e Bellinzona ecc.

[Febb.—Mar.]

var. *sericea* Christ.

Salita da Peccia a Camleo, lungo strada (osservata da Christ nel Luglio 1873).

3. **A. glutinosa** Gærtn. fruct. 2. t. 90.

♃ Prati bassi, umidi, lungo le paludi = Locarno, saleggi — Piano di Magadino — Agno — Tra Cevio e Someo.

[Febb.—Mar.]

Fam. Conifere.

Taxus.

1. **T. baccata** Lin. sp. 1472.
   Ital. *Albero della morte*, *Tasso*. — Tic. *Nass*.
   ♄ Selve della reg. subalp. = Locarno, al Belvedere — Riva S. Vitale (1).
   [Mar.—Apr.]
   Bacche (rossigne) e foglie velenose. Legno ottimo per mobili e per costruzione di lunga durata.

Juniperus. (2)

1. **J. nana** Willd. arb. 159.
   Ital. *Ginepro nano*. — Tic. *Ginever*, *Genever*.
   ♄ Luoghi sterili e rupestri alp. e subalp. = Alpi di Bosco, d' Arnavo, di Mattignallo in V. Maggia — M. Tamar, poncione di Neggio.
   [Lug.—Ag.]
   Bacche aromatiche, cibo prediletto di vari uccelli, usate nella cucina. In Germania e Inghilterra se ne distilla un liquor, detto *Gin*.
2. **J. communis** Lin. sp. 1470.
   Ital. *Ginepro*. — Tic. *Zenever*, *Ginever*.
   ♄ Pianure incolte, colli, monti; fino alle alpi = Locarno, saleggi — Someo, Cevio, lungo la Maggia — Naret — Forca di Bosco — Campo V. M. — Da Giornico a Magadino, lungo il Ticino — V. Mesolcina, lungo la Moesa — S. Gottardo — S. Bernardino — Sottoceneri (Lenticchia).
   [Apr.—Mag.]
   Uso del precedente.

Cupressus.

1. **C. sempervirens** Lin. sp. 1422.
   Ital. *Cipresso*. — Tic. *Cipress*.
   ♄ Coltivato qua e là nelle reg. più basse = Bellinzona — Tenero — Locarno — Brissago — Lugano.
   [Febb.—Mar.] (3)

Pinus.

1. **P. Pumilio** Haenke (*P. montana* Mill. v. *pumilio* Hänk. — *P. Mughus* Scop. v. *pumilio* Koch).
   Ital. *Pino nano*, *Mugo*. — *Zimber* (a S. Bernardino).

---

(1) Brione sopra Minusio (Rhiner).

(2) D' aggiungere: *J. Sabina* L. Spontaneo al Bolia in pochi esemplari (un esemplare, avuto da Mari, nell' erb. Lenticchia).

(3) Coltivata in quasi tutti i giardini, o per siepe o per ornamento, la *Thuja orientalis* L. (*Tulia* volg. a Lugano).

⚥ Alpi calcari e silicee, fino a 1500 m. Cresce in estesi cespugli e copre spesso vastissimi spazi = S. Bernardino — Alpi di Sonogno in V. Verzasca — Lucomagno ecc.(1).

[Lug.—Ag.]

2. **P. sylvestris** Lin. sp. 1418.

Ital. *Pino.* — Loc. *Teon?*, *Pin.*

⚥ Pian., coll., mont. dove forma estese foreste; di rado tocca i 1700 m.; da noi raro = M^ti sopra Locarno.

[Mag.—Lug.]

3. **P. Pinea** Lin. sp. 1419.

⚥ Se ne vede un esemplare ad Intragna, che dà frutti maturi.

[Maggio]

4. **P. Cembra** Lin. sp. 1419.

Ital. *Cembro.* — Tic. *Zimber*, *Pigneu.*

⚥ Alpi elevate = Piora, laghetto di Tom — Casaccia sul Lucomagno, freq. fino a 2000 m.

[Giugno]

I frutti si mangiano. Legno da fuoco.

Abies.

1. **A. pectinata** DC. Fl. fr. 3. p. 275 (*Pinus Abies* Duroi, *Pinus Picea* L.).

Ital. *Abete bianco*, *Pezzo.* — Tic. *Pescia.*

⚥ Selve subalp. e alp. fino a 1600 m. circa.

[Mag.]

Legno da costruzione e da fuoco; il suo carbone ha poco valore.

2. **A. excelsa** DC. Fl. fr. 3. p. 275 (*Pinus abies* L., *Pinus Picea* Duroi)(2).

Ital. *Abete*, *Abete rosso.* — Tic. *Crovat*, *Pescia.*

⚥ Reg. mont., alp. e subalp. dove forma estesi boschi fino a 1900 m. = V. Maggia — Leventina — Blenio — Verzasca.

[Maggio]

Era una delle principali ricchezze ed ornamento delle nostre valli, ora in parte distrutto. Legname da opera e da fuoco.

3. **A. Larix** Lam. illustr. t. 785. fig. 2 (*Pinus Larix* L. o *Larix europea* DC.).

Ital. *Larice.* — Tic. *Lares.*

⚥ Selve subalp. e alp., fino a 2300 m. = S. Bernardino — V. di Campo — Leventina ecc.

[Maggio]

Legname da opera, assai durevole anche esposto all' acqua e più pregiato del precedente. — Resina detta volg. *trementina*, che si cava aprendo un foro nel tronco, ciò che però danneggia gravemente la pianta.

(1) Le v. *Pumilio* e *uncinata* del *P. montana* a Casaccia (Rhiner).

(2) L' *A. excelsa* DC. produce gli strobili che cadono a terra, l' *A. pectinata* DC. invece ha gli strobili, di cui non si staccano e cadono che le scaglie, rimanendo sulla pianta l' asse dello strobilo come prolungamento dei rami. Il volgo, non vedendo gli strobili a terra sotto la pianta, crede che l' abete bianco non dia frutti.

Classis Monocotyledoneae.

Fam. Hydrocharidaceae.

Vallisneria.

1. **V. spiralis** Lin. sp. 1441.
   ♃ Nel Ceresio = Ponte Tresa — Torrazza — Agno e Paradiso (Lenticchia) — Morcote (Schröter).
   [Apr.—Sett.]

Fam. Alismaceae.

Alisma.

1. **A. Plantago** Lin. sp. 486.
   ♃ Acque stagnanti = Piano di Magadino — Pian d' Agno.
   F. bianco — [Lug.—Ag.]

Fam. Juncaginaceae.

Triglochin.

1. **T. palustre** Lin. sp. 482.
   ♃ Luoghi umidi delle alpi = S. Bernardino (1400 m.) — Lucomagno, paludi presso Santa Maria (1) — V. Sambuco, poco sopra alla Capella, in un luogo acquitrinoso.
   [Giug.—Lug.]

Fam. Potameae.

Potamogeton.

1. **P. natans** Lin. sp. 182.
   ♃ Acque stagnanti o di lento corso; da 230—1400 m. = Piano di Magadino, nelle *bolle*, freq^{mo} — S. Bernardino, laghetto presso il villaggio.
   [Lug.—Ag.]
2. **P. fluitans** Roth. tentam. fl. germ. 1. 72. 2. 202.
   ♃ Fiumi ed acque di lento corso = Locarno, naviglio.
   [Lug.—Ag.]

---

(1) E a Casaccia (Rhiner).

3. **P. lucens** Lin. sp. 183.
   ♃ Acque stagnanti e correnti = Locarno, nel lago fra Mappo e la foce del Ticino — Melide, lago — Porlezza (Brügger).
   [Lug.—Ag.]
4. **P. perfoliatus** Lin. sp. 182.
   Loc. *Insalata di asen.*
   ♃ Stagni, fiumi, laghi = Lago Maggiore, a Locarno e a Mappo, freq^{te} — Morcote (Schröter)(1).
   [Lug.—Ag.]
5. **P. crispus** Lin. sp. 183.
   ♃ Acque stagnanti e correnti. = Locarno e Mappo, nel lago — Piano di Magadino, fossati — Lugano, lago.
   [Ging.—Ag.]
6. **P. pusillus** Lin. sp. 184.
   ♃ Acque stagnanti = Piano di Magadino — Pedrinate, in un fosso (Mari).
   [Lug.—Ag.]
7. **P. pectinatus** Lin.
   ♃ Acque stagnanti e correnti = Tra la Torrazza e Lavena, lago di Lugano.
   [Lug.—Ag.]
8. **P. densus** Lin. sp. 182.
   ♃ Acque stagnanti e di lento corso = Piano di Magadino, paludi — Locarno, naviglio.
   [Lug.—Ag.]

Zanichellia.

1. **Z. palustris** Lin. sp. 2. p. 1375.
   ♃ Acque stagnanti = Locarno, laghetto degli Orelli e lago Maggiore.
   [Mag.—Ging.]

Fam. Najadeae.

Najas.

1. **N. maior** Roth. tent. 2. 2. p. 499.
   ⊙ Fondo de' laghi = Lago Maggiore, da Rivapiana sino al porto di Locarno, alle Fracce e a Mappo; freq^{te} (2).
   [Ag.—Sett.]
2. **N. minor** All. fl. ped. 2. p. 221.
   ⊙ Fondo de' laghi = Torrazza, lago di Lugano — Presso Arona.
   [Ag.—Sett.]

---

(1) Abbondante sul fondo del Ceresio presso la riva di Lugano.
(2) Nel Ceresio, a Cosòro.

Fam. Lemnaceae.

Lemna.

1. **L. polyrrhiza** Lin. sp. 1377.
   Ital. *Lente d' acqua.*
   ⊙ Nuota nelle acque stagnanti o di lento corso = Locarno, rivo della fontana degli Orelli — Piano di Magadino.
   [Mag.]
2. **L. minor** Lin. sp. 1376.
   ⊙ Nuota sulle acque stagnanti — Dappertutto.
   [Maggio]

Fam. Typhaceae.

Typha.

1. **T. latifolia** Lin. sp. 1377.
   Munit (Loc.).
   ♃ Paludi e fiumi = Piano di Magadino — Pian d' Agno.
   [Lug.—Ag.]
2. **T. minima** Hoppe (*T. Laxmanni* Lepech., *T. angustifolia* Lin. sp. 1377 *β*).
   ♃ Letto dei fiumi = Piano di Magadino, chiatte presso Cugnasco.
   [Mag.—Giug.]

Sparganium. (¹)

1. **S. simplex** Huds. angl. 401.
   ♃ Stagni, fossi = Mappo, acque delle seghe del Roncaccio presso la loro foce — Piano di Magadino — Bellinzona, fossi lungo il Ticino subito dissotto il ponte — Riva S. Vitale.
   [Lug.—Ag.]
2. **S. natans** Koch. non L. (*S. minimum* Fr.).
   ♃ Piscine e paludi = In un pozzo detto il laghetto di Poltrinone sul Camoghè, a circa 1200 m.
   [Lug.—Ag.]
   Sorge ritto dal fondo dell' acqua fino alla superficie, poi la foglia, che raggiunge la superficie, si corica sull' acqua, formando un angolo retto colla parte di essa che resta sommersa e nuota sovr' essa.

(¹) Aggiungere: *S. ramosum* Huds. — Mendrisio (Erb. Lic. Lug. cat. p. 63).

Fam. Aroideae.

Arum.[1]

1. **A. maculatum** Lin. sp. 1370.
   Ital. *Cicchero.* — Volg. *Pè de' Videll!*
   ♃ Vigneti, strade = Brissago.
   Spata bianca, spadice sanguigno — [Mag.—Giug.] — In Agosto le piccole bacche di color cocciniglia.

2. **A. italicum** Mill. dict. n. 2.
   Ital. *Aro, Cicchero.*
   ♃ A Gandria, nella strada stessa del villaggio ascendendo verso Brè — Massagno — Sotto Biogno Luganese.
   Spata di un verde pallido esternamente, nell' interno macchiata di strie porporine; spadice giallo — [Mag.—Giug.]

Acorus.

?1. **A. Calamus** Lin. sp. 462. excl. var. β.
   ♃ Acque stagnanti e lungo i fiumi. Si vuole osservato dal Dr. Ferrini nelle paludi presso Cadenazzo.
   [Giug.—Lug.]
   Coltivato in alcuni giardini per la fragranza delle foglie.

Fam. Orchideae.[2]

Orchis.

1. **O. fusca** Jacq. Fl. austr. 4. t. 307 (*O. purpurea* Huds.).
   ♃ Luoghi selvatici di mont. = Luganese — M. Caslano — Mendrisiotto — M. Generoso, alla cima (Comolli).
   F. porporino-fosco — [Mag.—Giug.]

2. **O. militaris** Lin. Fl. svec. p. 310.
   ♃ Colli, prati = V. di Muggio (Muret) — M. S. Giorgio, S. Salvatore, Pazzalino (Lenticchia).
   Perigonio porporino-pallido, macchiato di punti porporini — [Mag.—Giug.]

---

[1]) Aggiungere: *A. Dracunculus* L. Scoperta da Mari sui M^ti di Tesserete, luoghi umidi, e da Lenticchia a Oria, pure in luoghi umidi. Ha odore disaggradevole.

[2]) Aggiungere: *Limodorum abortivum* Sw. Gandria (Mari, Lenticchia).

3. **O. variegata** Allion. ped. 2. p. 147 (*O. tridentata* Scop.).
   ♃ Prati di coll. e mont. = Losone — Brione sopra Minusio — Gudo — Carasso — Gorduno, al Galbisio — Camignolo — Vico Morcote — Dintorni di Lugano (Lentiechia) (1).
   Perigonio porporino smunto, macchiato di punti rosso-bruni e spessi — [Mag.—Giug.]
4. **O. ustulata** Lin. sp. 1333.
   ♃ Prati di coll. e mont. = Losone — Tenero — Carasso — Gorduno, al Galbisio — Gudo — Aranno, S. Salvatore, Altanca ecc. (Lentiechia)(2).
   Perig. porporino-fosco, labello bianco, macchiato di punti rossi — [Apr.—Mag.]
5. **O. Coriophora** Lin. sp. 1332.
   ♃ Prati e declivi = Losone — Locarno, saleggio — Carasso, declivi lungo il sentiero che conduce al Galbisio — Arbedo (Satis).
   Perig. porporino, labello punteggiato di macchie fosco-porporine — [Mag.]
6. **O. globosa** Lin. sp. 1332.
   ♃ Prati subalp. e alp.; scende anche al piano = Campo V. M., a Cortenovo — Gordola (3).
   F. porporino — [Mag.—Giug.]
7. **O. Morio** Lin. sp. 1333.
   ♃ Prati = Locarno — V. Maggia — Lugano (Lentiechia).
   Perig. porporino, talvolta roseo o bianco — [Apr.—Mag.]
8. **O. pallens** Lin. mant. 292.
   ♃ Siti selvatici di mont., tra virgulti = M. Generoso (Amoretti)(4).
   F. bianco-gialli — [Apr.—Mag.]
9. **O. mascula** Lin. sp. 1333.
   ♃ Prati e dumi di coll. = Luganese — Mendrisiotto — Chiasso e Pontegana (Mari).
10. **O. laxiflora** Lam. Fl. fr. 3. p. 504.
   ♃ Prati paludosi = Tra Chiasso e Balerna, freq. — Arona, presso S. Carlo.
   F. porporino — [Mag.]
11. **O. sambucina** Lin. sp. 1334.
   ♃ Selve e prati di coll. e mont. e anche al fondo delle valli = Locarno, al saleggio, rara — Maggia — Cevio — Bignasco, M. del Cantone — Casima sopra Mendrisio e in altri luoghi del Generoso.
   F. ocroleuco. — [Mag.—Giug.]
   β. purpurea Koch (*O. incarnata* Willd. sp. 4. 30). — Cevio — Bignasco — Casima (Lentiechia).

---

(1) È freq. tanto in coll. che in mont., come ai prati di Soldino, di Besso, nella valletta di Ponte Cassarina, al Molino Nuovo, al S. Salvatore ecc.

(2) Al S. Salvatore, sopra Ciona, l'ibrido *ustulata* × *tridentata* (Scoperto da Jäggi e Schröter 1888 e 1890 [3 esemplari]).

(3) Bosco V. M.

(4) Sagno (Erb. Lentiechia).

12. **O. maculata** Lin. sp. 1335.
    ♃ Selve e prati umidi — Losone, prati — Bignasco — Cadenazzo [1].
    F. lilacini macchiati di linee e punti porporini — [Mag. — Ging.]
13. **O. latifolia** Lin. sp. 1334.
    ♃ Prati specialmente umidi [2].
    F. porporino — [Mag. — Ging.]
14. **O. angustifolia** Wimm. et Grab. Fl. sil. 2. p. 252 (*O. incarnata* Lin. secund. Fries.).
    ♃ Prati paludosi — M. Ceneri, presso la Caserma [3].
    F. chiaro-porporini — [Mag. — Ging.]
15. **O. pyramidalis** Lin. sp. 1332 (*Anacamptis pyramidalis* Richard.).
    ♃ Prati, colli, dumi — Luganese — Mendrisiotto.
    F. porporini — [Mag. — Lug.]

Gymnadenia.

1. **G. conopea** R. Brown. (*Orchis conopea* Lin. sp. 1335).
    ♃ Prati delle valli e mont., freq^{te} — Maggia — M^{ti} di Someo — Olivone — Brugnasco (Lenticchia).
    F. porporino — [Ging. — Lug.]
2. **G. odoratissima** Richard. mém. du Mus. d' hist. nat. 4. p. 35 (*O. odoratissima* Lin.).
    ♃ Prati della reg. subalp. e alp. = Maggia — M^{ti} di Someo — Campo V. Maggia [4].
    F. porporini, rosei e talvolta bianchi, odoratissimi — [Ging. — Lug.]
3. **G. albida** Scop. carn. ed. 2. v. 2. p. 201 (*Peristylus albidus* Lindley = *Habenaria albida* R. Br. = *Coeloglossum albidum* Hartm.).
    ♃ Luoghi erbosi della reg. alpina e subalp., di rado nella montana — M. Generoso, Pizzo de' Termini (1350 m.) — S. Bernardino (1300 m.).
    F. bianco-verdognoli — [Ging. — Ag.]

Habenaria.

1. **H. viridis** R. Br. prodr. fl. nov. Holland. p. 312 (*Coeloglossum viride* Hartm. = *Peristylus viridis* Lindley = *Platanthera viridis* Lindl. = *Habenaria viridis* R. Br.).
    ♃ Prati umidi, ascende alle alpi = M. Ceneri, presso il varco (580 m.) — S. Bernardino (1350 m.) — Lucomagno — Sopra Faido (Brgg.).
    F. verdi — [Ging. — Lug.]

(1) Comune nei dintorni di Lugano, come nella Valletta del Tazzino, Molino Nuovo, S. Salvatore, Breganzona.
(2) V. Piora (Rhiner).
(3) Casaccia (Brügger in Rhiner).
(4) M. S. Giorgio, sopra Brusino — M. Generoso, sopra Rovio.

Platanthera.

1. **P. bifolia** Richb. (*O. bifolia* Lin. sp. 2. 1331).
   ♃ Selve = Orselina — Bignasco, al M. del Cantone — M. Caslano — Mendrisio — M. Bisbino (1).
   F. bianco-odoroso — [Ging.—Lug.]

Nigritella.

1. **N. angustifolia** Richard. de orchid. annot. p. 19.
   ♃ Pascoli alp. e subalp. = Campo V. M., a Cortenovo — Alpi di Bosco V. M. — Campo alla Torba — Naret — Alpi di Piora — S. Gottardo — Lucomagno — S. Bernardino — M. Generoso (2).
   F. porporino-scuro, d' odore di vaniglia — [Ging.—Ag.]
2. **N. suaveolens** Koch (3).
   ♃ Alpi di Casaccia sul Lucomagno.
   F. d' un bel porporino, odoratissimi — [Lug.—Ag.]

Ophrys. (4)

1. **O. aranifera** Hudson. Fl. angl. ed. 1. p. 340.
   ♃ Colli o monti calcari = Morbio Superiore — Arona, rupi della Rocca — Pontegana (5).
   F. giallognolo, macchiato di porporino nel labello — [Mag.]
2. **O. arachnites** Richard. (*O. fuciflora* Rchb.).
   ♃ Colline calcari = Vacallo, presso la Breggia — Arona, alla Rocca.
   F. giallo-verdognolo, labello scuro porporino con macchie gialle alla base — [Ging.] (6)

Chamæorchis.

1. **C. alpina** Richard de orchid. annot. p. 19.
   ♃ Pascoli delle alpi più elevate = S. Bernardino, A. di Vignone (1700 m. circa) — Lucomagno, sopra il luogo detto la *Farina*.
   F. giallo-verde — [Lug.]

---

(1) Sagno — Breganzona, nel bosco — Faido, nel bosco presso la Piumogna.
(2) M. Bolia, Camoghè.
(3) Ibrido, *Gymnadenia odoratissima* × *Nigritella angustifolia*.
(4) Aggiungere: *Ophrys muscifera* Huds. (*O. myodes* Jacq.) — Castello — Morbio (Mari) — Salvatore (Jäggi e Schröter).
Ophrys apifera Huds. — Morbio inf. e Morbio sup.
(5) Freq^te al S. Salvatore, Chiasso e al S. Giorgio. A Riva S. Vitale il volgo lo chiama *fiur musca*. Si trova anche nei dintorni di Lugano, come al Molino Nuovo nei boschi sotto Rovello.
(6) A Gandria, lungo la strada presso il paese — S. Salvatore.

Herminium.

1. **H. Monorchis** R. Brow. hort. kew. 5. p. 191.
   ♃ Prati umidi = Arcegno — M. Ceneri — S. Bernardino (1200 m.) — Generoso (Mari).
   F. verde-giallognolo — [Giug.—Lug.]

Serapias.

1. **S. longipetala** Pollin. (*S. Lingua* Bert., Gaud., *S. cordigera* Heg. et Heer).
   Volg. *Golescion* (a Coglio).
   ♃ Declivi erbosi — Locarno, a S. Biagio — Orselina — Mappo, riva del lago sotto la strada — Vico Morcote — Tra le Fornasette ed il ponte di Cremenaga — Luganese (1) (Lentiechia, Mari) — Mendrisio (Mari).
   F. porporino, labello alla base peloso — [Mag.—Giug.]

Cephalanthera. (2)

1. **C. ensifolia** Richard. de orchid. annot. p. 21 (*Xiphophyllum* Rchb.).
   ♃ Selve, dumi — S. Salvatore (Lentiechia) — Sotto Tremona (3).
   F. bianco, talvolta macchiato di giallo alla base, odoroso — [Mag.]

Epipactis. (4)

1. **E. latifolia** All. fl. ped. p. 151 (*Serapias latifolia* L.).
   ♃ Selve, dumi.
   F. verdognoli, labello lilà — [Giug.—Ag.]
2. **E. rubiginosa** Koch. Syn. Fl. germ. ed. 2. p. 801 (*E. latifolia* L. *β. rubiginosa* Gaud. = *E. atrorubens* Schmidt).
   ♃ Selve e dumi; fino alla reg. subalp. = S. Salvatore — Nante, presso Airolo (5).
   F. violetto-sporco — [Giugno]

Listera.

1. **L. ovata** R. Brow. hort. kew. ed. 3. p. 201.
   ♃ Prati e selve di mont. = Orselina, al Lauro — Brione sopra Minusio — M. Caslano (6).
   F. verde — [Mag.—Giug.]

---

(1) Come al Molino Nuovo, alla Valletta del Tazzino.
(2) Aggiungere *C. rubra* Rich. — Generoso (Mari) — Airolo (Erb. Lic. Lug.) — S. Giorgio (Lent.).
(3) M. Brè, Gandria, Generoso.
(4) Aggiungere: *Epipactis palustris* Crantz. — Presso il laghetto di Chiasso (Mari).
(5) M. S. Giorgio, sopra Brusino.
(6) Vallette umide e ombrose presso Lugano, come nella valletta di Ponte Cassarina, in quella del Tazzino, al Molino Nuovo.

Neottia.

1. **N. Nidus avis** Richard.
   ♃ Sotto gli alberi nelle selve ombrose di mont. e delle valli = Tenero, al Salciolo — V. di Trodo, tra Quartino e Cortenovo (a circa 650 m.) (1).
   Pianta senza foglie, bruno-chiara — [Mag.—Giug.]

Spiranthus.

1. **S. æstivalis** Richard.
   ♃ Prati umidi, spongiosi = Tra Ponte Brolla e Arcegno — Tra Losone e Ronco, al varco — Arona, prati riva del lago (2).
   F. bianco — [Lug.—Ag.]
2. **S. autumnalis** Richard.
   ♃ Declivi, prati umidi = Locarno, al Tazzino e al Belvedere — Mappo — Scairolo (Lentiecchia).
   F. bianco, odoroso — [Ag.—Ott.]

Fam. Irideae.

Crocus.

1. **C. vernus** All. ped. n. 309.
   ♃ Prati; dal piano alle alpi = Locarno — Tenero — Losone — Cevio — Bellinzona — Campo V. M. — Luganese, p. es. nella valletta del Tazzino, prati presso Sorengo, Crespera ecc. (Lentiecchia).
   F. bianco o violetto chiaro — [Mar.—Mag.]

Gladiolus.

1. **G. segetum** Gawler. bot. mag. 719 (*G. communis* Sibth.).
   Volg. *Rosalin.*
   ♃ Campi, cresce in cespugli = Campagne di Locarno presso Solduno — Lugano (Gremli).
   F. roseo con segni bianchi, a foggia di un *a*, sui tepali inferiori.
   [Mag.]
2. **G. imbricatus** L. sp. 52.
   ♃ M. S. Giorgio, dumeti sopra la Cascina di Meride — M. Generoso, sopra Melano (in Gremli, leg. Muret, Favrat).
   [Lug.]
3. **G. palustris** Gaud.
   ♃ Prati torbosi fra Contra e Mergoscia. Cresce solitario e non fa cespuglio.
   [Giug.]

(1) Sagno, nei boschi.
(2) M. Ceneri (Brügger in Rhiner).

Iris.

1. **I. germanica** Lin. sp. 55.
   Ital. *Giaggiolo, Giglio paronazzo.* — Tic. *Gili selvadegh.*
   ♃ Colli aprichi — Colli d' Ascona — Locarno al Tazzino, S. Biagio, Belvedere, M^di della Trinità [1].
   F. violacei-scuri, odorosi — [Mag.]
2. **I. Pseud-Acorus** Lin. sp. 56.
   Ital. *Acoro, Giglio giallo, Iride gialla, Erba spada.* Loc. *Spad.*
   ♃ Paludi, ruscelli, fossi — Piano di Magadino — Tenero, al Salciolo.
   F. giallo — [Mag.— Giug.]
3. **I. graminea** Lin. sp. 58.
   ♃ Declivi erbosi — M. S. Giorgio — M. Generoso (Gremli) [2].
   F. violacco — [Mag.—Giug.]

Fam. Amaryllideae.

Narcissus.

1. **N. poeticus** Lin. sp. 414.
   Ital. *Narcisso.* — Loc. *Arcis;* Lug. *Narcis.*
   ♃ Prati massime uliginosi — M. Ceneri — Bironico — Loverciano — Mendrisio — Intragna [3].
   F. odoroso, bianco, corona gialla, marginata di cinabro — [Mag.—Giug.]
   Il fiore è una peste de' prati e indica uliginosità.
2. **N. biflorus** Curt. mag. t. 197.
   Ital. *Narcisso.* — Loc. *Arcis.*
   ♃ Declivi — Locarno, al Tazzino, S. Biagio, verso Brione, Orselina; freq. — M. S. Giorgio (Lentiechia).
   Perig. bianchiccio, corona giallognola, marginata leggermente di bianco — [Apr.—Mag.]
3. **N. Pseudo-Narcissus** Lin. sp. 414.
   Ital. *Narcisso.* — Tic. *Trombon;* Lug. *Narcis gialdi.*

---

[1] Mendrisio, Castagnola, Moncucco, nelle vigne.

[2] Ligornetto, nei prati.

[3] Tutt' altro che subspontaneo, come scrive Gremli (ed. fr. 1886, p. 100). È invece sparso in copia tale, che, verso la fine di Aprile, le pendici del S. Salvatore, del Brè e del Bolia e i prati umidi dei dintorni di Lugano, ne sono riccamente smaltati. A Lugano questo fiore è conosciuto volgarmente col nome di *Ciich* — Cresce anche a Ponte Tresa e al Generoso. È sicuramente il *N. poeticus*, e non il *radiflorus*, come crede il Favrat — Quest' ultima specie si trova pure, ma raramente, p. es. nei prati di Besso e al Paradiso.

♃ Declivi erbosi = Colli d' Ascona — Minusio, al Ronco grande (1) — Coltivasi a fior pieno nei giardini.

Perig. e corona gialli di odore ingrato — [Feb.—Apr.]

?4. **N. incomparabilis** Curt. (2).

Locarno alle Fracce, Ronco Rusca (1865 Marzo 23).

5. **N. Jonquilla** Lin. sp. 1. p. 417.

Ital. *Giunchiglia scempia e doppia.* — Loc. *Giunchiglia.*

♃ Coltivato in quasi tutti i giardini e quasi spontaneo ne' vigneti = Ronco d' Ascona.

Perig. dorato, d' odore soave — [Apr.—Mag.]

Leucoium.

1. **L. verum** Lin. sp. 414.

Loc. *Ciocchit.* — Lug. *Campanei biane.*

♃ Boschi o prati umidi del piano; freq. = Locarno, al Saleggio — Tenero, al Salciolo — Ascona e Losone, prati (3).

F. bianco coi tepali macchiati di verde alla cima — [Feb.—Mar.]

Galanthus.

1. **G. nivalis** Lin. sp. 413.

Ital. *Bucaneve.* — Loc. *Ciocchit.*

♃ Prati, boschi = Melano — Mendrisio, cantine — Rovio (4).

Perig. bianco, segnato esternamente da macchie semilunari verdi e internamente da 8 linee pure verdi — [Mar. e principio d' Aprile.]

Fam. Asparageae.

Asparagus.

1. **A. officinalis** Lin. sp. 448. excl. var. *α* e *β*.

Ital. *Asparago, Sparagio.* — Tic. *Sparg.*

♃ Coltivato da Faido in giù fino al lago e in quasi tutto il Luganese e Mendrisiotto. Trovasi transfugo nel fondo della V. del Ticino, come ne' prati presso Poleggio, Bellinzona, Gudo e nel Luganese (Lenticchia).

F. verde-giallognolo — [Giug.—Lug.] — Bacca rossa.

---

(1) Comune nel Luganese, come nei prati di Ponte Cassarina, Sorengo ecc. Allo stato selvatico il fiore si presenta sovente doppio.

(2) C' è il *N. Pseudo-Narcissus* × *poeticus.*

(3) Abbondante nei dintorni di Lugano, come nella valletta del Tazzino e prati circostanti, nei prati di Vezia lungo il Cassarate ecc.

(4) Tra Riva S. Vitale e Rancate, nei prati.

2. **A. tenuifolius** Lam. Enc. 1. p. 291.
♃ Rovio, prati vicino al fonte della Sovaglia — Gandria — M. S. Giorgio.
F. bianco-verdognoli — [Mag.—Giug.]

Streptopus.

1. **S. amplexifolius** DC. Fl. fr. 3. p. 174 (*Uvularia amplexifolia* Lin. sp. 1. p. 436).
Ital. *Uvularia appennina.* — Volg. *Nau, Naur* (Campo V. M.).
♃ Selve alp. e subalp., donde scende quasi fino al piano delle valli = Campo V. M. — Bosco V. M. (Lent.) — Fusio (Schröter) — Cadenazzo — Vira Gambaragno, quasi in riva al lago — M. Tamar, alla Vadlina — M. Generoso (Comolli).
F. bianco — [Giug.—Lug.] — Bacca rossa.
I contadini di Campo infondono le bacche nell'olio, che reputano poi valido rimedio in varie malattie.

Paris.

1. **P. quadrifolia** Lin. sp. 527.
♃ Boschi ombrosi = Tenero, presso la cartiera della Verzasca — Broglio, sul M. Dosso — Fusio — M. S. Giorgio, tra dumi alla vetta [1]).
F. verde, stimmi ed ovario fosco-porporini — [Mag.—Giug.]
Velenosa.

Convallaria.

1. **C. verticillata** Lin. sp. 451 (*Polygonatum verticillatum* All.).
♃ Selve, dumi della reg. mont. e subalp. = Campo V. M. verso Cimalmotto — Da Bosco V. M. all'alpe — Salita a Fusio (una var. a foglie più anguste e fiori più piccoli) — M. Tamar, pascoli della Vadlina, fra le drose (*alnus viridis*) [2]).
F. bianco — [Giug.—Lug.] — Bacca rossa.
2. **C. polygonatum** Lin. sp. 451 (*Polygonatum officinale* All.).
Ital. *Sigillo di Salomone.*
♃ Selve rocciose di coll. e mont. = Bignasco, M^to del Cantone — V. Bavona — Broglio — V. Peccia, presso il Piano [3]).
F. bianco, alla cima verde — [Mag.—Giug.] — Bacca violacea.
3. **C. multiflora** L. sp. 432 (*Polygonatum multiflorum* All.).
Ital. *Sigillo di Salomone.*
♃ Selve umide = Locarno, saleggio — Tenero, rive della Verzasca — Lugano, nella valletta del Tazzino (Lentiechia).
F. bianco — [Mag.] — Bacca violacea.

---

[1]) Molino Nuovo presso Lugano, nelle boscaglie — Sotto Nante.
[2]) Freq. nei prati sotto Nante.
[3]) Nel Luganese, p. es. nella valletta del Tazzino, al Molino Nuovo; è meno freq. della *C. multiflora.* Trovasi anche a Nante presso Airolo.

4. **C. maialis** Lin. sp. 441.

Ital. *Mughetto, Giglio delle convalli* — Tic. *Munighin, Munighell.* — Lug. *Müghett.*

♃ Selve; dal piano al monte = Losone, in riva alla Maggia, prati, fra cespugli — Bignasco, M. del Cantone — M^ti di Cragno sopra Mendrisio (1).

F. bianco, d'odore soave — [Mag.—Giug.] — Bacca rossa.

Majanthemum.

1. **M. bifolium** DC. Fl. fr. 3. p. 177 (*Smilacina bifolia* Desf., *Convallaria bifolia* L.).

♃ Selve, pascoli; dal piano alla reg. alp. = S. Bernardino, presso al villaggio — M. Camoghè, dall' A. della Valletta fino a quella di Lavena — M. Tamar, da Piassogna all' A. di Neggio — Tenero, alla cartiera (2).

F. bianco di soave odore quasi di limone o di fior d' arancio — [Mag.—Giug.] — Bacca rossa.

Qua e là s' incontra qualche pianta con tre foglie (Camoghè nel bosco di Pezzo Rotto [Pesciarott]).

Ruscus.

1. **R. aculeatus** Lin. sp. 1474.

Ital. *Pugnitopo, Sprunneggio.* — Tic. *Pungia ratt.*

♄ Siepi, selve, dirupi = Locarno, valletta della Ramogna — Lugano, al piè del S. Salvatore (3) — Mendrisio, sopra Salorino verso Cragno — V. di Muggio — M. Ceneri (Schröter) — Misocco (Brgg.).

F. verdognolo, tendente al violaceo — [Mar.—Apr.] — Bacca rossa.

È la pianta adoperata dagli spazzacammini.

Fam. Dioscoreae.

Tamus.

1. **T. communis** Lin. sp. 1458.

♃ Siepi, dumi, luoghi ombrosi = Locarno, al Belvedere — Declivi sopra Solduno — Arcegno — Luganese, comune (Lenticchia) (4).

F. verdognolo — [Mar.—Apr.] — Bacca rossa.

2. **T. creticus** Lin. (5).

♃ Dumi, luoghi aprichi = Declivi sopra le Vettagne tra Solduno e Ponte Brolla.

F. verdognolo — [Mag.—Giug.] — Bacca rossa.

---

(1) Sopra Rovio, boschi — Breganzona, in un praticello sopra la valle — Nante.

(2) Comune nei colli del Luganese, come a Piano Soldino, nella valletta del Tazzino, a Piano Soldino, Breganzona, Molino Nuovo ecc., nei M^ti della V. Colla, Generoso dintorni di Airolo.

(3) A Gandria, in cespugli sopra luoghi rocciosi.

(4) Piante femminili nella Valletta del Tazzino, Gandria, Molino Nuovo. Individui maschi nelle siepi lungo la strada presso Piano Soldino.

(5) Da considerarsi come v. del *Tamus communis* L., da cui differisce per le foglie trilobe.

Fam. Liliaceae.

Tulipa.

1. **T. Gesneriana** Lin. sp. 438.
   Ital. *Tulipano.* — Tic. *Tulipan.*
   ♃ Coltivata di frequente e in molte varietà ne' giardini.
   F. dai più brillanti colori — [Mar.—Apr.]
?2. **T. sylvestris** Lin. sp. 438.
   ♃ Prati di Chiggiogna, sotto la strada (veduta dal M. R. P. Agostino, Guardiano della Mad. del Sasso).
   F. giallo — [Mag.—Giug.]
3. **T. Clusii** Lin.
   Coltivata.
   F. in Aprile.

Fritillaria.

1. **F. imperialis** Lin.
   Ital. *Corona imperiale.*
   Coltivata di rado (Bellinzona).
   F. Apr.—Mag.

Lilium.

1. **L. bulbiferum** L. sp. 433.
   Ital. *Giglio.* — Tic. *Gil ros.*
   ♃ Selve e rupi delle coll. fino alla reg. alp. = Tra Moscia ed Ascona, rupi quasi in riva al lago — Tra Losone e Ronco d' Ascona, freq. — Locarno, rupi sotto la Mad. Sasso — Giumaglio — Bignasco, M^te del Cantone — S. Gottardo, rupi tra Airolo e la V. Tremola — Tra Maccagno e Luvino (¹).
   F. crocco con macchie fosco porporine — [Giug.]
2. **L. Martagon** Lin. sp. 435.
   Ital. *Martagone.* — Tic. *Gili de Montagna.*
   ♃ Boschi, rive; dal piano alla reg. subalp. = Tenero — Bignasco — Campo V. M. — S. Bernardino — Scudellate e sopra Rovio al Generoso — Gandria e M^ti sopra Cimadera (Lentiechia).
   F. violaceo chiaro, sparso di piccole macchie rosso-porporine — [Giug.—Lug.]
3. **L. candidum** Lin.
   Ital. *Giglio.* — Loc. *Gili de S. Antoni.*
   ♃ Coltivato freq. ne' giardini per la bellezza e profumo de' suoi fiori candidi. [Giug.]

(¹) Quello che si trova a Gandria, sotto Altanca e in altri luoghi del Cantone non è *L. bulbiferum* L., ma una v. di questo, *L. croceum* Chalx., che non porta bulbilli.

Lloydia.

1. **L. serotina Salisb.** (*Anthericum serotinum* L. sp. 444).
   ♃ Luoghi rupestri, aprichi delle alpi = Forca di Bosco, al varco — Naret (Erb. Lic. Lug.) — Sopra Faido (Brgg.) (1).
   F. bianco, tepali segnati da 3 righe rossigne, unghie giallognole.
   [Lug.—Ag.]

Erythronium.

1. **E. Dens canis** Lin. sp. 437.
   ♃ Selve di coll.; raro = Colli di Stabio, al Gaggiolo — Arona, tra la Rocca e S. Carlo.
   F. rosco — [Mar.—Apr.]

Asphodelus.

1. **A. albus** Mill. dict. n. 3.
   ♃ Reg. mont. = Scudellate, prati ascendendo al Generoso.
   F. bianco — [Mag.—Giug.]
   Se ne danno esemplari a cauli ramosi.

Anthericum.

1. **A. Liliago** Lin. sp. 445 (*Phalangium Liliago* Poir).
   ♃ Selve, luoghi rupestri, erbosi = Locarno, al Belvedere — Orselina — Piazzogna — Castagnola (Lenticchia) (2).
   F. bianco — [Mag.—Giug.]
2. **A. ramosum** Lin. sp. 445 (*Phalangium ramosum* Poir).
   ♃ Luoghi rupestri = Lugano, piè del S. Salvatore — M. S. Giorgio.
   F. bianco — [Giug.—Lug.]

Paradisia.

1. **P. Liliastrum** Bertolon. (*Czackia*, *Anthericum Liliastrum* Lin. sp. 445).
   Tic. *Gili di praa.*
   ♃ Prati e declivi erbosi della reg. mont. e subalp. = Maggia — Bignasco — Fusio (smalta i prati in Giugno) — S. Bernardino, al Campo de' fiori, freq^{mo} — M^{ti} della V. Cannobina, sopra Guro, freq^{mo} — M. Generoso (Mari) (3).
   F. candido, odoroso — [Mag.—Lug.]

---

(1) Pizzo Vigera (Rhiner).

(2) In abbondanza sul piede del S. Salvatore, tra Melide e S. Martino (Lent.) — Agno (Zollikofer) — Airolo (Brüg. in Rhiner).

(3) Predalp (Brüg. in Rhiner) — Soazza (Brüg.) — Freq. nei prati a Nante, Brugnasco, Altanca (Lenticchia).

Ornithogalum.

1. **O. pyrenaicum** Lin.
   ♃ S. Nazzaro Gambarogno, lungo la strada — Pianezzo, tra le vigne e i campi — Canobbio sul lago Maggiore (P. Daldini) — Cassone presso Brè e lungo il Cassarate (Lenticchia) — Pazzallo (Jäggi e Schröter).
   F. solforini, segnati da una linea verde nel dorso — [Mag.—Giug.]
2. **O. umbellatum** Lin. sp. 441.
   ♃ Campi, prati, strade = Locarno, Lugano ecc., freq^{mo}.
   F. latteo, i tepali a tergo verdi — [Apr.—Mag.]
   Peste dei campi.

Gagea. (1)

1. **G. arvensis** Schult. syst. veget. 7. p. 547.
   ♃ Tenero, campi di Mendrisio.
   F. giallo, tepali a tergo verdognoli — [Mar.—Apr.]
2. **G. minima** Schult. l. c. p. 539.
   ♃ Luoghi rupestri delle A. = Forca di Bosco, al varco.
   F. giallo, tepali a tergo verdognoli — [Lug.—Ag.]
3. **G. lutea** Schult. l. c. (*Ornithogalum sylvaticum* Pers.).
   ♃ Boschi, siepi = Lugano, presso Morchino — Losone, campi e dumi sotto la chiesa — S. Giorgio — Lungo la strada d' Intragna.
   F. giallo — [Mar.—Apr.]

Scilla.

1. **S. bifolia** Lin. sp. 443.
   ♃ Prati, boschi, rive delle rogge e dei torrenti = Losone, prati — S. Nazzaro Gambarogno — Malcantone e Luganese (2) (Lenticchia).
   F. ceruleo — [Mar.—Apr.]

Allium. (3)

1. **A. ursinum** Lin. sp. 431.
   Volg. *Strozzagallin* (Mendr.).
   ♃ Selve, prati, luoghi umidi = Mendrisio, valletta del Nebbiano sotto alla Torre — Chiasso — Balerna — Cavergno, prati presso la chiesa parocchiale.
   F. bianco — [Apr.—Mag.]

---

(1) Aggiungere: *G. Liottardi* Schult. — Manigorio sopra Airolo (Heer).

(2) Nella valletta tra la stazione e Massagno, al dissotto del ponte.

(3) Aggiungere: *A. oleraceum* L. Generoso (Mari). — *A. sphærocephalum* L. Sopra Airolo (Brüg. in Rhiner) — S. Salvatore (Lent.) — Solduno (Käser).

2. **A. fallax** Don. monogr. all. p. 61 (*A. montanum* Schmidt. = *A. serotinum* Schl.).
   ♃ Rupi = M. S. Salvatore, fra le brecce calcaree presso S. Martino — M. Generoso (Mari) — V. Blenio (Erb. Lic. Lug.) (1).
   F. roseo — [Ag.—Sett.]
3. **A. acutangulum** Schrad. sam. hort. gött. 1808 (*A. angulosum* Pollich. e maggior parte degli autori).
   ♃ Prati umidi, torbosi = Locarno, verso Ponte Brolla — Da Avegno a Gordevio — Tra Giumaglio e Someo.
   F. roseo-pallido — [Lug.—Ag.]
4. **A. sativum** Lin. sp. 425.
   Ital. *Aglio.* — Tic. *Ai.*
   Coltivato per uso di cucina.
   F. bianco-sporco — [Lug.—Ag.]
5. **A. Porrum** Lin. sp. 223.
   Ital. *Porro.* — Tic. *Porr.*
   ⊙ o ♃ Coltivato comunemente ad uso di cucina.
   F. porporino — [Lug.—Ag.]
6. **A. vineale** Lin. sp. 428.
   Loc. *Ai.*
   ♃ Luoghi coltivati = Locarno, tra S. Biagio e la Canovascia.
   F. porporini — [Giug.—Lug.]
7. **A. paniculatum** Gaud. non Lin. (*A. pulchellum* Don.).
   ♃ Colli aprichi = Tra Obino e Monte nel Mendrisiotto — M. S. Giorgio, presso la Cascina — Piede S. Salvatore (2).
   F. porporino-chiaro — Lug.—Ag.]
8. **A. Schœnoprasum** Lin. sp. 432.
   ♃ Tra Solduno e Ponte Brolla, rupi — V. di Peccia, presso il Piano, prati (*β. alpinum*) — S. Gottardo (Erb. Lic. Lug.).
   F. roseo — [Lug.—Ag.]
   Se ne coltiva una var. per uso di cucina sotto il nome di *Ajeu* (Loc.) e di *Centarrost* (Bellinz.).
9. **A. Cepa** Lin. sp. 431.
   Ital. *Cipolla.* — Tic. *Scigola, Scigoll.*
   ♃ Coltivato in tutti i giardini ad uso di cucina.
   F. bianco — [Giug.—Lug.]
   Ad Ascona e Brissago se ne fa commercio.

---

(1) Rive della Maggia a Maggia (Lent.) — Sopra Airolo — Sotto Bodio — Taverne (Rhiner) — Camoghè (Heer).

(2) Sopra Rovio verso la cima del Generoso (Favrat) — Tra Aldesago e Brè (Lent.) — Gandria (Schröter).

Hemerocallis.

1. **H. fulva** Lin. sp. 462.
   ♃ Rupi apriche = Locarno, al Sasso, alle Fraccie (forse soltanto inselvatichito). Freq^te in giardini.
   F. fulvo — [Lug.—Ag.]

Endymion.

1. **E. nutans** Dumort. Florul. belg. p. 140, 1827.
   ♃ Coltivato nei giardini (Locarno).
   F. ceruleo — [Mag.]

Muscari. (1)

1. **M. comosum** Mill. dict. n. 2 (*Hyacinthus comosus* L.).
   ♃ Campi, vigne; freq^mo = Locarno, a S. Biagio, Tazzino (2).
   F. ferruginei scuri, i super. amefistini — [Apr.—Mag.]

Fam. Bromeliaceae.

Agave.

1. **A. americana** Lin. sp. 461.
   Ital. *Aloe.*
   ♃ Originaria dall' America, ora inselvatichita negli scogli di Gandria, dove raramente fiorisce (presso il popolo dicesi non fiorisca che ogni 100 anni), ed anche su quelli delle Isole Borromee, dove se ne vede qualche esemplare in fiore quasi tutti gli anni. Da noi di freq. coltivata per ornamento (3).
   F. giallo-verdognoli — [Ging.—Lug.]
   È noto come questa pianta mandi in 20—30 giorni un fusto da 6—7 m., che si copre di fiori. Tagliando questo fusto al primo suo germogliare se ne ottiene un liquido (*Pulque*) abbondante, che è una bibita aidula, rinfrescante, assai gradita, sebbene di odore ributtante (di carogne). Dalle foglie se ne ottiene anche un filo, che serve a vari usi.

Fam. Colchicaceae.

Colchicum.

1. **C. autumnale** Lin sp. 485.
   Ital. *Zafferano selvatico.*

---

(1) Aggiungere: *M. racemosum* DC. — Locarno (Franzoni in Herb. Helv.): *M. botryoides* DC. — Chiasso (Mari).

(2) Nel Luganese assai freq.

(3) A Gandria è assolutamente spontanea sopra quegli alti e inaccessibili scogli, come su quelli di Roccabella presso Locarno, dove l' anno scorso (1889) un esemplare presentava una magnifica fioritura.

♃ Prati umidi del piano e monti = Mappo, quasi in riva al lago Maggiore — Arbedo presso Bellinzona — Olivone — Tra Capolago e Riva S. Vitale (1).

F. rosei — [Sett.—Ott.] — Mette le foglie e i frutti nella primavera susseguente.

Bulbo, foglie, frutto velenosi ed hanno proprietà speciali nelle artriti. I maiali ed i bovini, che ne mangiano, si ammalano e spesso muoiono. — La pianta si dovrebbe sradicare, come s' usa in Germania, dove si fa uso di un ferro espressamente preparato per estirparne il bulbo (Oberländ. No. 95. 8. Ag. 1858).

2. **C. alpinum** DC. Fl. fr. 3. p. 195.

♃ Prati delle convalli alp. e subalp. = Campo V. M.

F. rosei, subito dopo lo squagliarsi delle nevi in Apr. e Mag.; rifiorisce, dopo tagliati i fieni, in Ag.—Sett. Mette le foglie dopo la fioritura e fruttifica nello stesso anno.

Bulbo velenoso, così le foglie ed i semi.

Veratrum.

1. **V. nigrum** Lin. sp. 1479.

Elleboro dei contadini.

♃ Reg. mont. = A. di Melano sul M. Generoso — M. S. Giorgio, comunissima dal piano dei Pozzi alla vetta e freq. in cespugli sotto la vetta scendendo sopra Brusino Arsizio.

F. atroporporino — [Lug.—Ag.]

Quest' erba è velenosa; fresca produce gravi dolori colici al bestiame e viene reietta dal fieno secco, che fa marcire a cagione de' suoi grossi fusti, che, stentando a disseccare, ammuffiscono.

2. **V. album** Lin. sp. 1479.

Elleboro dei contadini e degli erbolai. — *Valeder* (a Fusio).

♃ Prati subalp. ed alp., da cui scende fino al piano delle valli = Campo V. M. — M. Tamar fino al Campo — Vira Gambarogno, quasi in riva al lago Maggiore — Sendellate sul M. Generoso (2).

F. internamente bianchi, esternamente verdi — [Giug.—Ag.]

var. *Lobelianum* Bernh. (3) — Fiori intieramente verdi-chiari.

♃ Qua e là col precedente — F. verde-pallido — [Giug.—Ag.]

Velenoso.

---

(1) Prati uliginosi presso il laghetto di Muzzano e Agnuzzo.

(2) A. grande di Bosco V. M.

(3) Questa v. sostituisce generalmente la specie, come al Generoso sopra Rovio (1000 m.), a Sagno, al M. Bolia, a Nante, Airolo, Altanca, ne' cui prati è abbastanza freq.

Tofieldia.

1. **T. calyculata** Wahlemb. helv. p. 68.
   ♃ Prati paludosi, dal piano alle alpi = S. Bernardino — Naret, al lago — Tra Arcegno e Ronco d' Ascona, piano de' Mulini — Bellinzona, valletta sopra Daro.
   β. *glacialis* Gaud. All' Erta in V. di Peccia presso la cascata di Frodalto — Manigorio sopra Airolo (Heer).

2. **T. borealis** Wahlemb. Fl. lapp. p. 89. 1812 (*T. palustris* Huds.).
   ♃ Pascoli uliginosi delle alpi più elevate = Forca di Bosco, lungo un rigagnolo — A. di Piora — M. Albula.
   [Lug.—Ag.]

Fam. Juncaceae.

Juncus.

1. **J. Jacquini** Lin. mant. 63.
   ♃ Alpi più elevate = A. di Bosco — Naret — S. Gottardo, al ponte di *Rudunt* — S. Bernardino — Lucomagno — A. di Piora (in copia insieme alla *Statice alpina*) — Casaccia — Misocco.
   [Lug.—Ag.]

2. **J. conglomeratus** Lin. sp. 464.
   ♃ Luoghi umidi, paludosi = Da Losone ad Arcegno, strada — Tra Capolago e Mendrisio.
   [Giug.—Lug.]

3. **J. effusus** Lin. sp. 464.
   ♃ Comune ne' fossi = Magadino — Bellinzona — Mendrisio (Lenticchia).

4. **J. glaucus** Ehrhart. Beitr. 6. p. 83 (*J. inflexus* Leers.).
   ♃ Luoghi umidi = Piano di Magadino.
   [Giug.—Ag.]

5. **J. filiformis** Lin. sp. 1. 465.
   ♃ Prati paludosi della reg. alp. e subalp. = M. Lucomagno, all' Acqua calda — S. Gottardo, al laghetto di fianco all' Ospizio — Campo V. M., verso Cimalmotto e verso Cortenuovo — Fusio (Schult.) — A. di Sambucco nella V. Lavizzara — M. Camoghè, al pozzo dell' A. di Poltrinone.
   [Lug.—Ag.]

6. **J. triglumis** Lin. sp. 467.
   ♃ Pascoli umidi alp. = S. Bernardino — S. Gottardo, poco al dissotto della seconda casa di ricovero nella V. Tremola — Fusio (Schult.)
   [Lug.—Ag.]

7. **J. trifidus** Lin. sp. 465.
♃ Fessure rupi delle A. = S. Bernardino — S. Gottardo — Campo V. M. — M. Camoghè — A. di Piora.
[Lug.—Ag.]

8. **J. Hostii** Tausch. bot. Ztg. 17. 2. 518.
♃ Luoghi umidi delle A. = A. di Piora, nella discesa — Grigna.
[Lug.—Ag.]

9. **J. capitatus** Weigel. obs. bot. p. 30. 1773.
♃ Luoghi umidi, torbiere = Torbiere di Marcurago presso Arona.
[Lug.—Ag.]

10. **J. obtusiflorus** Ehrh. Beitr. 6. p. 83.
♃ Fossi, stagni.
[Lug.—Ag.]

11. **J. sylvaticus** Reichard. fl. Moeno-Francof. 2. p. 181. 1778 (*J. acutiflorus* Ehrh.).
♃ Fossi e luoghi paludosi = M. Tamar[1].
[Lug.—Ag.]

12. **J. lamprocarpus** Ehrh. giam. p. 126.
♃ Fossi, luoghi umidi = Locarno — Mendrisio.
β. fluitans Koch. M. Ceneri, ruscelli.
[Lug.—Ag.]

13. **J. supinus** Moench. enum. pl. hass. n. 296. t. 5. 1777.
♃ Luoghi umidi = Tra Cavigliano e Auressio — Tra Giumaglio e Someo — M. Ceneri — Bironico.
[Lug.—Ag.]

14. **J. alpinus** Vill. Delph. 2. p. 233.
♃ Dalle alpi al piano = Campo V. M. — Locarno, al Saleggio.
[Lug.—Ag.]

15. **J. squarrosus** Lin. sp. 465.
♃ Prati torbosi = S. Gottardo, a *Reduut* — Campolungo (Muret).
[Lug.—Ag.]

16. **J. compressus** Jacq. enum. p. 235 (*J. bulbosus* Lin.).
♃ Luoghi umidi, strade, prati = Muralto, riva al lago — Tra Giumaglio e Someo, strada.
[Lug.—Ag.]

---

[1] Generoso, in luoghi umidi, discretamente alti (Penzig, Enum. Generoso 1879) — M. Ceneri (Brüg. in Rhiner).

17. **J. Tenageia** Ehrh. Beitr. 1. 148.
⊙ Luoghi arenosi, umidi = Piano di Magadino, tra Cugnasco e il porto, prati uliginosi — Presso Ponte Brolla, cavità uliginose delle rupi allo sbocco della Maggia dalla forra — M. Ceneri, tra la Caserna e la discesa verso Bironico, fosso lungo la strada — Tra Bironico e Taverne, lungo il Vedeggio e la strada — Torbiere d' Angera, abbondantissimo — Lugano (Römer).
[Giug.—Lug.]

18. **J. bufonius** Lin. sp. 466.
⊙ Rive dei laghi, prati umidi, strade = Muralto — Mappo — Cadenazzo — Campo V. M.
β. *fasciculatus* Koch. (*J. mutabilis* Saw.) = Airolo, prati e sentieri che mettono ad Albinasca — Stalvedro — M. Ceneri — Misocco — Val Morobbia.
[Giug.—Sett.]

Luzula.

1. **L. flavescens** Gaud. Fl. helv. 2. p. 564.
♃ Selve della reg. subalp. = M. Tamar, verso Cortenovo — Airolo (Schult.).
[Giug.—Lug.]

?2. **L. Forsteri** DC. Syn. fl. gall. p. 150.
♃ Selve subalp. = Como (Comolli).
[Giug.—Lug.]

3. **L. pilosa** Willd. enum. H. Berol. 1. 393.
♃ Selve e luoghi rupestri = Locarno, strada al Sasso.
[Apr.—Mag.]

4. **L. spadicea** DC. Fl. fr. 3. p. 159 (*L. parviflora* Desv.).
♃ Pascoli alp. e subalp. = S. Bernardino — S. Gottardo — A. di Stille in V. Rovana — A. di Bosco V. M. — Cimalmotto — Bondo — Val Calanca.
[Giug.—Lug.]

5. **L. albida** DC. Fl. fr. 3. p. 159 (*L. angustifolia* Garck.).
♃ Selve mont. = A. di *Pezzo rotto* sul M. Camoghè — M. Tamar.
[Giug.—Lug.]

6. **L. nivea** DC. Fl. fr. 3. p. 158.
♃ Selve di coll. e convalli alp.; freq^{mo} = Locarno — Losone — Orselina ([1]).
[Giug.—Lug.]

7. **L. lutea** DC. Fl. fr. 3. p. 159.
♃ Pascoli alp. = M. Tamar, A. di Neggio — A. di Arnau a Campo V. M. — Camoghè (Heer).
[Giug.—Lug.]

---

[1] Freq. anche nel Luganese, come nella valletta del Tazzino, Molino Nuovo, Castagnola ecc. Aggiungere la var. *rubescens* Favr. Tamaro (Favrat, Jäggi e Schröter). Coltivata nel giardino botanico di Zurigo, ha perduto il colore rosso.

8. **L. campestris** DC. Fl. fr. 3. p. 161. excl. var.
   ♃ Fra gli scopeti = Locarno, Losone, Orselina ecc. (1)
   [Mar.—Apr.]
9. **L. multiflora** Lejeun. Fl. de Sp. 1. p. 169.
   ♃ Selve e scopeti di mont. = Motto Mattignello sopra Campo V. M. (v. *alpina* Hop. = *nigricans* Desv.) — Val Calanca.
   [Mag.—Giug.]
10. **L. spicata** DC. Fl. fr. 3. p. 161.
   ♃ Pascoli alp. = Campo V. M. — S. Gottardo, tra V. Tremola e l' Ospizio — Lucomagno — Val Calanca.
   [Giug.—Ag.]

Fam. Cyperaceae.

Cyperus.

1. **C. flavescens** Lin. sp. 68.
   ⊙ Luoghi paludosi, dal piano alle alpi = Locarno, riva del lago — Mappo al Salciolo — Piano di Magadino — Bellinzona — Airolo — Genestrerio (Erb. Lic. Lug.) — Lugano (Schröter) (2).
   [Lug.—Ag.] — Radice citrina.
2. **C. fuscus** Lin. sp. 69.
   ⊙ Col precedente, ma più raro = Locarno e Muralto, riva del lago — Vezia (P. Agostino Daldini) (3).
   [Lug.—Ag.] — Radice rossigna.
3. **C. longus** Lin. sp. 67.
   ♃ Fossati o prati = Pian Scairolo presso Lugano — Tra S. Antonio e Pontegana, prati — Vacallo verso Morbio inferiore, prati.
   [Agosto]
4. **C. Monti** Lin. fil. suppl. 102.
   ♃ Luoghi paludosi, fossi = Casòro, riva al lago — Riva (Heer).
   [Agosto] (4)

Galilea.

?1. **G. mucronata** Parlatore (5), atti congr. scienz. ital. in Genova 1846 (*Schœnus mucronatus* Lin. sp. 63).
   ♃ Paludi, riva dei laghi = Dintorni di Lugano (Ebel, Manuel du voyageur en Suisse; vol. III. Zürich 1811).
   [Giug.—Lug.]

---

(1) Freq. nei dintorni di Lugano, come a Moncucco, ne' prati presso la stazione ecc.
(2) Casòro, prati uliginosi (Lent.), sopra Vogorno (Rhiner).
(3) Casòro, prati uliginosi (Lent.), Mezzovico (Rhiner).
(4) Indicato da Muret presso Figino (Favrat).
(5) Pianta fugace che scompare facilmente.

Schœnus.

1. **S. nigricans** Lin. sp. 64.
   ♃ Prati umidi, torbosi = Losone, salita della strada di Ronco nell' altipiano presso il Mulino Sorazzi — Tra Ponte Brolla e Avegno — Bellaggio.
   [Mag.—Giug.]

Cladium.

1. **C. Mariscus** Rob. Brown. Fl. nov. holl. ed. germ. 1. p. 92.
   ♃ Fossi, acque stagnanti = Agno — Angera — Oleggio — Castello — Borgomanero.
   [Giug.—Ag.]

Rhynchospora.

1. **R. alba** Vahl. en. 2. 236.
   ♃ Prati torbosi, pascoli umidi = Mondascie sopra Tenero — Bigorio (P. Agostino Daldini) — M. Ceneri (Heer)(1).
   [Lug.—Ag.] — Spiche bianche candide.
2. **R. fusca** Roemer et Schult. 2. 88.
   ♃ Prati umidi = Da Arcegno ai M[a] di Losone — Piano di Mulini, tra Arcegno e Losone — M. Ceneri, tra la Caserna e Bironico.
   [Giug.—Ag.] — Spiche fosche oscure.

Heleocharis. (2)

1. **H. palustris** R. Br. prodr. fl. nov. holl. 1. p. 80 (*Scirpus palustris* L.).
   ♃ Luoghi umidi = Mappo, nel lago — Piano di Magadino — Agno — Laghetto di Muzzano (3).
   [Giug.—Ag.]
2. **H. uniglumis** Link. Jahrbuch 1. 3. 77.
   ♃ Luoghi paludosi = Locarno, riva al lago.
   [Lug.—Ag.]
3. **H. ovata** R. Brown. pr. fl. n. holl. 1. p. 80.
   ⊙ Luoghi umidi = Mappo, sotto seghe del Roncaccio, riva al lago — Piano di Magadino tra la Bolla dell' Inferno e la strada cantonale da Cugnasco a Gordola — — Bellinzona — Bironico — M. Generoso — Piano d' Agno presso il lago (Mari).
   [Lug.—Ag.]

Scirpus.

1. **S. cæspitosus** Lin. sp. 71.
   ♃ Luoghi umidi della reg. alp. e subalp. e anche mont. = S. Gottardo — Campo V. M. — A. di Bosco V. M. — M. Tamar.
   [Mag.—Lug.]

---

(1) Sopra Lavertezzo (Brügg. in Rhiner).
(2) Aggiungere: *H. acicularis* R. Br., in riva al laghetto d' Agno (Erb. Lent., esemplari avuti da Mari) — Lugano (Salis).
(3) Sotto Malvaglia (Rhiner).

2. **S. alpinus** Schleicher.
   ♃ Lucomagno, luoghi acquitrinosi presso S. Maria col *Triglochin palustre* — V. Sambuco (1).
   [Lug.—Ag.]
3. **S. pauciflorus** Lightfoot Fl. scot. p. 1078 (*S. Bœothryon* Ehrh.).
   ♃ Prati paludosi = V. Sambuco (non emette stoloni come afferma Gremli; Excursionsflora f. d. Schw., ediz. 1867. p. 336) (2).
   [Mag.]
4. **S. supinus** Lin. sp. 73.
   ⊙ Luoghi umidi, fra le ghiaie = Torrazza, riva del lago di Lugano.
   [Ag.—Sett.]
5. **S. setaceus** Lin. sp. 2. p. 72.
   ⊙ (♃ sec. Wahlemberg). Luoghi umidi, rive = Dazio (Salis) — Locarno — Orselina — V. Bavona.
   [Giug.—Lug.]
6. **S. mucronatus** Lin. sp. 73.
   ♃ Acque stagnanti, freq. = Tenero, sotto il ponte della Verzasca — Riazzino, paludi verso Cugnasco (3).
   [Lug.—Ag.]
7. **S. lacustris** Lin. sp. 72.
   ♃ Acque stagnanti e di lento corso = Locarno, Mappo, lago — Piano di Magadino, paludi, freq.
   [Giug.—Lug.]
8. **S. Tabernaemontani** Gmel. bad. 1. p. 101. 1806.
   ♃ Acque stagnanti = Laghetto di Muzzano — Agnuzzo — Magadino?
   [Giug.—Lug.]
9. **S. triqueter** auct. non Lin. (*S. trigonus* Roth.).
   ♃ Rive fossi = Magadino — Dintorni di Lugano.
   [Lug.—Ag.]
10. **S. Holoschœnus** Lin. sp. pl. 1. p. 72.
    ♃ Luoghi umidi = Chiasso, lungo la Breggia (Mari).
    [Lug.—Ag.]
11. **S. sylvaticus** Lin. sp. 75.
    ♃ Luoghi umidi = Magadino — Vira Gambarogno — Tra Contra e la Mad. delle Fracce.
    [Giug.—Lug.]

---

(1) V. Bregaglia (Gremli. Fl. de la Suisse; ed. franc. 1886 p. 509).
(2) Casaccia, nelle sabbie del fiume (Brügg. in Rhiner 1861).
(3) Sotto Castelrotto, lungo la Tresa (Favrat).

12. **S. compressus** Pers. syn. 1. 66.
♃ Pascoli e prati umidi della reg. alp. e subalp. = Campo V. M. — S. Bernardino.
[Lug.—Ag.]

Fimbristylis.

1. **F. annua** Roem. et Schult. 2. 95.
⊙ Luoghi umidi = Locarno, alle Fraccie, rupi madide — Tra Riazzino e Cugnasco, paludi freq. — Torbiere di Mercuiago presso Arona.
[Lug.—Ag.]

Eriophorum. (1)

1. **E. alpinum** Lin. sp. 77.
♃ Luoghi umidi delle A. = S. Bernardino.
[Apr.—Mag.]
2. **E. vaginatum** Lin. sp. 76.
♃ Paludi torbose del piano e dei monti = Piano d'Arbigo — S. Gottardo e Passo Nufnen (Erb. Lic. Lug.).
[Apr.—Mag.]
3. **E. Scheuchzeri** Hoppe (*E. capitatum* Host.).
Ital. *Pennacchio Rotondo.*
♃ Luoghi umidi = S. Gottardo (Zollikofer, parroco nel Rheinthal).
[Ging.—Lug.]
4. **E. angustifolium** Roth. germ. 2. p. 63.
♃ Prati paludosi; ascende fino alla reg. subalp. = M. Camoghè, a Poltrinone presso il laghetto — S. Bernardino (v. *minus* Koch = *alpinum* Gand.).
[Ging.—Lug.]
5. **E. latifolium** Hoppe Taschenb. 1800.
♃ Prati umidi della pian. e mont. = Mendrisiotto — Dazio (Salis).
[Apr.—Mag.]

Elyna.

1. **E. spicata** Schrad. Fl. germ. 1. p. 155.
♃ Alpi eccelse = Naret, al varco — S. Bernardino — Lucomagno (2) — Val Calanca — Gottardo.
[Lug.—Ag.]

Carex. (3)

1. **C. dioica** Lin. sp. 1379. Sturm. II. 69 (*C. Linnaeana* Host.).
♃ Prati spongiosi; dal piano alla reg. subalp. = M. Ceneri, Bironico.
[Apr.—Mag.]

---

(1) Aggiungere: *E. gracile* Koch. Casaccia, nelle sabbie del fiume (Brügg. in Rhiner 1861).
(2) Casaccia (Brügg. in Rhiner).
(3) Aggiungere: *C. paniculata* L. Quinto (Rhiner).
C. bicolor All. Casaccia (Brügg. in Rhiner).
C. microstyla Gay. Ospizio del S. Gottardo (Carlo Hegetschweiler 1881).

2. **C. Davalliana** Smith. brit. 3. 964. St. II. 50.
   ♃ Prati, piani di sfagno = Presso Arcegno — V. Travaglia.
   [Apr.—Mag.]
3. **C. pulicaris** Lin. sp. 1380. St. 53.
   ♃ Prati e pascoli acquitrinosi = S. Gottardo.
   [Ging.—Lug.]
4. **C. rupestris** All. ped. 2. p. 264. t. 93. fig. 2. St. II. 61.
   ♃ Rupi elevate delle A. = S. Bernardino, A. di Vignone — Motto Minaccio, sopra Campo V. M. — Forca di Bosco.
   [Lug.—Ag.]
5. **C. panciflora** Lightf. Fl. scot. 2. p. 543. t. 6. fig. 2. St. II. 61 (*C. leucoglochin* L. suppl. 402).
   ♃ Prati spongiosi; dalla pian. alle A. = S. Gottardo e tutta l'alta Leventina.
   [Ging.—Lug.]
6. **C. microglochin** Wahlenb. act. holm. 1803. p. 140.
   ♃ S. Bernardino (Mr Ball).
   [Mag.—Ging.]

?7. **C. baldensis** Lin. sp. 2. p. 1380.
   ♃ Nel Ticino (dove?) (Gremli, Excursionsflora p. 340).
   [Ging.—Ag.] (1)

?8. **C. gynomane** Bertol. (*C. Linkii* Schk.)
   ♃ Lugano, al piè del S. Salvatore (Mari).
   [Apr.—Mag.]
9. **C. curvula** All. ped. 2. p. 294. t. 92. f. 3. Sturm. Heft 47.
   ♃ Luoghi erbosi delle A. = S. Bernardino, A. di Vignone — Forca di Bosco, al varco — Naret — Gottardo — Camoghè — Val Calanca.
   [Lug.—Ag.]
10. **C. incurva** Lightf. Fl. scot. 544. t. 24. fig. 1. Sturm. II. 47 (*C. juncifolia* All.).
   ♃ Alpi più elevate = S. Gottardo presso l' Ospizio (Comolli).
   [Lug.—Ag.]

?11. **C. Bertolonii** Schl.
   ♃ M. Ceneri, presso la Caserma.
   [Mag.—Ging.]
12. **C. fœtida** All. Fl. ped. 2. p. 265. Sturm. II. 47.
   ♃ Luoghi erbosi delle A. = Campo V. M., al Motto Minaccio — Forca di Bosco — A. di Piora — S. Gottardo — S. Bernardino.
   [Lug.—Ag.]

---

(1) Non si trova più nelle ultime edizioni (Favrat).

13. **C. vulpina** Lin. sp. 1382. St. H. 57.
♃ Luoghi umidi = Someo, prati paludosi presso Ruè — Bignasco, salita alla Cappella — M. Camoghè, bassa di Poltrinone.
[Mag.—Lug.]

14. **C. muricata** Lin. sp. 1382 (*C. contigua* Hoppe). Sturm H. 61.
♃ Prati, vie = Locarno verso Muralto, muri, comune — Val Calanca.
[Apr.—Mag.]

15. **C. brizoides** Lin. sp. 1381. Sturm Heft 50.
♃ Luoghi erbosi, umidi e boschi ombrosi = Tenero, al Salciolo — Losone, prati verso la Mad. della Fontana — Bignasco, falde M. Cantone — M. Tamar, Alpi di Neggio al Poncione, freq^{ma} — Tra Ponte Tresa e Sessa (1).
[Mag.—Giug.]
Sui monti di Gambarogno vien detto *Mantellina* dall' uso che se ne fa dai pastori per farne mantelli onde ripararsi dalla pioggia.

?16. **C. Schreberi** (2) Schrank. baier. fl. 1. p. 278. 1789. Sturm Heft 61.
♃ Luoghi arenosi, strade = Locarno, saleggio — Colico (Salis).
[Mag.—Giug.]

17. **C. leporina** Lin. sp. 1381. St. Heft 47.
♃ Strade, prati umidi = Brione S. M. — Campo V. M. — M. Tamar — Locarno — Bondo (Salis).
[Giug.—Lug.]

18. **C. stellulata** Goodenough. trans. of hun. Soc. v. 2. p. 144. St. Heft 50 (*C. echinata* Murr.).
♃ Prati umidi = Someo, presso Ruè — A. di Bosco V. M. (v. *Grypos* Koch. Taschenb. p. 517. ed. 6^{a} = *C. Grypos* Schk. in Koch syn. ed. 1. p. 753) — M. Camoghè, bassa di Poltrinone — M. Ceneri (3).
[Mag.—Giug.]

19. **C. remota** Lin. sp. 1383. St. H. 53.
♃ Luoghi umidi = Locarno, valletta della Guta — Someo, prati di Ruè lungo il rio — Bellinzona, boscaglie presso il Ticino.
[Mag.—Giug.]

?20. **C. elongata** Lin. sp. 1383. St. Heft 50.
♃ Prati paludosi = Misocco (Brgg.).
[Mag.—Giug.]

---

(1) Lugano — Tra Cugnasco e Gordola (Favrat).
(2) Abbonda di preferenza nella Lombardia e nella Svizzera italiana (Parlat. Fl. it. II. 138).
(3) Casaccia (Brügg. in Rhiner).

21. C. **lagopina** Wahlenb. act. holm. 1802. p. 145. St. H. 47 (*C. approximata* Hoppe).
♃ Alpi elevate = Lucomagno — A. di Piora — A. di V. Bavona al lago Nero e in V. di Peccia sopra l' A. della Bolla (M. Ball) (1).
[Lug.—Ag.]

22. C. **canescens** Lin. sp. 1383. St. H. 50 (*C. curta* Good.).
♃ Luoghi umidi = S. Bernardino — Campo V. M., valle di Cravairola.
[Mag.—Giug.]

23. C. **Persoonii** Sieber (*C. canescens β. brunnescens* K. = *C. Gebhardi* Hoppe).
♃ C. Ticino (Moritzi), probabilmente al S. Gottardo (2).

24. C. **mucronata** All. Fl. ped. 2. p. 268. St. H. 53.
♃ Rupi calcari della reg. coll. e subalp. = S. Salvatore — M. S. Giorgio, nel vallone sopra Riva S. Vitale — M. Generoso.
[Mag.—Lug.]

25. C. **stricta** Good. tr. of. linn. soc. v. 2. 196. t. 21.
♃ Paludi presso Arcegno.
[Apr.—Mag.]

26. C. **acuta** Lin. sp. 1388. St. Heft 57.
♃ Luoghi paludosi, lungo ruscelli = M. S. Giorgio, vallone sopra Riva.
[Apr.—Mag.]

27. C. **nigra** All. ped. 2. p. 267. St. Heft 47.
♃ Pascoli alp. = A. di Bosco V. M. — Naret — Campo — Val Calanca.
[Lug.—Ag.]

28. C. **aterrima** Hoppe Caric. germ. p. 51. St. H. 47.
♃ Pascoli delle A. = A. di Bosco V. M. — Lucomagno, alle Farinate, pascoli aridi calcari.
[Lug.—Ag.]

29. C. **atrata** Lin. sp. 1386. Sturm Heft 47.
♃ Luoghi rupestri, pietrosi, aridi delle A. = A. di Bosco V. M. — S. Gottardo.
[Lug.—Ag.]

30. C. **irrigua** Smith. secund. Hartm. scand. fl. ed. 2. p. 255.
♃ M^G di V. Maggia (Comolli) — M. S. Gottardo.
[Lug.]

31. C. **pilulifera** Lin. sp. 1385. St. Heft 50.
♃ Luoghi selvatici = Locarno verso Orselina, Brione — Faido — Val Calanca — Generoso — M. S. Salvatore.
[Apr.—Mag.]

---

(1) Camoghè (Siegfried in Rhiner).
(2) Furka (Christ) — Fusio (Schult.) — Val Calanca (Brgg.).

32. **C. tomentosa** Lin. mant. 123. Sturm H. 53.
♃ Pascoli, prati umidi.
[Apr.—Mag.]

33. **C. montana** L. Fl. svec. ed. 2. p. 328. St. H. 69.
♃ Selve, dumi = Locarno ecc.
[Apr.—Mag.]

34. **C. membranacea** Hopp. (*C. cricetorium* Poll. v. *membranacea* Hop.).
♃ A. eccelse = S. Bernardino, A. di Vignone.
[Lug.—Ag.]

35. **C. præcox** Jacq. Fl. austr. 5. p. 23. t. 446. St. H. 69 (*C. verna* Vill.).
♃ Prati aridi, strade = Locarno, saleggio — Losone, prati [1].
[Mar.—Apr.]

36. **C. longifolia** Host. gram. 4. t. 85. St. H. 57 (*C. polyrrhiza* Wallr.).
♃ Colli e monti aprichi = Locarnese — Brione sopra Minusio — Camignolo, Lugano (Muret) — Generoso (Salis).
[Mar.—Apr.] [2]

37. **C. humilis** Leysser Fl. Hal. p. 175. n. 845. 1761.
♃ Prati secchi = M. S. Salvatore (Comolli Fl. com. v. 7. p. 75) [3].
[Apr.—Mag.]

?38. **C. gynobasis** Vill. Delph. 2. p. 206. St. H. 47 (*C. Halleriana* Asso in Gremli).
♃ Colli erbosi.
[Mar.—Apr.]

39. **C. digitata** Lin. sp. 1383. St. H. 61.
♃ Selve ombrose = Tenero.
[Apr.—Mag.]

40. **C. ornithopoda** Willd. sp. pl. 4. p. 255. St. H. 61.
♃ Selve ombrose = Locarno, al Tazzino — Faido — Val Calanca — Generoso.
[Apr.—Mag.]

?41. **C. ornithopodioides** Hausm. [4].
♃ Pascoli delle A. = Lucomagno, alla Casaccia al disopra delle Farine.
[Lug.]

---

[1] La var. *umbrosa* Host. in Gremli ed. V, tra Bironico e Medeglia, tra Lugano e Castagnola, vecchia strada (Favrat). La specie del resto è freq^ma nei dintorni di Lugano, come nei prati sotto la stazione, nella valletta del Tazzino, a Viganello ecc. (Lenticchia).

[2] Forse confusa colla var. *umbrosa* del *C. præcox* (Favrat).

[3] Confer. Lenticchia, che l' ha colto sulla cima del S. Salvatore e a Gandria.

[4] Probabilmente confuso colla v. *alpina* del *C. ornithopoda* Willd., avendo, come questa, frutti glabri; ma ne differisce per le sue glume di un bruno nerastro e per le foglie caulinari a lembo sviluppato.

42. **C. alba** Scop. carn. 2. p. 216. St. H. 53.
♃ Dal piano alla reg. subalp. = Tra Cevio e Bignasco, prati lungo la strada.
[Apr.—Mag.]

43. **C. panicea** Lin. sp. 1387. St. H. 50.
♃ Prati umidi del piano e di coll. = Losone, lungo la Maggia e prati de' Morti sopra la Mad. della Fontana.
[Apr.—Mag.]

44. **C. glauca** Scop. Fl. carniol. v. 2. p. 223.
♃ Pascoli e selve, luoghi umidi, dal piano alle alpi = Locarno — Campo V. M. ecc.
[Apr.—Mag.]

45. **C. maxima** Scop. carn. 2. p. 229. 1772 (*C. pendula* Huds.).
♃ Luoghi selvatici = Muralto, nel burrone della Guta presso S. Biagio.
[Mag.—Giug.]

46. **C. capillaris** Lin. sp. 1386. St. H. 53.
♃ Luoghi sassosi delle A. = S. Bernardino, A. di Vignone.
[Giug.—Lug.]

47. **C. pallescens** Lin. sp. 1386. St. H. 53.
♃ Selve e prati umidi = Orselina, presso il torrente della Guta — Tenero, valle Téndra — Losone, prati — Campo V. M. — M. Ceneri.
[Mag.]

48. **C. frigida** All. fl. ped. v. 2. p. 270. St. H. 53.
♃ Luoghi pietrosi, umidi, lungo torrenti alp. = S. Bernardino — Motto Minaccio — A. di Bosco V. M. — Camoghè, a Poltrinone (1).
[Lug.—Ag.]

49. **C. sempervirens** Villars. delph. 2. p. 214 St. H.. 53.
♃ Alpi più elevate, da cui scende nelle convalli = S. Bernardino, A. di Vignone — — A. di Bosco V. M. — Presso il lago Nero e A. della Bolla in V. Peccia (M. Ball) — Camoghè.
[Giug.—Ag.]

50. **C. firma** Host. Synopsis fl. austr. p. 509. St. H. 57.
♃ Luoghi sassosi della reg. alp. e subalp. = V. di Peccia, a Frodalta.
[Giug.—Ag.]

51. **C. tenuis** Host. gram. 4. t. 92 (*C. brachystachys* Schkuhr.).
♃ Luoghi pietrosi delle reg. subalp. = V. di Peccia, presso la cascata di Frodalta — Tra Solduno e Ponte Brolla — V. Leventina (*C. setifolia* Heer).
[Giug.—Lug.]

---

(1) La forma *debilis* tra Solduno e Ponte Brolla, lungo la strada, roccie umide (Favrat).

52. **C. flava** Lin. sp. 1384. St. II. 57.
♃ Luoghi paludosi, freq. = Losone, prati de' Morti — V. Maggia — Bellinzona — M. Camoghè, alla bassa di Poltrinone presso il laghetto — V. Tremola.
[Mag.—Giug.]

53. **C. Oederi** Ehrhart. calam. n. 79. St. II. 57.
♃ Luoghi paludosi = Mappo, riva del lago Maggiore.
[Mag.—Lug.]

54. **C. distans** L. pl. 2. p. 1387.
♃ Pascoli, prati = Campo V. M. e altrove (Comolli).
[Mag.—Giug.]

55. **C. punctata** Gaud. agr. helv. p. 152. St. II. 62.
♃ Locarno, strada che mette ai Monti — Losone — Arcegno — Bignasco — M. Ceneri [1].
[Apr.—Mag.]

56. **C. sylvatica** Huds. Fl. angl. ed. 1. p. 353. 1762. St. II. 55.
♃ Selve — Orselina — Tra Contra e le Mondascie presso Locarno.
[Giug.]

57. **C. ampullacea** Good. trans. of linn. soc. v. 2. 207. St. II. 17.
♃ Luoghi paludosi = Piano di Magadino [2].
[Mag.—Giug.]

58. **C. vesicaria** L. sp. 1388. St. II. 69.
♃ Colle antecedenti = Saleggi di Locarno.
[Mag.—Giug.]

59. **C. paludosa** Goodenough. of. linn. soc. v. 2. 202. St. II. 53.
♃ Luoghi paludosi = M. Camoghè, Poltrinone al laghetto.
[Mag.]

60. **C. hirta** L. sp. 1389. St. II. 55.
♃ Luoghi arenosi tanto umidi che aridi = Locarno, greto della Maggia e Monti — Generoso.
[Mag.—Giug.]

Fam. Gramineae.

Zea.

1. **Z. Mays** Lin. sp. 1378.
Ital. *Grano turco, Formentone.* — Tic. *Formentun, Carlun.*
⊙ Dall' America meridionale — Se ne coltiva diverse varietà al fondo delle valli e ne' colli del Mendrisiotto e Luganese.
[Giug.—Mag.]

---

(1) Presso Ponte Brolla (Muret, Favrat), Muzzano (Muret in Rhiner).
(2) Riva laghetto di Muzzano (Lent.).

Andropogon.

1. **A. Ischæmum** Lin. sp. 1483.
   ♃ Prati aridi, rupi, strade = Locarno — Bellinzona — Mendrisio (1).
   [Lug.—Ott.]
2. **A. Gryllus** Lin. sp. 2. p. 1480 (*Pollinia Gryllus* Spreng.).
   Volg. *Trebbi.*
   ♃ Prati aridi, rupi apriche = Locarno, declivi — Solduno — Losone — Ronco d' Ascona — Bellinzona, rupi presso Ponte del Ticino — Luganese — Mendrisiotto — Rivera — Corni di Canzo (2).
   [Giug.—Lug.]

Heteropogon.

1. **H. Allionii** Roem. et Schult. syst. 2. 835.
   ♃ Luoghi aprichi, sassosi = Tra Solduno e Ponte Brolla, rupi delle Vettagne — Tra Ascona e Ronco d' Ascona — Gandria.
   [Sett.—Ott.]

Digitaria.

1. **D. sanguinalis** Scop. carn. 1. p. 52 (*Panicum sanguinale* L.).
   Ital. *Sanguinella.*
   ⊙ Luoghi incolti, strade; freq^{mo} = Locarno — Bellinzona ecc.
   [Lug.—Ott.]
2. **D. ciliaris** Willd. Enum. p. 93 (*Panicum ciliare* Willd. sp. pl. 1. p. 344 — *Synterisma ciliare* Schrad. — *Paspalum ciliare* DC.).
   ⊙ Campi sabbiosi, strade = Solduno — Tra Losone e Golino, margini strade — Misocco ecc.
   [Lug.—Ott.]
3. **D. filiformis** Koel. gram. 26 (*Synterisma glabrum* Schrad. — *Panicum glabrum* Gaud.).
   ⊙ Campi e luoghi arenosi = Bellinzona, sabbie lungo il Ticino ecc. (3)
   [Lug.—Ott.]

Panicum.

1. **P. Crus galli** Lin. sp. 83 (*Echinochloa Crus galli* Beauv.).
   ⊙ Campi, strade, lettamai; freq^{mo} = Locarno — Bellinzona — Val Morobbia ecc.
   [Lug.—Sett.]
2. **P. miliaceum** Lin. sp. 86.
   Ital. *Miglio.* — Tic. *Mèi.*
   ⊙ Dall' Oriente. Si coltiva qua e là e trovasi transfugo ne' campi e lungo le strade = Locarno ecc.

---

(1) Sopra Olivone, Ponte Brolla (C. Hegetschweiler in Rhiner) — Carabbia (Lent.).
(2) Piè del Bolia sopra Brè (Favrat). M. Ceneri (Brügg. in Rhiner).
(3) In massa sulla strada cantonale da Biasca al lago Maggiore (Rhiner).

3. **P. undulatifolium** Arduin. specim. 2. 14. t. 4 (*Oplismenus undulatifolius* Beauv.).
⊙ Selve, dumi = Locarno, al Tazzino — Tenero, nella V. Tendra e Salciolo — Tra Carasso e Gorduno — Cugnasco — V. di Muggio, tra Obino e Monte — Sotto Pianezzo in Val Morobbia (Schröter) (1).
[Lug.—Sett.]

Setaria. (2)

1. **S. viridis** Beauv. agrost. 51 (*Panicum viride* Lin.).
Loc. *Pabbi.*
⊙ Campi e prati, freq^ma.
[Lug.—Ag.]
2. **S. verticillata** Beauv. (*Panicum verticillatum* L.).
⊙ Luoghi colti = Locarno — Bellinzona (Schröter) (3).
[Giug.—Lug.]
3. **S. glauca** Beauv. agrost. 51. (*Panicum glaucum* L.).
Volg. *Pabbi.*
⊙ Campi sabbiosi e luoghi colti; colla precedente, freq^ma.
[Lug.—Ag.]
4. **S. italica** Beauv. agrost. 51. (*Panicum italicum* Lin. sp. 1. p. 83).
Ital. *Panico.* — Tic. *Panigh.*
⊙ Coltivata qua e là e trovasi transfuga nelle strade, ne' campi.
[Lug.—Ag.]
Se ne fanno minestre e serve di cibo agli uccelli, che si allevano nelle gabbie.

Phalaris.

1. **P. canariensis** Lin. sp. 97.
Volg. *Erba bindellina.*
♃ Coltivata e qua e là transfuga.
[Lug.—Ag.]
2. **P. arundinacea** Lin. sp. 80.
♃ Rive, letto di torrenti = Tra Cavigliano e Auressio, letto di un torrente — Tra Ascona e Ponte di Ronco, riva del lago, ed altrove.
Si coltiva ne' giardini la var. *picta* a foglie vergate di bianco e di verde.
[Mag.—Giug.]

---

(1) Sotto Cadro (Mari).

(2) D' aggiungere: *S. ambigua* Cass., la quale non differisce dalla verticillata che per i pungiglioni diretti in alto. — Trovata presso Lugano; rara, probabilmente introdotta dal mezzodì (Gremli, ed. fr. 1886, p. 528). Conf. Lenticchia che ne colse (1888) parecchi esemplari sul *quai* nuovo. Dopo la riattazione di questo, scomparve.

(3) Maggia, Lugano ecc.

Anthoxanthum.

1. **A. odoratum** Lin. sp. 40 (1).
   ♃ Prati e selve tanto del piano che de' colli e monti = Locarno ecc. — M. Camoghè, pascoli di Poltrinone ecc.
   [Apr.—Lug.]

Alopecurus. (2)

1. **A. pratensis** Lin. sp. 88.
   Ital. *Coda di Volpe.* — Tic. *Cova de ratt.*
   ♃ Prati fertili.
   [Mag.—Giug.]
2. **A. fulvus** Smith. angl. bot. 21. t. 1467.
   Ital. *Strozza ranocchie.*
   ♃ Prati umidi, fossi, paludi = Magadino, riva del lago — Someo, presso Ruè — Generoso (Mari).
   [Mag.—Ag.]

Phleum.

1. **P. Michelii** All. ped. 2. p. 233 (*P. hirsutum* Suter).
   ♃ Pascoli alp. = Genoroso — Fusio (Schröt.) ecc.
   [Lug.—Ag.]
2. **P. asperum** Vill. Delph. 2. 61. t. 2. fig. 4.
   Ital. *Codolina, Lima.* — Tic. *Cova de ratt.*
   ♃ Rupi di coll. = Locarno, tra Mad. Sasso e Fregiera.
   [Mag.—Giug.]
3. **P. Boehmeri** Wibel. (*Phalaris phleoides* L.).
   Ital. *Codolina nuda.*
   ♃ Rupi = Presso Lugano — Gandria — Faido (3).
   [Giug.—Lug.]
4. **P. pratense** Lin. sp. 79. Leers. herb. t. 3. fig. 1.
   ♃ Prati fertili; comune.
   [Giug.—Lug.]
5. **P. alpinum** Lin. sp. 88 (4).
   ♃ Pascoli alp. e subalp. = A. di Bosco V. M. — Naret — Generoso (5).
   [Lug.—Ag.]

---

(1) Colla v. *alpinum* Gand. — Tra Gordola e Minusio; adunque scende fino al piano (Favrat). Conf. Gremli, N. B. z. Fl. d. Schw. 1887. IVo fasc. p. 32. Questa graminacea dà l' aroma speciale al fieno (Lent.).

(2) Aggiungere: *A. agrestis* L. — Mendrisio (Salis).

(3) Rovio (Brügger) — Cevio, Pian alto di V. Piora (Erb. Hürlimann 1883)

(4) Aggiungere: var. *commutatum* — Generoso (Siegfried).

(5) Camoghè, Val Misocco.

Cynodon.

1. **C. Dactylon** Pers. syn. 1. 85 (*Panicum Dactylon* L.).
   Loc. *Gramegna.*
   ♃ Campi e prati arenosi, strade; communissimo = Locarno — Bellinzona ecc.(1).
   [Lug.—Sett.]

Leersia.

1. **L. oryzoides** Schwartz (*Oryza clandestina* A. Br.).
   ♃ Ne' fossi e lungo le rive = Arona, paludi presso Invorio sup., freq. — Locarno (Schult.)(2).
   [Ag.—Sett.]

Agrostis.

1. **A. stolonifera** Lin. sp. 93. var. β (*A. alba* L. — *A. stolonifera* Koch).
   ♃ Prati, pascoli, campi, ghiaie de' fiumi, strade; freq^{ma}.
   [Ging.—Lug.]
2. **A. vulgaris** Withering. arrang. p. 132.
   ♃ Coll' antecedente = Locarno — Campo V. M. — Airolo (Siegfr.) — V. Maggia (Schröter)(3).
   [Ging.—Lug.]
3. **A. canina** Lin. sp. 92. Reichb. ic. 11. f. 1424.
   ♃ Luoghi umidi(4).
   [Ging.—Ag.]
4. **A. alpina** Scop. carn. 1. 60. Reichb. ic. 11. f. 1422.
   ♃ Pascoli alp. = Generoso — Camoghè — Val Tremola — Val Calanca — S. Bernardino.
   [Lug.—Ag.]
5. **A. rupestris** All. ped. 2. p. 237. Reichb. ic. 11. f. 1423.
   ♃ Pascoli alp. = Motto Minaccio in V. Campo V. M. — Airolo — Camoghè.
   [Lug.—Ag.]

Apera.

1. **A. Spica venti** Beauv. Agrost. 31. Reichb. ic. f. 1421 (*Agrostis spica venti* L.)(5).
   ♃ Tra le messi e luoghi arenosi, incolti = Locarno, campagna di Solduno — Mendrisio (Salis).
   [Ging.—Lug.]

---

(1) Biasca, Lugano, Rancate, Magliaso.
(2) Sotto Malvaglia in abbondanza (Rhiner. Loc. cit.).
(3) Lungo il Cassarate, freq.
(4) M. Ceneri, 1863 (Brügg. in Rhiner).
(5) L' *A. purpurea* Gaud., var. a. spighette meno numerose, porporine, freq. lungo le strade a Locarno, Lugano ecc.

Calamagrostis. (1)

1. **C. litorea** DC. Fl. fr. 5. 255. Reichb. 1. c. f. 1449 (*Arundo litorea* Schrad.).
   ♃ Bellinzona, riva del Ticino alle chiatte presso Cugnasco.
   [Lug.—Ag.]
2. **C. tenella** Host.
   ♃ Campo V. M., salita della Rovana all' A. di Sfille — A. di Sella, S. Gottardo (Schröter).
   [Lug.—Ag.]
3. **C. varia** Link.
   ♃ Comune.
   [Lug.—Ag.]
4. **C. sylvatica** DC. Fl. fr. 5. p. 253 (*C. pyramidalis* Hart. = *C. arundinacea* Roth. = *Agrostis arundinacea* L.).
   ♃ Selve = Orselina — Pianezzo — M. Ceneri (in una siepe) — M. Generoso — M. Tamaro sopra Rivera (Jäggi e Schröter) — Cimalmotto (Stebler e Schröter) (2).
   [Lug.—Ag.]

Stipa.

1. **S. pennata** Lin. sp. 1. p. 115.
   Ital. *Lino delle fate*, *Stuzzichella*. — Volg. *Penagger* (Olivone).
   ♃ Luoghi rupestri, aprichi di mont. = Olivone, M^ti delle Costa e M. Toira (3).
   [Luglio] — Il seme matura in Agosto.
   È igrometrica; i contadini se ne servono per segnale del tempo. Col vento e secco la piuma del seme si arriccia, coll' umido si distende.

Lasiagrostis.

1. **L. Calamagrostis** Link. hort. 1. 91 (*Calamagrostis speciosa* Host. = *Agrostis Calamagrostis* Lin.).
   ♃ Luoghi rupestri = Lugano, piedi del S. Salvatore — Lucomagno (4).
   [Lug.—Ag.]

Phragmites.

1. **P. communis** Trin. Fund. Agrost. p. 154 (*Arundo Phragmites* L.).
   Ital. *Lisca*.
   ♃ Stagni, fossi, paludi, riva dei laghi, fiumi, prati uliginosi = Piano di Magadino — Agno — Muzzano ecc.
   [Ag.—Sett.]
   Lo si miete per farne strame.

---

(1) Aggiungere: *C. epigejos* Roth. — M. Ceneri (Brügg. in Rhiner).
(2) S. Giorgio, sopra la Cascina di Meride (Favrat).
(3) Cima del S. Salvatore (Zollikofer in Rhiner),
(4) Sotto Ghirone, Caprino (Brügg. in Rhiner).

Arundo.

1. **A. Donax** Lin. sp. 120 (*Scolochloa Donax* Gaud.).
   Ital. *Canna, Canna da pesca.* — Tic. *Canna.*
   ♃ Coltivato qua e là per fare, coi fusti maturi, rocche, canne da pesca ad altri utensili.
   [Ag.—Sett.]

Sesleria. (1)

1. **S. cærulea** Arduin. specim. 2. p. 18. t. 9. fig. 3—5 (*Cynosurus cæruleus* L.).
   ♃ Rupi calcari = M. Generoso — M. S. Giorgio — M. Lucomagno, pascoli tra Casaccia e S. Maria, freq. (2)
   [Mar.—Giug.]

?2. **S. elongata** Host. (3) (*S. argentea* Sav.).
   ♃ Castagneti del Luganese e Mendrisiotto.
   [Mag.—Lug.]

3. **S. disticha** Pers. syn. 1. 72.
   ♃ Rupi delle A. più elevate = Forca di Bosco — S. Bernardino, cima di Vignone.

Koeleria.

1. **K. cristata** Pers. syr. 1. 97 (*Aira cristata* Lin.).
   ♃ Colli aprichi e prati secchi — Ronco di Ascona — Ascona, presso la Chiesa di S. Michele.
   [Giug.—Lug.]

2. **K. valesiaca** Gaud. agrost. 1. 149. Reichb. ic. 11. f. 1671.
   ♃ Prati e colli aprichi = Tra Cavigliano e Auressio, strada — Someo, prati. (4)
   [Apr.—Mag.]

3. **K. hirsuta** Gaud. Fl. helv. 1. p. 267.
   Monti nel Cantone Ticino (5) (secondo Hegetschweiler) — S. Bernardino.
   [Lug.—Ag.]

Aira.

1. **A. cæspitosa** Lin. sp. 96. Leers. herb. t. 4. fig. 8. (*Deschampsia cæspitosa* Beauv.).
   ♃ Selve e prati = S. Bernardino — Campo V. M. (v. *pallida* K. = *altissima* Lam.) — M. Camoghè, bassa di Poltrinone.
   [Lug.—Ag.]

---

(1) Aggiungere: *S. sphærocephala* Ard. — Poschiavo, nuova per la Svizzera (Gremli, N. B. z. Fl. d. Schw. 1887. fasc. IV° p. 32).

(2) Pendici e piede del S. Salvatore, abbondante a S. Martino — Gandria.

(3) Si troverebbe nel Ticino secondo Hegetschw. Non so da qual fonte provenga l'indicazione di quelle due località.

(4) Faido, Rovio (Brügg. in Rhiner).

(5) Pizzo Vigera (Erb. Hürlimann 1881).

2. **A. flexuosa** Lin. sp. 96. Leers. herb. t. 5. f. 6 (*Deschampsia flexuosa* Trin.).
♃ Selve, scopeti, luoghi aridi = Piazzogna e Fossano — Tra Cavigliano e Auressio, strada d' Onsernone etc.
[Giug.—Lug.]

Holcus.

1. **H. lanatus** Lin. sp. 1485. Leers. t. 7. fig. 7.
♃ Prati, pascoli, selve; comune = Locarno etc.
[Giug.—Lug.]
2. **H. mollis** Lin. sp. 1485.
♃ Prati, pascoli, selve (1).
[Giug.—Lug.]

Arrhenatherum.

1. **A. elatius** M. et Koch d. fl. 1. 546. Leers. t. 10. f. 4.
♃ Prati, campi, selve.
[Giug.—Lug.]

Avena.

1. **A. sativa** Lin. sp. 118. Host. gr. 2. t. 56.
⊙ Coltivata qua e là, massime a Contone — [Lug.]
Usata come nutrimento pei cavalli.
2. **A. fatua** Lin. sp. 118.
⊙ Fra le messi.
[Giug.—Lug.]
3. **A. pubescens** Lin. sp. 1665. Leers. herb. t. 9. f. 2.
♃ Prati = Cugnasco — Generoso (2).
[Mag.—Giug.]
4. **A. pratensis** Lin. sp. pl. 1. p. 119.
♃ M. S. Giorgio, prati.
[Lug.—Ag.]
5. **A. versicolor** Vill. Delph. 2. p. 142. t. 4. fig. 5 (*A. Scheuchzeri* All.).
♃ Pascoli alp. = S. Bernardino, A. di Vignone — S. Gottardo.
[Lug.—Ag.]
6. **A. flavescens** Lin. sp. 118 (*A. argentea* Willd., *Trisetum flavescens* Beauv.) (3).
♃ Prati = Losone — Bignasco (4).
[Mag.—Giug.]

---

(1) Sopra Airolo (Rhiner).
(2) Comune a Lugano.
(3) Aggiungere: v. *variegatum* — A. Grande di Bosco V. M.
(4) S. Giorgio, Pazzalino.

7. **A. distichophylla** Vill. Delph. 2. 144. t. 4. fig. 4 (*Trisetum dystichophyllum* Beauv.).
♃ Alpi più elevate, ghiaie de' torrenti — Prati secchi del M. Generoso (Comolli).
[Ging.—Lug.]

8. **A. subspicata** Clairville. Reichb. ic. 11. f. 1691 (*Aira spicata* L., *Trisetum subspicatum* Beauv.).
♃ A. elevate = S. Bernardino, A. di Vignone — S. Gottardo.
[Lug.—Ag.]

9. **A. caryophyllea** Wigg. primit. fl. hol. p. 10. Reichb. ic. 11. f. 1676 (*Aira caryophyllea* L.).
⊙ Campi arenosi, strade, freq. = Locarno — Bellinzona (1).
[Aprile]

Danthonia.

1. **D. provincialis** DC. Fl. fr. 3. 33.
♃ Pascoli del M. S. Giorgio sopra la Cascina di Meride.
[Ging.]

Triodia.

1. **T. decumbens** Beauv. Leers. t. 7. fig. 5 (*Dantonia decumbens* DC.).
♃ Prati, selve = Ponte Brolla, presso ai Grotti — V. Sambuco — Brione sopra Minusio.
[Ging.—Lug.]

Melica.

1. **M. glauca** F. Schultz, in Gremli ed. V. (*M. ciliata* auc. helv. non Lin.).
♃ Luoghi aspri, sassosi = Ascona, muri — Capolago, muri — Riva S. Vitale — Origlio presso Lugano (Mari) ecc. (2)
[Mag.—Ging.]

2. **M. uniflora** Retzius. obs. 1. 10. Reichb. 11. f. 1576.
♃ Selve = Riva S. Vitale, nel Vallone.
[Mag.—Ging.]

3. **M. nutans** L. sp. 98. Leers. t. 3. fig. 4.
♃ Selve = Locarno — Tenero.
[Mag.—Ging.]

Briza.

1. **B. media** Lin. sp. 103.
Loc. *Brillantina*. — Lug. *Tremacoeur*.
♃ Prati secchi, comune (3).
[Mag.—Ging.]

---

(1) Sotto Someo, Lugano (Brügg. in Rhiner), Melide (Lent.).
(2) Versante meridionale del S. Salvatore.
(3) M. Brè, Breganzona, S. Salvatore, Arogno ecc.

Eragrostis.

1. **E. minor** Host. (*Eragrostis poaeoides* Beauv.).
   ♃ Luoghi incolti, umidi = Presso Arcegno, strada da Losone a Roneo collo *Schœnus fuscus* — Mendrisiotto — Arona.
   [Lug.—Ag.]
2. **E. pilosa** Beauv. agrost. 71. Host. gram. t. 68.
   ⊙ Campi e lungo le strade da Bodio al Lago Maggiore — Grono, strada (1).
   [Lug.—Sett.]

Poa.

1. **P. annua** Lin. sp. 99. Reichb. ic. 11. f. 1621.
   ⊙ Campi, prati, strade.
   Fiorisce quasi tutto l'anno.
2. **P. laxa** Hænke. sudet. 118. Reichb. 11. 1630 e 1631.
   ♃ Alpi elevate = S. Gottardo — S. Bernardino.
   [Giug.—Ag.]
3. **P. minor** Gaud. helv. 1. p. 253.
   ♃ Pascoli e letto dei torrenti = Campo, al Motto Minaccio — M. Tamar.
   [Lug.—Ag.]
4. **P. bulbosa** Lin. sp. 102. Reichb. ic. 11. fig. 1619.
   ♃ Prati, strade = Locarno.
   [Mag.—Giug.]
5. **P. alpina** Lin. sp. 99. Reichb. ic. 1625—1628 (2).
   ♃ A. = S. Gottardo — S. Bernardino — Narct — Forca di Bosco — Generoso (Lenticchia) (3).
   [Giug.—Ag.]
6. **P. nemoralis** Lin. sp. 102.
   α. vulgaris Koch. Leers. t. 3. f. 3.
   ♃ Selve, rupi, muri = Locarno, valletta della Ramogna.
   γ. rigidula K. (*P. pratensis* Leers. herb. t. 6. f. 4).
   ♃ Campo V. Maggia, lungo i rivi.
7. **P. fertilis** Host. gram. 3. t. 14 (*P. serotina* Ehrh.).
   ♃ Prati umidi, rigagnoli = Tenero.
   [Lug.—Ag.]
8. **P. trivialis** Lin. sp. 90. Leers. herbor. t. 6. f. 5.
   ♃ Prati, dappertutto.
   [Mag.—Giug.]

---

(1) Lugano (Rhiner).
(2) Aggiungere la v. *viripara* — S. Gottardo.
(3) Mti di Ambri.

9. **P. pratensis** Lin. sp. 99. Leers. herbor. t. 6. f. 3.
♃ Prati, selve.
[Mag.—Ging.]

10. **P. compressa** Lin. sp. 101.
♃ Pascoli, strade — Locarno, alveo della Maggia (rara) — Luganese — Arona (freq.).
[Ging.—Lug.]

Glyceria. (1)

?1. **G. spectabilis** Mert. e Koch deutsch. fl. p. 586. Leers. herb. t. 5. fig. 5 (*Poa aquatica* L.).
♃ Nelle acque stagnanti e rive = Locarno, roggia della fontana Orelli.
[Lug.—Ag.]

2. **G. fluitans** Rob. Brown. prodr. 1. 179. Schreber. gram. 37. t. 3. (*Festuca fluitans* Lin.).
♃ Acque stagnanti, rivi = Tenero (2).
[Ging.—Lug.]

3. **G. aquatica** Presl. fl. cech. p. 25. 1819 (*Aira aquatica* L. — *Catabrosa aquatica* Beauv.).
♃ Acque stagnanti, fossi = Piano di Magadino.
[Ging.—Lug.]

Molinia.

1. **M. cœrulea** Mœnch. meth. 183. Leers. herb. t. 4. f. 5 (*Aira cœrulea* L.).
a. maior (*M. altissima* Link., *M. arundinacea* Schrank) = Selve tra Brione e Contra — Locarno, al Sasso — Ponte Brolla — Arcegno — Gordevio — Maggia — — S. Bernardino (3).
[Ag.—Sett.]

Diplachne.

1. **D. serotina** Link. hort. 1. 155 (*Festuca serotina* L., *Molinia serotina* M. e K.).
♃ Colli e rupi = Lugano, piè del S. Salvatore — Gandria — Porlezza — Casòro (Mari).
[Ag.—Ott.]

Dactylis.

1. **D. glomerata** Lin. sp. 105. Leers. herb. t. 3. f. 3.
♃ Prati e selve, comunissima.
[Mag.—Ging.]

Cynosurus.

1. **C. cristatus** Lin. sp. 105.
♃ Prati = M. Generoso (Erb. Lic. Lug.).
[Mag.—Ging.]

---

(1) Aggiungere: *Gl. plicata* Fr. Bioggio, acque correnti (Mari) — Airolo, Mezzovico (Rhiner).
(2) Sopra Airolo — V. Camadra (Rhiner).
(3) S. Salvatore — S. Giorgio, sopra Brusino.

2. **C. echinatus** Lin. sp. 105.
⊙ Prati, campi, strade = Locarno, al saleggio, rive scoscese della Maggia, campi di Solduno — Campo V. M., alla Seccada, fra le messi — Airolo, messi — Lugano — Mendrisio (1).
[Mag. = Giug.]

Festuca. (2)

?1. **F. tenuiflora** Schrad. (*Nardurus umilateralis* Boiss., *N. tenellus* Rchb.).
⊙ Luoghi incolti, soleggiati = Hegetschweiler l' indica crescente nel Cantone, forse nel Luganese o Mendrisiotto.
[Giug.—Lug.]

2. **F. Lachenalii** Spenner fl. friburg. p. 1050 (*Triticum tenellum* L. = *Nardurus Lachenalii* Godr.).
⊙ Prati, greti de' fiumi = Locarno, saleggio e greto della Ramogna — Cavigliano, strada — Quartino, presso la strada del Monte Ceneri — Cadenazzo, alveo torrente — Biasca, greto presso i Grotti — Taverne (Gremli).
[Mag.—Giug.]

3. **F. rigida** Kunth. en. 1. 392 (*Scleropoa rigida* Grisch., *Poa rigida* L.).
⊙ Luoghi secchi, vigne, strade = Gandria — S. Salvatore, al piede verso Melide — Mendrisio, sul conglomerato tra Mendrisio e Contone, passati i mulini — Coldrerio.
[Giug.—Lug.]

4. **F. Pseudo-Myuros** Soyer Willemet (*Vulpia pseudomyurus* Soy. Will. = *F. Myurus* L.).
⊙ Strade, campi, muri = Locarno — Bellinzona ecc.
[Apr.—Mag.]

5. **F. Halleri** All. ped. 2. p. 253.
♃ S. Gottardo (Hegetschweiler).
[Lug.—Ag.]

6. **F. sciuroides** Roth. tent. 2. 130 (*Vulpia sciuroides* Rchb.).
⊙ Luoghi incolti, prati aridi = Locarno ecc.
[Mag.—Giug.]

---

(1) Rovio (Brügg. in Rhiner).

(2) Aggiungere: *F. alpina* Sut. Naret? (Christ).
F. pilosa Hall. M. Camoghè (Mari).
F. pumila Willars. Generoso (Comolli).
F. pratensis Huds. Rive del Cassarate presso il lago (Mari).

7. **F. ovina** Lin. sp. 108.
   ♃ Prati, rupi; freq.(1).
   [Mag.—Giug.]
   ε. duriuscula L. (*F. duriuscula* L.).
   Negg (dial. Fusio) = Fessure delle rupi; reg. subalp. e alp. = Fusio — Campo V. M. (Lug.)(2).
   [Giug.—Ag.]
   Verdeggia anche d' inverno ed allora è assai ricercata dalle capre cui è quasi unico nutrimento in quella stagione.
   ζ. glauca (*F. glauca* Schrad. Lam., *F. pallens* Host.) = Rupi sotto S. Michele presso Ascona — Vettagne verso Ponte Brolla.
   9. vaginata (*F. vaginata* Gaud.). Presso Faido (Bamberger).
8. **F. heterophylla** Lam. Fl. fr. ed. 1. 3. p. 600. 1778.
   ♃ Selve; coll., mont., subalp. e alp. = Locarno verso Ponte Brolla.
9. **F. rubra** Lin. sp. 109.
   ♃ Prati, luoghi incolti = Locarno, alveo della Maggia.
   [Mag.—Giug.]
10. **F. varia** Hænke in Jacq. collect. 2. p. 94.
   ♃ Pascoli A. = Motto Minaccio sopra Campo V. M.(3)
   [Lug.—Ag.]
11. **F. spadicea** L. syst. nat. ed. 12. v. 2. p. 732.
   ♃ Reg. subalp. e alp. = M^to di Gambarogno — M. Tamar, pizzo di Neggio, e nella prima discesa dalla vetta a Sigirino — M. Camoghè — M. Bolia, cresta per andare al Sasso Rosso (Muret) — M. Generoso.
   [Lug.—Ag.]
12. **F. Schenchzeri** Gaud. agrost. 1. 267 (*F. pulchella* Schrad.).
   ♃ Pascoli alp. = Campo V. M. — A. di V. Bavona presso il lago Nero e della Bolla in V. di Peccia (M. Ball).
   [Lug.—Ag.]
13. **F. gigantea** Vill. Delph. 2. 110.
   ♃ Selve, luoghi ombrosi = Losone.
   [Giug.—Lug.]
14. **F. arundinacea** Schreber spicil. fl. lips. p. 57. 1771.
   ♃ Prati, dumi = Losone — Tenero.
   [Giug.—Lug.]

---

(1) La v. *capillata* Hackel, presso Lugano (Mari) e probabilmente comune nel Ticino, dove ho veduto un' altra forma (Favrat).

(2) La v. *genuina* Hackel monogr. — Cima del Generoso e del Tamar, abbondante (Favrat). La v. *curvula* a Bosco V. M. (Lenticchia).

(3) Sopra Taverne (Muret in Rhiner).

15. **F. ĕlatior** Lin. Fl. suec. ed. 2. p. 32 (*F. pratensis* Huds.).
♃ Prati fertili tanto in pian. che in mont.
[Giug.—Lug.]

Brachypodium.

1. **B. sylvaticum** Roem. et Schulth. 2. 741 (*Bromus pinnatus* L. *β.*).
♃ Selve, dumi = Locarno, strada vecchia per la Mad. Sasso — Tra Bodio e Giornico — M. Camoghè — Generoso (Mari).
[Lug.—Ag.]
2. **B. pinnatum** Beauv. agrostogr. p. 101.
♃ Colli aprichi, incolti, luoghi sassosi, dumi = Locarno — Bellinzona — Giornico.
γ. cæspitosum (*Bromus cæspitosus* Host. = *Triticum gracile* DC.). Rupi tra Locarno e Ponte Brolla.
[Giug.—Lug.]

Bromus.

1. **B. secalinus** Lin. sp. 112. Leers. t. 11. f. 2.
⊙ Campi.
[Giug.—Lug.]
2. **B. racemosus** L. sp. 114. Reichb. ic. 11. f. 1590.
⊙ o ♡ Prati e pascoli.
[Mag.—Giug.]
3. **B. mollis** L. sp. 112. Leers. herb. 11. f. 1.
⊙ o ♡ Prati, strade.
[Apr.—Mag.]
4. **B. arvensis** Lin. sp. 113. Leers. herb. t. 11. f. 3.
⊙ Messi, freq. = Locarno — Bellinzona — Mendrisio.
[Giug.—Lug.]
5. **B. squarrosus** Lin. sp. 112.
⊙ Messi, vigneti = Mendrisiotto — Luganese.
[Mag.—Giug.]
6. **B. asper** Murr. (¹) prodr. fl. goett. p. 42.
♃ Selve, massime di mont. = Contra (V. Verzasca).
[Giug.—Lug.]
7. **B. erectus** Huds. angl. 49.
♃ Luoghi incolti, margine campi, selve = Solduno — Locarno — Losone.
[Mag.—Giug.]

(¹) *B. asper* Murr. e *B. serotinus* Benek. sono due specie finora tra loro confuse. Conf. Gremli ed. V. Forse tutte e due nel Ticino (Favrat).

28. **B. inermis** Leysser. Fl. halens. ed. 1. p. 16. 1761.
♃ Luoghi incolti, margine campi = Locarno.
[Ging.— Lug.]

9. **B. sterilis** L. sp. 113. Leers. herb. t. 11. f. 4.
⊙ Campi, prati, muri, strade = Locarno — Bellinzona ecc.
[Mag.—Ging.]

10. **B. tectorum** Lin. sp. 114. Leers. t. 10. f. 2.
⊙ Campi, muri, strade — Locarno alla Ramogna — Bellinzona, argine del Dragonato [1]).
[Mag.—Ging.]

Triticum.

1. **T. vulgare** Vill. Delph. 2. 153 ([2]).
Ital. *Frumento.*
⊙ e ♃ Coltivasi.
[Ging.—Lug.]

2. **T. durum** Desf. atl. 114.
Volg. *Forment. Forment de minestra.*
⊙ ♃ Coltivato specialmente nella V. di Muggio.
[Ging. Lug.]

3. **T. glaucum** Desf. cat. hort. paris. p. 16 (*Agropyrum glaucum* R. Sch.).
♃ Rive, strade = Locarno, strada al Belvedere — Dintorni di Lugano, sponde di acque correnti.
[Ging.—Lug.]

4. **T. repens** Lin. sp. 128. Leers. herb. t. 12. f. 3 (*Agropyrum repens* Beauv.).
Ital. *Gramigna.* — Tic. *Gramegna.*
♃ Luoghi arenosi, siepi; freq^mo.
[Ging.—Lug.]

5. **T. caninum** Schreber. spicil. fl. lips. p. 51. Host. gram. 2. t. 25 (*Agropyrum caninum* R. Sch.).
♃ Selve, lungo i rivi; poco freq.
[Ging.—Lug.]

Secale.

1. **S. cereale** Lin. sp. 124. Metzger. europ. cereal. t. 9.
Ital. *Segale.* — Loc. *Segra.*
⊙ e ♃ Coltivato generalmente.
[Maggio]

[1]) Faido (Brügg. in Rhiner).
[2]) Distinto in *T. æstivum* L. a glumelle aristate e *T. hybernum* L. a glumelle quasi mutiche.

Hordeum.

1. **H. vulgare** Lin. sp. 125. Metzger Europ. cereal. t. 9.
   Ital. *Orzo.* — Tic. *Orz.*
   ⊙ Coltivasi.
2. **H. hexastichum** Lin. sp. 125. Metzger Europ. cereal. t. 10.
   Ital. *Orzo.* — Tic. *Orz.*
   ⊙ Coltivasi.
3. **H. murinum** Lin. sp. 126.
   ⊙ Freq^{mo}; muri, strade.
   [Ging.—Lug.]

Lolium. (1)

1. **L. perenne** Lin. sp. 122.
   ♃ Prati, pascoli, campi; dappertutto.
   [Lug.—Ott.]

?2. **L. multiflorum** Gaud. Reichb. ic. 11. f. 1345 (2).
   ⊙ Campi = Locarno.
   [Ging.—Lug.]

3. **L. arvense** Withering. arrang. 168. Reichb. ic. 11. f. 1337 (v. a stelo e guaine liscie del *L. speciosum* Bieb.).
   ⊙ Campi, qua e là.
   [Lug.—Ag.]

4. **L. temulentum** Lin. sp. 122.
   ⊙ Messi = Campagna d' Ascona.
   [Ging.—Lug.]
   L' unica specie graminacea velenosa, che cresca ne' nostri paesi.

Nardus.

1. **N. stricta** Lin. sp. 77. Schreb. gram. tab. 7.
   ♃ Prati uliginosi; freq^{mo}; sale anche nelle Alpi = Locarno — Brione sopra Minusio — Campo V. M. — S. Bernardino — M. Camoghè, A. di Lavella (?).
   [Mag.—Ging. (reg. coll.) — Lug.—Ag. (reg. alp.)]

(1) Aggiungere: *L. italicum* A. Br. Coltivato ed anche spontaneo, p. es. presso la stazione ferroviaria di Lugano, a Maggia.

(2) È comune nel mezzodì.

Indice dei Generi.

	Pag.
Abies	203
Acer	56
Achillea	124
Aconitum	27
Acorus	207
Actæa	27
Adenophora	146
Adenostyles	115
Adonis	22
Adoxa	107
Aegopodium	99
Aesculus	57
Aethionema	38
Aethusa	100
Agave	221
Agrimonia	81
Agropyrum v. Triticum.	
Agrostemma	48
Agrostis	239
Aira	241
Ajuga	178
Albersia v. Amaranthus.	
Alchemilla	83
Alectorolophus v. Rhinanthus.	
Alisma	204
Alliaria v. Sisymbrium.	
Allium	219
Alnus	201
Alopecurus	238
Alsine	50
Althæa	54
Alyssum	36
Amaranthus	184
Amelanchier v. Aronia.	
Ampelopsis	57
Anacamptis v. Orchis.	
Anagallis	180
Anchusa	156
Andropogon	236
Androsace	180
Androsaemum	55
Anemone	21
Angelica	101
Antennaria v. Gnaphalium.	
Anthemis	125
Anthericum	218
Anthoxanthum	238
Anthriscus	104
Anthyllis	65
Antirrhinum	163
Apargia	135
Apera	239
Apium	99
Aquilegia	26
Arabis	31
Arbutus	147
Arctostaphylos	147
Arenaria	51
Arctia v. Androsace.	
Aristolochia	191
Armeria v. Statice.	
Armoracia	37
Arnica	127
Aronia	85
Aronicum	127
Arrhenatherum	242
Artemisia	122
Arum	207
Arundo	241
Asarum	192
Asparagus	214
Asperula	109
Asphodelus	218
Aster	117
Astragalus	70
Astrantia	98
Athamanta	101
Atriplex	186
Atropa	160
Avena	242
Azalea	148
Ballota	177

	Pag.
Balsamita	123
Barbarea	31
Barkhausia	139
Bartsia	168
Bellidiastrum	117
Bellis	117
Berberis	28
Berula	99
Beta	186
Betonica	176
Betula	200
Bidens	120
Biscutella	38
Blitum	185
Borago	156
Brachypodium	248
Brassica	35
Briza	243
Bromus	248
Brunella	177
Bryonia	91
Bunias	39
Buphthalmum	119
Buplenrum	100
Buxus	192
Calamagrostis	240
Calamintha	173
Calendula	130
Callitriche	89
Calluna	148
Caltha	25
Camelina	37
Campanula	144
Cannabis	194
Capparis	39
Capsella	38
Capsicum	159
Cardamine	32
Carduus	131
Carex	229
Carlina	132
Carpesium	121
Carpinus	197
Carum	99
Castanea	196
Catabrosa v. Glyceria.	
Celtis	195
Centaurea	133
Centranthus	113
Centunculus	180
Cephalanthera	211
Cerastium	52
Ceratophyllum	89
Cerinthe	155
Chærophyllum	105
Chaiturus	177
Chamæorchis	210
Cheiranthus	30
Chelidonium	29
Chenopodium	185
Cherleria	50
Chlora	152
Chlorocrepis v. Hieracium.	
Chondrilla	138
Chrysanthemum	126
Chrysocoma	116
Chrysosplenium	98
Cicer	71
Cichorium	135
Cineraria	128
Circæa	88
Cirsium	130
Cistus	39
Cladium	227
Clematis	20
Clinopodium	174
Cnidium	101
Cochlearia v. Armoracia.	
Colchicum	221
Colutea	62
Comarum	78
Conium	105
Convallaria	215
Convolvulus	155
Conyza	119
Cornus	106
Coronilla	70
Corydalis	29
Corylus	197
Cotoneaster	84
Cratægus	84
Crepis	139
Crocus	212
Cucubalus	46
Cucumis	91
Cucurbita	90
Cupressus	202
Cuscuta	155
Cyclamen	182
Cydonia	85
Cynanchum	151
Cynara	131
Cynodon	239
Cynoglossum	156
Cynosurus	245
Cyperus	226
Cytisus	63
Dactylis	245
Danthonia	243
Daphne	189
Datura	161
Daucus	104
Delphinium	26

	Pag.
Dentaria	33
Deschampsia v. Aira.	
Dianthus	44
Dictamnus	60
Digitalis	162
Digitaria	236
Diospyrus	149
Diplachne	245
Diplotaxis	35
Dipsacus	114
Doronicum	127
Dorycnium	68
Draba	36
Drosera	42
Dryas	76
Echinochloa v. Panicum.	
Echinops	130
Echinospermum	156
Echium	157
Elatine	53
Elyna	229
Empetrum	192
Endymion	221
Epilobium	86
Epimedium	28
Epipactis	211
Eragrostis	244
Erica	148
Erigeron	118
Eriophorum	229
Eritrichium	159
Erodium	58
Erophila v. Draba.	
Eruca	36
Erucastrum	35
Ervum	72
Eryngium	98
Erysimum	34
Erythraea	154
Erythronium	218
Eupatorium	115
Euphorbia	192
Euphrasia	168
Evonymus	60
Faba v. Vicia.	
Farchinia	49
Fagopyrum v. Polygonum.	
Fagus	196
Festuca	246
Ficaria v. Ranunculus.	
Ficus	195
Filago	121
Fimbristylis	229
Foeniculum	100
Fragaria	78
Frangula v. Rhamnus.	
Fraxinus	151
Fritillaria	217
Fumaria	29
Gagea	219
Galanthus	214
Galeobdolon	175
Galeopsis	175
Galilea	226
Galinsoga	120
Galium	110
Gaya	101
Genista	63
Gentiana	152
Geranium	57
Geum	76
Gladiolus	212
Glechoma	174
Globularia	183
Glyceria	245
Gnaphalium	121
Gratiola	162
Gymnadenia	209
Gypsophila	44
Habenaria	209
Hedera	106
Hedysarum	71
Helcocharis	227
Helianthemum	40
Helianthus	120
Heliotropium	155
Helleborus	25
Helosciadium	99
Hemerocallis	221
Heracleum	103
Herminium	211
Herniaria	92
Hesperis	34
Heteropogon	236
Hibiscus	55
Hieracium	110
Hippocrepis	70
Hippophae	191
Hippuris	89
Holcus	212
Holosteum	51
Homogyne	115
Hordeum	250
Horminum	171
Hottonia	182
Humulus	194
Hutchinsia	38
Hyoscyamus	160
Hypericum	56
Hypochaeris	137
Hyssopus	174
Iberis	37
Ilex	150
Illecebrum	92

	Pag.
Impatiens	59
Imperatoria	102
Inula	119
Iris	213
Isnardia	88
Jasione	143
Jasminum	151
Juglans	196
Juncus	223
Juniperus	202
Kernera	37
Knautia	114
Kœleria	241
Lactuca	138
Lamium	175
Lapsana	135
Lappa	132
Larix v. Abies.	
Laserpitium	103
Lasiagrostis	240
Lathræa	170
Lathyrus	73
Laurus	190
Lavandula	170
Leersia	239
Lemna	206
Leontodon	136
Leontopodium v. Gnaphalium.	
Lepidium	38
Lepigonum	49
Leucanthemum v. Chrysanthemum.	
Leucojum	214
Ligusticum	101
Ligustrum	150
Lilium	217
Limodorum	207
Limosella	166
Linaria	163
Linderuia	166
Linnæa	108
Linosyris v. Chrysocoma.	
Linum	53
Listera	211
Lithospermum	157
Littorella	183
Lloydia	218
Loiseleuria v. Azalea.	
Lolium	250
Lonicera	108
Lotus	68
Lunaria	36
Lupinus	64
Luzula	225
Lychnis	48
Lycopsis	156
Lycopus	171
Lysimachia	179
Lythrum	90
Majanthemum	216
Malachium	52
Malva	54
Mandragora	160
Marrubium	177
Matricaria	126
Matthiola	30
Medicago	66
Melampyrum	166
Melandrium v. Lychnis.	
Melica	243
Melilotus	66
Melissa	174
Melittis	174
Mentha	170
Menyanthes	152
Mercurialis	193
Mespilus	85
Meum	101
Micromeria	173
Mœhringia	50
Molinia	245
Molopospermum	105
Monotropa	149
Montia	92
Morus	195
Mulgedium	139
Muscari	221
Myosotis	158
Myricaria	90
Myriophyllum	89
Najas	205
Narcissus	213
Nardurus v. Festuca.	
Nardus	250
Nasturtium	30
Neottia	212
Nepeta	174
Nicandra	159
Nicotiana	160
Nigella	26
Nigritella	210
Nuphar	28
Nymphæa	28
Ocymum	170
Oenanthe	100
Oenothera	88
Olea	150
Onobrychis	71
Ononis	65
Onopordon	132
Ophrys	210
Oplismenus v. Panicum.	
Opuntia	94

	Pag.
Orchis	207
Origanum	172
Ornithogalum	219
Orobanche	169
Orobus	73
Oryza v. Leersia.	
Ostrya	197
Oxalis	59
Oxyria	188
Oxytropis	69
Pachypleurum v. Gaya.	
Paeonia	27
Paliurus	61
Panicum	236
Papaver	28
Paradisia	218
Parietaria	194
Paris	215
Parnassia	42
Pastinaca	103
Pedicularis	167
Peplis	90
Persica	74
Petasites	116
Petroselinum	99
Peucedanum	102
Phaca	69
Phalaris	237
Phaseolus	74
Phelipæa v. Orobanche.	
Phellandrium v. Oenanthe.	
Philadelphus	90
Phleum	238
Phœnixopus	138
Phragmites	240
Physalis	160
Phyteuma	143
Phytolacca	184
Picris	136
Pimpinella	99
Pinguicula	179
Pinus	202
Pisum	73
Plantago	183
Platanus	196
Platanthera	210
Pleurospermum	106
Poa	244
Podospermum	137
Pollinia v. Andropogon.	
Polycnemum	185
Polygala	13
Polygonatum v. Convallaria.	
Polygonum	188
Populus	200
Portulaca	91
Potamogeton	204
Potentilla	78
Poterium	84
Prenanthes	138
Primula	181
Prunus	75
Pulegium v. Mentha.	
Pulicaria	120
Pulmonaria	157
Punica	86
Pyrola	149
Pyrus	85
Quercus	196
Ranunculus	22
Raphanistrum v. Raphanus.	
Raphanus	39
Reseda	42
Rhamnus	61
Rhinanthus	167
Rhodiola	92
Rhododendron	148
Rhus	62
Rhynchospora	227
Ribes	95
Robinia	62
Rosa	81
Rosmarinus	171
Rubus	77
Rumex	187
Ruscus	216
Ruta	60
Sagina	49
Salix	198
Salvia	171
Sambucus	107
Sanguisorba	84
Sanicula	98
Santolina	123
Saponaria	46
Sarothamnus	63
Satureja	173
Saussurea	133
Saxifraga	95
Scabiosa	115
Scandix	104
Schœnus	227
Scilla	219
Scirpus	227
Scleranthus	92
Scorzonera	137
Scrophularia	162
Scutellaria	177
Secale	249
Sedum	93
Selinum	101
Sempervivum	93

	Pag.
Senebiera	30
Senecio	128
Serapias	211
Serratula	133
Seseli	100
Sesleria	241
Setaria	237
Sherardia	109
Sibbaldia	81
Sideritis	177
Silene	46
Sinapis	35
Sisymbrium	34
Smilacina v. Majanthemum.	
Solanum	159
Soldanella	182
Solidago	118
Sonchus	139
Sorbus	85
Soyeria.	
Sparganium	206
Specularia	146
Spergula	49
Spergularia v. Lepigonum.	
Spinacia	186
Spiræa	76
Spiranthus	212
Stachys	176
Statice	183
Stellaria	51
Stenactis	117
Stenophragma v. Sisymbrium.	
Stipa	240
Streptopus	215
Succisa	114
Symphytum	157
Syringa	150
Tamus	216
Tanacetum	123
Taraxacum	138
Taxus	202
Tetragonolobus	69
Teucrium	178
Thalictrum	20
Thesium	191
Thlaspi	37
Thrincia	135
Thuja	202
Thymus	172
Tilia	55
Tofieldia	223
Tordylium	103
Torilis	104
Tormentilla	81
Tozzia	166
Tragopogon	136
Trapa	88
Trifolium	66
Triglochin	204
Trinia	98
Triodia	243
Trisetum v. Avena.	
Triticum	249
Trollius	25
Tropeolum	59
Tulipa	217
Tunica	44
Turritis	31
Tussilago	116
Typha	206
Ulex	62
Ulmus	195
Umbilicus	93
Urtica	194
Utricularia	179
Vaccaria v. Saponaria.	
Vaccinium	147
Valeriana	112
Valerianella	113
Vallisneria	204
Veratrum	222
Verbascum	161
Verbena	179
Veronica	164
Viburnum	107
Vicia	71
Vinca	151
Vincetoxicum v. Cynanchum.	
Viola	40
Viscaria v. Lychnis.	
Viscum	106
Vitis	57
Vulpia v. Festuca.	
Willemetia	137
Xanthium	143
Xeranthemum	135
Zanichellia	205
Zea	235
Zizyphus	61

3 5185 0007